


滇南本草

第一卷

蘭茂著

云南省卫生厅整理

云南人民出版社







62.3.1
157
1: ①

滇南本草

第一卷

蘭茂著

云南省卫生厅整理

云南人民出版社



中科院植物所图书馆



S0022259



前 言

“滇南本草”是部历史悠久而具有临床經驗的地方性医药名著，我省中医界把它奉为“至宝”，在广大劳动人民中也很有威信。由于过去多次刻鈔、增补，版本残缺，且多錯訛。为了坚决贯彻党的中医政策，进一步发掘祖国医学遗产，使它更好的为人民健康和社会主义建設事业服务，我厅在党的领导和总路綫的光輝照耀下，在工农业生产大跃进的鼓舞下，組織了有关人員进行整理。本书整理着重从各种刻鈔版本中校勘原文，改正錯訛，补充缺佚，采集地方和节引其他有关文献資料作为整理参考。

藥物整理方面，着重寻求名实相符的植物标本，經有經驗的藥农、中草药医协助采集标本后，即按标本鑑定学名，記錄別名，用文字、图画描述植物形态及药用部分。

本书整理工作，由云南省第一人民医院于蘭馥同志等負責集校；云南省中医院研究室杜元冲、魏均爛、胡月英同志負責藥物标本采集、品种分类、植物形态繪制、敘述等；标本学名鑑定及藥物的植物形态描述，由中国科学院植物研究所昆明工作站吳徵鑑、馮国楣等同志、云南大学生物系部分教师协助进行。集校部分由姚仲達、苏采臣同志协助，又經戴丽三、魏述徵等同志复审。还應該提到的是：1956年“云南省第一次中医代表會議”与会代表、藥农，中国科学院植物研究所昆明工作站、云南省图书馆，云南大学图书馆、李繼昌、張宝善、范行準等同志借給珍貴的图书資料。

由于有这些支持和帮助，整理工作始得順利进行。我們謹向上述单位和同志致以誠摯的謝忱！

本书共分三卷，由云南人民出版社出版。由于初次整理，經驗不多，如有疏漏脫略之处，請讀者給予指正。

云南省卫生厅

1959年9月

總 目

蘭茂畫像

滇南本草書影

滇南本草舊本原序

蘭茂傳略

凡 例

第 一 卷

第 二 卷

第 三 卷

附 錄

藥名及別名筆劃索引

藥物學名索引

各種版本所收藥物及卷頁對照目錄

參考圖書資料目錄

編 後 記



蘭茂畫像


清末昆明畫家楊應選(榆村)繪

云南省博物館藏



清初刻本“滇南本草”書影

湯溪流衍準先生藏



清代鈔本“滇南本草”

昆明李繼昌先生藏

性微溫味甘能舒肝養血去積神應少陽有心能下胃
 中起至若花止心煩熱牙痛相冷在間發熱此症腫腫
 破步履行轉入白濁下淋濁等症此藥入精神神
 食附任智心能散積人宜通要
 潤方清味甘白帶羊及腹中痛症在間發熱神
 大散合藥味甘于時為春三月水牛用三三三三
 虎頭
 性微溫味甘能舒肝養血去積神應少陽有心能下胃
 中起至若花止心煩熱牙痛相冷在間發熱此症腫腫
 破步履行轉入白濁下淋濁等症此藥入精神神
 食附任智心能散積人宜通要
 潤方清味甘白帶羊及腹中痛症在間發熱神
 大散合藥味甘于時為春三月水牛用三三三三
 虎頭

花似掃帚可與...
 之刺亦與刺者不同性...
 芥切效不同
 味辛性溫 無毒 主治口眼歪斜
 通利血脈化癰血死血治頭風如神 夷人用此治跌打
 損傷并散毒瘡亦效治吐血清目疎風化癢養肌筋骨疼
 癢解酒即醒如神 貓龍美人作茶令不染毒按
 之男婦老幼從不落齒皆呼為龍草



務本堂刻“滇南本草”書影

滇南本草卷下
 藥南叢書子部之十五
 嵩明蘭茂止菴著

草部
 珍珠二枝蒿味苦性寒利小便瀉腸膀胱積熱除五淋治
 便濁發散積毒
 單方五淋初起便濁草刺水視點水酒服
 金絲接骨草性溫治筋骨疼痛發大水煎點酒
 金絲接骨草 五錢 全秦歸 五錢 川芎 五錢 桂枝
 三錢 木瓜 三錢 用好酒三斤文武火煮一柱香時
 取出去毒早晚服之

云南叢書本“滇南本草”書影

石龍草 滇南本草 多生石谷內花似丁香葉似桃葉
 枝梗無刺眼科神藥能開瞽目退除障翳其效如神
 龍蛋草 滇南本草 有大毒入口傷人生山中有水處
 葉尖有刺一本數枝子黑色有毒傷人治一切癰疽
 發背毒瘡致命熬膏搽敷立時見效又俗名鬼核桃
 石梅 滇南本草 此草非山梅亦非家梅高僅數寸帶
 黃色硬梗色黑子甚細小同連翅煎用治一切大毒
 毒大麻瘋子治九種胃氣花能止血
 地竹 滇南本草 此竹於郊野就地而生高僅二寸又
 各地餘竹治一切目疾老眼昏花雲翳遮睛瘡疾傷

清道光通志引“滇南本草”書影



植物名實圖考引
 “滇南本草”書影



“滇南本草圖譜”書影

滇南草本務本堂版序文

(一)

上古神農氏嘗百草而知藥性，軒轅氏訪歧伯、伯高、少俞而知脈理，後世始有生生之術矣。夫人之五臟六腑，氣脈週流；而陰陽血脈上按天道，下詳地理。非冥心聚精，博考沉思，不能入其奧妙；而況粗浮之氣，疎略之見哉。

余幼酷好本草，考其性味，辨地理之情形，察脈絡之往來，獨滇南則不同也。蓋滇南乃崑崙之總脈也，而又近于西天之地，故有逆水繞之。往往奇花異草產於滇域而人不識。余留心數年，審辨數品仙草，合滇中蔬菜草木種種性情。并著醫門肇要二卷，特救民病，以傳後世，為永遠濟世之策。後有學者，以誠求之，切不可心矢大利而泯救病之心。若能刻存善念，利吾救人，自有神天默佑，獲福非淺。凡行醫者，合脈理參悟，其應如響。然凡奇花異草，切勿輕傳匪人。慎之慎之！

明滇南楊林和光道人

止庵蘭茂撰並識

(二)

昔神農嘗百草以辨藥性，而醫家始有所宗；此神靈首出，功高當世，利及來茲也。古今人每不相及，而其事則隱有於字。

考滇南楊林蘭先生者，自幼閉門潛修，讀書好道；不求聞達於當時，惟心存利濟於來世。因于滇中所產之靈藥百草，無不備極精神，區類辨性，繪為圖形，註為書集，聖經所謂格物者也。先生著作甚

多，明末兵燹，殘缺無存。其或存者，傳寫多訛。如滇南草本附醫門摩要一書，先前未經刊刻，故所存者鮮。延及於今二百餘年，猶多遺失，良可慨也。

余承先代遺澤，竊幸家有殘篇；奈年遠代溷，不無廢壞。余長兄暄於癸酉年春，向里人中尋訪舊存，互相校對，親爲抄補，此書乃爲之全備。但私之於己，其獲益有限，不如公之於世，其爲利甚溥也。余念及此，因重訂之。卽捐家藏遺本一部，刊刻流傳，俾得者朝夕採覽，識見廣資；庶不貽誤於醫藥，而先生濟世之功，與神農嘗藥之功，亦後先媲美，永垂萬世於不朽云。

時光緒丁亥年仲冬月上浣
鄉後學文明管濬重訂、題序並書

(三)

自來醫書所載甚是不一，惟我鄉先達止庵夫子手著滇南草本附醫門摩要一書，其間辨藥性之周詳；明脈理之精，審見症之確切；附湯方之合宜；種種悉備，有益濟世，莫可名言。醫家各置一卷，藥石之奉，誠何愧哉！原喜友人管兄所捐藏本，刊刻流傳，愿公諸君子，同其所好焉！是以爲序。

歲光緒丁亥年仲冬月上浣
鄉後學問渠周源清謹識

(四)

古有英雄豪傑之士，抱濟人利物之懷，幸而兼善天下，出其經綸，燮理陰陽，安懷老少；不幸而獨善其身，本其惻怛格物之性，救民之疾。雖窮達不倫，而濟人利物之心則一也。以故神農嘗草，軒轅

訪脈，歧伯工診，下此如雷公煎製，仲景傷寒，是皆不忍民之疾苦鮮醫，各挾濟物利人之心，以求盡其在己者也。矧以窮達異哉！然九洲所產之藥，辨自黃帝，晰於漢唐，備于宋元，已屬無美不臻；卽六詔所產，本草綱目亦載之悉備，豈待是書出而滇南之草木始著耶！然綱目所載者有限，滇南所產者極多，使無人以表彰之，造物之精英，不豈湮沒未宣耶！況滇稟崑崙正氣，其間五金並產，奇草異葩，靈藥瓌木，恆補中州所弗及。明蘭止庵先生功深好古，志切濟人，研心草木數十年，味其甘辛酸苦，明其溫燥涼熱，圖其柯葉形狀，著滇南本草三卷，附著醫門肇要二卷，于是滇南之一草一木，悉有功于人世而流傳不朽矣。洎明鼎革，遺編燔于兵燹，國朝二百年來，是書益不可考；本堂主人王君級三，利濟摠懷，不忍是書之失，蒐羅搜輯。丁亥仲冬，乃得管文明昆季劫灰撥存家藏善本，不吝工資，重加剞劂。正其帝虎烏焉，釐其條目篇什，越一載而書成。爲丐數言，弁諸簡端。予喜其利物濟人之心摯，而善其章句字畫之辨精，且嘉其以獨善之身，擴兼善之志，故樂爲之序，并識其崖略如此云。

大清光緒戊子大雪後五日

點蒼郁堂李文煥撰並書

滇省務本堂重鐫

滇南本草雲南叢書版序

曩聞之先君曰：“相傳雲南品藥者有三家：一沐國公琮曰宜蘭本草，一蘭茂，一楊慎皆曰滇南本草。沐楊惟傳鈔本。蘭有舊坊刻本，其中有劉乾添注數條；劉不詳何時何地人，恐非蘭氏手定矣。至新坊刻蘭本則太糅雜，且書中時稱止庵先生，決爲無識者竄亂止庵之書矣。惟道光中，皖人孫兆蕙以同知官滇，其人習醫工繪，得楊慎傳鈔本，蘭茂舊坊刻本，乃合校而彙編之，凡得藥四百一十種，分載蘭楊之說，亦間附己說，自繪爲圖而刊之，曰一隅本草。其書尙可備醫家之用云。”

劍川趙藩撰

滇南本草圖說後序

醫之爲道難言矣。其法雖備於古，而運用之妙在一心。故自軒岐而降以至有明，其間著書立說，闡其精思奧旨，代不乏人。故其書汗牛充棟，指不勝屈，使學者童而習之，皓首而不得其津涯焉。卽能盡讀其書，而但拘守陳跡，靡克變通，往往以古人最良之法，致使今人受甚烈之害者。此豈古人著作之未善歟！抑未能取古人之書，探本窮源，精思研究，以盡古人之妙耳。蓋上古之醫，醫於未病之先；中古之醫，醫於將病之際；今世之醫，醫於既病之後。醫於未病之先者，無傷其天，無戕其性，順養和平，故其人常無病；醫於將病之際者，培養其天，輔翼其性，祛其邪而扶其正，故其人雖不能無病而嘗知所避；醫於既病之後者，其天已薄，其性已戕，卽有倉廬，具費經營，況枵腹者不察虛實，妄投以虎狼之劑，施以腐雜之味，大則戕生，小者無濟。凡此者，皆不能盡讀古人之書，讀其書而未克搜其精奧以探本窮源也。

蘭子因母病，留心此技三十餘年。其學皆探本窮源，得古人精奧。其方餌專一真切，不事枝葉。投入數劑，無不立愈。所以余將已學種種草本，著之於書，以救滇民之病。後之得斯書者，恆心尋訪，細察性味，變通草木，更求明師指授脈理，參之天時，方可以爲醫矣。

蘭 茂 傳 略

蘭茂，字廷秀，云南省嵩明縣楊林千戶所石羊山人。原籍河南洛陽。生于明洪武30年（1397），卒于成化12年（1476），享年80歲。

蘭氏性聰穎，十三歲通經史，年長後便研讀宋代濂洛關閩學派的書；賦性淡薄，不願混迹于利祿場中。在他屋前列有“止庵”的匾額，人們也稱蘭氏為“止庵先生。”他又自號“和光道人”、“洞天風月子”、“玄壺子”。

蘭氏居住楊林時間較多，經常往返昆明楊林之間，並往雲南各地採集藥物，替群眾治病。他對醫學、地理、丹青無不兼長，一生的著述很多。有名的除“滇南本草”“醫門肇要”以外，尚有“韻略異通”、“性天風月通玄記”（傳奇）、“聲律發蒙”、“玄壺集”等。這些著述經過多次傳抄和刻印，現在仍有流傳。

蘭氏終身為一平民，極為人民所愛戴。在他死後，人們建祠堂紀念他。

凡 例

(一) 本书彙集“滇南本草”各种版本，比对文字的詳略异同，校訂原文；并采集标本，繪制葯物图及說明形态，所收葯物，以原书曾編录的为限。

(二) 本书主要根据务本堂及云南丛书刻本，原分三卷，現經整理仍作三卷。將葯物分別編录各卷內，不标列类目。

(三) “滇南本草整理本”計分九部分：

1. 葯 名
2. 学 名
3. 別 名
4. 原 文
5. 校 語
6. 植物形态
7. 葯用部分
8. 附 註
9. 图

(四) 葯名以原书所列为准。倘原名有錯誤的，根据其他文獻改正，在校語中說明。

(五) 学名列在葯名后，并标明植物科名。

(六) 图及植物形态說明，系根据标本观察，对証文獻，繪制敘述。对一般果、蔬、动物葯部分，图說从略。

(七) 校訂文字，依据的版本如下：

1. 湯溪范行準先生收藏明代范洪（守一子）撰，清代高宏业，朱景阳递鈔本：“滇南本草圖說”卷二至十二。收葯物274种。

（簡称“范本”）

2. 宝翰軒旧藏清代抄本“滇南本草”一册，不分卷，收葯物135

种。(简称“翰本”)

3. 琴硯斋旧藏清代抄本“滇南本草”一册，不分卷，收药物184种。(简称“琴本”)

4. 李继昌先生家藏清代抄本“滇南本草”一册，不分卷，收药物174种。(简称“李本”)

5. 胡云龠先生旧藏清代抄本“滇南本草”一册，不分卷，收药物26种。(简称“胡本”)

6. 清光绪13年(1887)昆明务本堂刻“滇南草本”三卷，卷一分上下，收药物458种。(简称“务本”)

7. 民国3年(1914)云南丛书刻“滇南本草”三卷，收药物280种。(简称“丛本”)

8. 民国26年(1937)上海世界书局据务本堂版铅印“滇南本草”三卷，卷一分上下，收药物458种。(简称“世本”)

9. 清道光间吴其濬编“植物名实图考”及“长编”，引“滇南本草”70条。(简称“图考”)

10. 清道光间阮元等修，王崧等纂“云南通志稿”，卷67—70引“滇南本草”79条。(光绪间纂修的云南通志卷67—70引滇南本草与道光志完全相同。)(简称“通志”)

11. 民国32年(1943)前中国药物研究所编“滇南本草图谱”第一集，收药物26种。(简称“图谱”)

(八) 除原书所标列别名外，增入古籍别名及地方土名。

(九) 校录原文，采务本堂及云南丛书版作底本。务、丛两本所未收的、由别本补入。原文之后，注明版本和卷次页次。

(十) 校录原文，倘所根据的本子和别本对比查明底本确有错误或遗漏的，则根据别本改正或补录，加〔〕符号以示区别，并在校语中叙明原由。

(十一) 各本文字分歧，如药物名称、气味、形态、药性、疗效、方剂等部分。有的文字可并存以备参考；有的含义相反，而根据实物和实际经验对比，也难以判断正误的，即以底本为准，录入“原

文”一欄，將別本不同的文字，列在“校語”中。至范本敘述形态較詳，比務、从本增改較多的，仍收入“原文”欄。

(十二) 校語排在原文后面，用①②③……等号次，标列在原文应校的部分，以資对照。

(十三) 务本堂刻“滇南草本”卷二三之后，有“外附良方”（世本統移在卷三后）；又蘭茂所著“醫門學要”一書，也附有驗方。这些方剂中，有部分与本书的藥物有关，分別摘出，录入各該藥物附注欄。

(十四) 吳其濬編“植物名實圖考”“長篇”，云南省、县方志和其他史籍文献中，有关滇南本草藥物的資料，以及滇南本草图谱所徵引的文献，也摘要录入附注。

(十五) 有关滇南本草各种藥物的本草学、藥物学、藥理学的研究，鑑于中外文論文著述，資料甚多；將另輯專書收載。本书限于体例，不再录入。

(十六) 由于原書及引用的文献均系文言；倘改为語体敘述，易失原义，因此本书引用古籍概录原文。校注說明，也采用淺近的文言。

(十七) 为便于参考起見，对原著者蘭茂的画像、版本書影及蘭茂傳略，也列在卷端；並附录藥名和学名的索引在全书之后，編制下列四项目录索引：


1. 全书藥名及別名笔画索引；
2. 全书藥物学名索引；
3. 各种版本所收藥物及卷頁次对照目录；
4. 参考图书資料目录。

第一卷 目 录

沙 參..... (1)	續 斷..... (83)
金鐵鎖..... (4)	狗屎花..... (86)
葳 參..... (7)	葳靈仙..... (90)
蘭花參..... (10)	貫 衆..... (94)
紫 參..... (14)	羊蹄根..... (97)
苦 參..... (17)	東風草..... (101)
大薊 小薊..... (21)	漏 蘆..... (105)
白 芨..... (26)	重 蕪..... (108)
何首烏..... (29)	草血竭..... (111)
鹿 竹..... (32)	地不容..... (114)
千針萬綫草..... (35)	土 瓜..... (117)
香 附..... (38)	慈 菇..... (121)
白龍鬚..... (42)	草果藥..... (124)
大一枝箭..... (45)	淫羊藿..... (127)
小一枝箭..... (48)	八仙草..... (130)
瓦 草..... (51)	珍珠草..... (133)
白 芷..... (54)	馬蹄草..... (135)
土黃連..... (58)	瓦 松..... (138)
白芍 赤芍..... (61)	五葉草..... (141)
綿大戟..... (64)	水金鳳..... (145)
柴 胡..... (67)	蛤蟆草。車前子..... (148)
黃 芩..... (71)	遍地金..... (151)
管 仲..... (74)	金鐘茵陳..... (153)
野棉花..... (77)	響鈴草..... (156)
鑽地風..... (80)	苦馬菜..... (159)

烏 藥.....	(164)	五加皮	(257)
魚腥草.....	(167)	桑白皮 桑椹子.....	(260)
魚眼草.....	(170)	牡丹皮.....	(263)
扁柏葉.....	(173)	金鵲花.....	(265)
五味草.....	(176)	玉蘭花.....	(268)
地草果.....	(179)	金銀花.....	(271)
麥穗夏枯草.....	(183)	芙蓉花.....	(274)
接骨草.....	(186)	旋覆花.....	(277)
酸餃草.....	(190)	梔子花.....	(280)
酸漿草.....	(193)	羊耳朶.....	(283)
九里光.....	(196)	紫薇花.....	(286)
木 賊.....	(199)	木槿花.....	(288)
臭靈丹.....	(202)	雞冠花.....	(291)
竹箒子.....	(206)	青箱子.....	(294)
石椒草.....	(209)	粟 米.....	(297)
杏葉防風.....	(212)	山稗子.....	(299)
竹葉防風.....	(217)	天天茄.....	(302)
繡球防風.....	(220)	刺天茄.....	(305)
石蓮花.....	(223)	覆盆子.....	(308)
馬尿花.....	(226)	落花參.....	(311)
樓台草.....	(229)	拐 棗.....	(314)
蕭 蓄.....	(232)	秋木瓜.....	(317)
七星草.....	(235)	土千年健.....	(320)
石 韋.....	(237)	老虎刺尖.....	(323)
黃龍尾.....	(240)	赤陽子.....	(326)
寄生草.....	(244)	郁李仁.....	(329)
靈芝草.....	(247)	金絲桃.....	(331)
荷葉 藕.....	(251)	苦楝子.....	(334)
地骨皮.....	(254)	皮哨子.....	(337)

山查.....	(340)	金柿 柿花.....	(391)
白菓.....	(344)	紅梅.....	(393)
罌粟壳.....	(347)	蘋菓.....	(394)
酸餃.....	(350)	花紅菓.....	(395)
必提珠.....	(353)	杏 杏仁.....	(396)
菱角.....	(356)	李子 李子樹根.....	(397)
松節 松筆頭 松香...	(359)	赤小棗.....	(398)
槐 槐角 槐花.....	(362)	康棗.....	(399)
栗子 栗子花.....	(365)	黑食子.....	(400)
枇杷 枇杷葉.....	(368)	葡萄.....	(401)
橘子皮.....	(371)	櫻桃.....	(403)
橙子 黃果皮.....	(373)	柳.....	(405)
香櫞葉.....	(376)	龍眼.....	(406)
佛手柑.....	(379)	荔枝.....	(407)
橄欖.....	(382)	甘蔗.....	(408)
石榴.....	(384)	雞頭實.....	(409)
梨.....	(388)	稻草.....	(410)
桃.....	(390)	神麩.....	(412)



沙 參

本品为桔梗科 (Campanulaceae) 植物 *Adenophora bulleyana* Diels.

別名 知母 白參 苦心 志取 虎鬚 識美 文希 羊婆孺

原文 沙參，味甘，性平、微寒^①。入肺〔經〕^②，能補肺氣，以及六腑之陰氣。肺氣盛則五臟六腑之氣皆盛。性微寒，故補陰氣。肺熱者，〔可〕^③以代人參用，刮去皮，銅鍋蜜炒^④。

(附方) 耑治諸虛之症。

沙參一兩 嫩雞一隻去腸 入沙參在雞腹內，用砂鍋水煎爛食之^⑤。若肺家有痰火及熱者，服之令人咽喉痛、牙齒痛。

評云：雞熱，非沙參熱也^⑥。

——务本堂本卷中第1頁

校 ①原作“性平、味甘、微寒”。依全书編例及丛本改。

②③据丛本增。

④丛本作“去蘆，去皮，蜜炒”，且列在药名下。

⑤丛本作“煮熟食”。翰本作“煮爛食之”。

⑥丛本无“評云：雞熱，非沙參熱也”一节。务、世、翰本有。

植物形态 多年生草本，高80—100厘米。根肥厚，黃白色，多皺紋及疣状突起。莖圓筒形单生，具稜，疏具白色硬毛。叶互生，橢

圓形或橢圓狀披針形，長3.6—5.7厘米，寬1.6—2.4厘米。先端尖，基部窄楔形；緣具不規則鋸齒；上面綠色，有短硬毛；下面淡綠色，除沿葉脈處有短硬毛外，余無毛。秋天于枝梢的葉腋間開花，下部者，一總梗上常具三下垂花，頂生者；漸為互生狀，具短梗。萼光滑而小，萼筒近圓形，具6—8縱紋，長約3毫米。先端5裂，裂片綫狀披針形，長約8毫米，花冠鐘狀，長約1.5厘米。先端五裂；裂片卵狀三角形，長約6毫米。寬約長之半。雄蕊5枚，花絲細絲狀，着生花冠基部；下部成薄片，周圍密被細絨毛，長約7毫米。花藥淡黃色，綫形，長約4毫米，全着。雌蕊1枚，花柱棒狀，長約13毫米，密被腺毛；柱頭不顯。果為蒴果，長0.8—1.2厘米。（見附圖沙參）

藥用部分 根

附註 醫門擊要收錄有關“沙參”方劑如下：清暑益氣湯：治長夏濕熱炎蒸，四肢困倦，精神減少，胸滿氣促，身熱心煩，口渴惡食，自汗身重，肢體疼痛，小便赤澀，大便溏黃而脈濡者。

沙參三錢 黃芪二錢 蒼朮一錢 白朮二錢 青皮一錢
 廣皮一錢 神糶二錢 麥冬二錢 五味十二粒 秦歸二錢
 澤瀉一錢 黃柏一錢炒 升麻一錢 甘葛一錢 知母一錢
 甘草一錢 大棗、生薑引

理中湯：治傷寒太陰病，自痢不渴、寒多而嘔、腹痛糞溏，脈沉無力，或絕冷拘急，或結胸吐衄及感寒霍亂。

沙參三錢 白朮二錢 黑薑一錢 炙草一錢用土炒，切不可用蜜，
 香降引

（傷風附方）參蘇飲：

沙參 蘇葉 陳皮 前胡 枳殼 桔梗 法夏
 茯苓 甘葛 木香 甘草

（便血附方）歸脾湯：

沙參炙 白朮 茯神 棗仁 遠志 黃芪 木香
 秦歸 炙草 阿膠 紅花



沙 参

金 鐵 鎖

本品为石竹科 (Caryophyllaceae) 植物金鐵鎖 *Psammasilene tunicoides* W.C.Wu et C.Y.Wu.

別名 昆明沙參 土人參 獨丁子 夷方草 金絲矮陀陀

原文 金鐵鎖，味辛辣，性大溫^①，有小毒，吃之令人多吐。專治面寒疼、胃氣心氣疼，攻瘡癰排膿。〔細〕^②末每服五分，燒酒服。

——云南丛书本卷中第5頁

校 ①务、世、李本作“性大寒”，从琴本作“性大溫”。以从琴本为正。

②原作“爲”，据务、世、李本改。

植物形态 多年生平臥蔓生草本。自生于山野，具細柔毛。根独个，呈圓錐形，直徑达12毫米。莖紫綠色，圓柱形，中空，具直立短柔毛，柔脆易断，长达32厘米，从底部两歧分枝。叶小，对生，近于无柄。先端尖銳，基部近圓形，具明显之中肋。上部之叶較大，长15—22毫米，寬7—13.5毫米。下部之叶漸小，終成苞片状，长约2毫米，闊1毫米。叶上面光滑或具稀少細毛，下面除沿中肋外，皆秃淨。夏季开花，花两性，形小，直徑約4毫米，柄短約1毫米，組成頂生之三歧，二出聚繖花序，具头状腺毛。每一部分花序下有二苞片；苞片紙質，上部者具透明邊緣；下部者向花序基部漸成叶状。萼筒狭漏斗形，具15稜及五齿；外部多腺毛，齿具透明邊緣，长4—6厘米。花冠管状钟形，花瓣五枚，紫黃色，狭匙形，长7—8毫米，頂端微凹


或近圓形，基部漸狹，成不明显之爪，无副花冠。雄蕊五枚，分生，对萼片；花絲線形，长7—9毫米；药近圓形，黄色或紫色，背着，长约0.5毫米。子房倒披針形，长约7—8毫米；花柱綫形，二枚，长约3.5毫米；柱头不明显。果实长棍棒形，膜質，半透明，长约7毫米，稜显，宿萼，具有一枚长倒卵形种子，种皮褐色。（見附图金鐵鎖）

药用部分 根

附註 图考：“昆明沙參即金鐵鎖。金鐵鎖生昆明山中，柔蔓拖地。對葉如指，厚脆僅露直紋一縷。夏開小淡紅花，五瓣極細，獨根橫紋，頗似沙參，壯大或如蘿蔔，亦有數根攢生者。”

图譜云：“本屬一種，產滇省西部(麗江、永寧、永北)及東北部(東川、昆明)沿金沙江各支流諸山中溫暖地帶，海拔2,600公尺至3,200公尺，喜生松林內，沙質、石灰質，荒地或山坡。花期六至九月，果稍后成熟。”

图考所述金絲矮坨坨，观其形性，非金鐵鎖，故系同名异物。



金 鐵 鎖

葳 參

本品为百合科(Liliaceae)植物葳蕤Polygonatum officinale All.

別名 葳 委萎 女萎 葳蕤 玉馬 地節 蟲蟬 烏萎 玉竹 馬薰
萎香 玉朮

原文 葳參，一名玉朮。味甘、微苦，性平、微溫，入脾補氣血，補中健脾①。脾經多氣多血，故氣血雙補。脾胃爲人之總統②，後天根本，貫漑經絡，長養百骸③。脾胃盛而資以爲生者是也。蒸露三次晒乾。

(單方) 治男婦虛症，肢體酸軟，〔自汗、盜汗〕④。

葳參五錢 丹參二錢五分 不用引，水煎服。

(補註) 此方之義，效古書八珍湯。葳參補氣，丹參補血。

——云南丛书本卷上第1頁

校 ①务、世本作“補中氣健脾胃”。

②从本作“摠統”，依务、世、翰本改。

③从本作“百體”，依务、世、翰本改。


④从本无“自汗、盜汗”一句，依务、世、翰本增。

植物形态 多年生草本，自生于山地、原野，或栽培于庭园。根莖圓柱形，黃白色，有結节。莖斜生，綠色染以紫斑。叶互生，橢圓

状披针形，长4.5—7.6厘米，寬1.4—2.5厘米，先端銳尖，基部近圓形，全緣；叶脉三出，上面翠綠色，有光澤；下面色較淡，两面均光滑无毛。叶柄扁圓柱形，长5—9毫米，上面有槽，有时有紫点。春夏間，叶腋生一二花，生于长1—6毫米圓柱状花梗上。花两性，輻射对称。花被为钟形，直徑1.2—1.5厘米，下垂；裂片通常6枚，肉質，白綠色。內面先端有紫褐色卵圓形小点，长约1.1厘米，寬約4毫米。先端短尖，排列成明显而相似的2列。雄蕊6枚，着生于花被喉部鱗片上；花絲連合。雌蕊1枚，子房上位，卵圓形，直徑3毫米，3室。花柱单一，扁圓形，长约2毫米；柱头上有小突起。果为浆果，圓形，成熟后暗紫色。（見附图葳參）

葳用部分 根 莖

附註 图考：“近時所用萎葳通呼玉竹。以其根長白有節如竹也。與黃精絕不類。其莖細瘦有斑，圓綠叢生，葉光滑深綠，有三勒道，背淡綠凸文。滇南經冬不隕。逐葉開花，結青紫實，与爾雅異。”



歲 參

蘭 花 參

本品为桔梗科 (Campanulaceae) 植物 *Wahlenbergia marginata* (Thbg.) D.C.

別名 細葉沙參 娃兒草 玩兒草 乳漿草 雛桔梗 藍花草 拐棍參

原文 蘭花參，味甘、微苦^①，性溫^②。入心脾二經〔甘入脾、苦入心〕^③，補虛損，止自汗、盜汗，除煩熱^④，〔蓋〕^⑤煩勞則心家虛熱生〔焉〕^⑥。以參^⑦之甘益元氣，而虛熱自除也^⑧。夜多不寐^⑨，睡臥不寧。心生血，脾統血，心脾血虛，神不斂志，所以自汗、盜汗也^⑩。〔能生血，使脾健而統血。心神散亂者，服之最良〕^⑪，〔婦人服此，白帶自止，陰血漸旺，久服延年〕^⑫。

〔滇中亦有此一種土參，性溫、味甜平、無毒。功效次於人參。亦補腎添精，滋陰降火而調和元氣。五勞七傷，諸虛百損，服之最良〕^⑬。

（單方）治勤苦勞心，產後失血過多，虛損勞傷煩熱，自汗、盜汗、婦人白帶^⑭。

蘭花參五錢 筍雞一隻^⑮去腸，將藥入雞腹內煮。共合一處，煮濫食之。即猪淨腎肉亦可^⑯。

——云南丛书本卷上第1—2頁

校 ①范本作“氣味甘苦”。

②范、务、世、翰本作“性平”。

③此二句据范、务、世、翰本补入。

④务、世、翰本作“除虛熱”。

⑤⑥此二字据务、世、翰本增。

⑦“參”字，务、世、翰本为“味”。

⑧“除”字，务、世本作“退”。

⑨务、世本作“夜多夢寐”。

⑩此段务、世本作“睡臥不安，心神不定，神不守舍，血氣不斂，故多自汗、盜汗”。翰本作“心生五液，心血虛，神志不斂，故多自汗、盜汗”。琴本作“虛損勞傷煩熱，自汗、盜汗”。

⑪⑬两段据范本增。

⑫原作“止婦人白帶”，据范本增改。

⑭单方一段原列葯剂后，依文意及参照务、世本移于前。

⑮务、世、翰本作“嫩母雞”。

⑯务、世本作“惟弱極者，同牙猪精肉燉用亦可”。

植物形态 多年生小草本，高达30厘米，内部具微粘乳白色汁液，多匍匐地面斜升。根黄白色，圆柱形。莖柔細，具稜及細縱沟，色綠。叶互生，近于无柄，紙質，綠色。叶长橢圓状斜卵形至匙形或綫形等，长达25厘米，寬达5毫米，頂端尖銳 基部漸狹，具稀少短柔毛，叶緣疏生淺鋸齿，中脉較显。聚繖花序頂生或對叶生，长3—8厘米。花鐘形，淺藍色，徑达14毫米。萼筒倒圓錐形，萼片披針状三角形，长约2毫米，色綠。花冠筒高約8毫米，筒內基部疏生毛茸；裂片五枚，倒卵形，頂端漸尖，长6毫米，顏色較淡。雄蕊五枚；花絲长约1.5毫米，基部寬，兩緣具睫毛，合抱向內复盖子房的頂部；花葯长橢圓形，淺藍色，长约2.5毫米，先雌蕊成熟，开花时脫落。子房下位，三室；花柱圆柱状，长3毫米；柱头三裂，略帶藍色而多毛。蒴果倒圓錐形，长约4—6毫米，徑約2—4毫米，宿萼，其頂部寬圓錐

形，以三裂片开裂。种子细小，亮褐色，椭圆形，长约0.5毫米，具极细而短之纵条纹。（见附图兰花参）

药用部分 根

附註 图考山草收“细叶沙参”，惟有图无说。滇南本草图谱云：“兰花参当作蓝花参，兰蓝音同致误。蓝花盖指其花色，参则指其功效耳。易门土名蓝花草是其证。”范本所绘蓝花参图，形似兰花，与现绘之标本不同。



蘭花參

紫 參

本品为唇形科 (Labiatae) 植物 *Salvia japonica* Thunb. var *Parvifoliola* Hemsl.

別名 紫丹參

原文 紫參，味苦、甘平，性微溫，通行十二經絡。〔治〕①風寒溼痹、手足麻木、腿軟戰搖、筋骨疼痛、半身不遂、久年痿軟、〔遠年〕②流痰。

〔爲〕③活絡強筋、溫暖筋骨藥酒方中要劑。

〔舒〕筋活絡〔藥〕酒方④。

紫參三兩 秦歸二兩 川芎一兩 葳靈仙五錢 桑寄生五錢
秦艽五錢 川牛膝五錢 老鶴草五錢 桂枝五錢 〔陳〕⑤ 木瓜
一兩 防風五錢 薏苡仁五錢 陳皮一兩 胆南星三錢 好酒六斤
(布袋貯藥浸酒內)⑥，重湯煎三柱香時，冷去火毒，每飲三杯。

——云南丛书本卷上第4—5頁

校 ①据图考增。

②据琴本增。

③据务、世、翰、琴本增。

④原作“筋骨活絡酒方”，据务、世、翰本改。


⑤⑥据务、世、翰本增。

植物形态 多年生草本，高約15—40厘米，全体被白色長柔毛。

主根圓柱形，側根呈圓錐形，上生多數細根，表皮暗紅色。莖直立方形。葉自根部叢生，羽狀分裂或偶亦有單葉，葉柄長2—10厘米；裂片以居先端者最大，廣卵形或心臟卵形，長1—8厘米，寬1—5厘米，肉質，厚而粗糙，先端鈍圓，基部心形，邊緣有圓鋸齒，上面暗綠色，下面綠紫色。莖生葉形同而略小。春夏間開花；排列成穗狀花序。花唇形，藍紫色，長約2—3厘米，2—6朵成輪。下有對生苞片6枚，居中2枚最大，倒卵形，先端2裂，長2.5—6毫米，寬1—2毫米；兩側苞片較小，呈綫形。花梗短。花萼管狀，2唇形，長約1厘米；上唇全緣，倒卵形；下唇2裂，裂片呈銳三角形，內光滑，外有細刺毛，具10—13肋。花冠唇形，有細毛，上唇全緣，下唇闊3裂，邊緣成囊狀包雄蕊；中裂片頂端有凹缺。雄蕊4枚，2枚退化。雌蕊1枚，子房上位，4裂，下有黃色密腺；花柱一枚，長約3厘米，伸出上唇外；柱頭微彎，呈叉狀。果4枚，略呈長三稜形，褐色，表面疏生有細長白色絲狀毛，長約2毫米。（見附圖紫參）

藥用部分 根

附註 圖考謂：“唐本草註：紫參葉似羊蹄，牡蒙葉似及己，乃王孫也。圖經又謂莖青細，葉似槐葉，亦有似羊蹄者。五月花白色，似蔥花；亦有紅如水荳者。蓋有數種。滇南山中多有之，與圖經同。其如水荳者，蓋作穗色粉紅相似，花仍類丹參輩。如蔥花者，梢端開細碎白花成簇，實似水芹蛇床等葉。比槐葉尖長，莖葉同緣。根鮮時不甚紫。近時方書少用。”下引滇本草原文從略。圖考既收紫參于山草類，又于蔓草類別著“滇紫參”。謂“滇紫參即茜草之小者。四葉攢生而無柄，與此稍異。”



紫 參

苦 參

本品为蝶形花科 (Papilionaceae) 植物苦參 *Sophora flavescens* Aiton.

別名 苦骨 地槐 水槐 菟槐 驕槐 野槐 白莖 苦蕒 虎麻 岑莖 綠白 陵郎

原文 苦參，味苦，性大寒，涼血，解熱毒，疥癩膿瘡瘡毒最良。療皮膚瘙癢、血風癬瘡、頑皮白屑、腸風下血便血。消風、消腫毒、消痰毒。

(補註) 苦參丸，治疥癩瘡毒，血風癬瘡，風溼相搏，遍身瘙癢，腸風下血便血①。

苦參四兩 玄參一兩 黃連五錢 酒〔大〕黃②一兩 枳壳一兩 防風一兩 黃芩五錢 〔梔子五錢〕③ 菊花一兩 共爲細末，蜜丸，每服二錢，滾水下④。

——云南丛书卷上第6頁

校 ①原有“近血”二字，据务、翰、琴本刪。

②“大”字据务、翰、琴本增。

③据琴本增。

④务、翰本苦參丸方藥物及分兩略有不同。計：

苦參一兩	牛膝四兩	黃連五錢	獨活一兩	酒炙條芩五錢
防風一兩	枳壳一兩	酒大黃一兩	梔子五錢	菊花一兩

植物形态 落叶灌木，高至1米以上。根黃色，常分叉，味苦。

小枝綠色，具不規則縱溝，密生黃色細柔毛。葉互生，奇數羽狀復葉，長15—21厘米，柄上生細絨毛。小葉11—21枚，對生或互生，卵狀橢圓形至披針狀長橢圓形，全緣或波狀，基部鈍狀，先端鈍或銳狀而呈針鋒形，長1.5—4.5厘米，寬8—15毫米，上面綠色，平滑無毛，下面蒼綠色，生有細伏毛。小葉柄長2—3毫米，密生黃色細毛。六月開花，頂生及腋生總狀花序；花軸及花梗均密生黃色短柔毛。花黃白色。苞片綫形，長約1厘米，密被細毛。花萼鐘狀，偏斜，長約8毫米，邊緣波狀五淺裂。旗瓣先端略圓而反捲，長約12毫米，寬約6毫米，翼瓣長5毫米，柄長約4毫米；龙骨瓣與翼瓣等長，先端連合。雄蕊10枚，有毛，基部愈合。雌蕊1枚，上位，密被絨毛，花柱紮細，柱頭圓形。莢果念珠狀，長5—11厘米，具毛，先端具長喙，成熟後不開裂。種子2—6枚，黑色，略圓（見附圖苦參）

藥用部分 根

附註 務本卷二：苦參通治：

熱症，狂言結胸，用苦參切細五錢，微炒水煎，連進數服，不拘有汗無汗皆愈。

傷寒四五日，頭痛壯熱，胸中煩痛，宜用苦參五兩，烏梅二十個，以水煎下。

傷寒三四日，已經嘔吐，更宜吐之。用苦參爲末，每服二錢，以酒送下，得吐即愈。

瘟疫四五日，結胸滿痛，用苦參一兩，以醋二碗煮至一碗，盡飲得吐即愈。凡天行病非此不解，宜蓋被發汗自愈。

瘡疥，用苦參切炒，待烟出盡，取起研爲末，米湯送下。

發背痔瘡，用苦參炒爲末，以水丸如桐子大，每服三錢，熱酒送下。

腸風瀉血并血痢，用苦參炒帶烟爲末，以米湯送下或水丸（校者案：原作“水丸”，誤）吞下亦可。

卒心痛及飲食中毒，用苦參一二兩，好酒煎稠汁，乘熱分作二次服下。

楊梅癩風，大麻風等症，用苦參半斤，浸酒十五壺，春冬浸一月，秋夏浸十日，早晚開服，大治瘡科之聖藥。平居無病，服此能治內熱，補心養氣，消一切風毒。常服止十斤可也。

二仙丸：用酒、苦參（校者案：原作苦草，誤）蓼草二味，等分杵爲末，醋糊丸如桐子大。每服八九十丸，量人大小加減。凡一切病之有食者，以草菓湯送下；如無食而當發散者，以薑湯下。此能治百病，無所犯，亦無所忌。



苦 参

大 薊 小 薊

本品为菊科 (Compositae) 植物 *Cirsium chlorolepis* Petrak.

別名 雞足刺 雞足刺根 薊刺根 雞刺根 青刺薊

原文 大薊^①，一名雞脚刺^②。味苦〔辛〕^③、微甜，性溫。入肝脾腎三經，消瘀〔血〕^④、生新〔血〕^⑤，止吐血、鼻衄、小便尿血、婦人〔紅〕崩〔下〕血^⑥。生補諸經之血。消瘡毒，散癭癥結核，久不能收口。〔生肌排膿〕^⑦。

〔單方〕〔治婦人室女遇經行日發動怒氣〕^⑧，有血滲流入脾經，血分水份受病，兩脚腫脹麻木，腿上〔起核紅紫，或起紅紫斑痕〕^⑨。

香附一錢 大薊三錢 大腹皮一錢 黃芩二錢^⑩ 葳靈仙二錢 水煎、水酒點、臥時服。

〔又方〕治婦人紅崩下血、白帶不止，良效。大薊五錢 土艾葉三錢 白雞冠花子二錢 木耳二錢 炒黃柏五錢 (如白帶，不用黃柏)。引水酒煨服^⑪。

〔又方〕治婦人乾血癆，或肝癆惡寒，發熱頭疼，形體消瘦，精神短少。

〔新鮮〕大薊二兩^⑫ 〔黃〕牛肉四兩^⑬ 〔共入罐內煮爛〕^⑭，天明吃畢後〔復熟睡，忌鹽，數服即愈〕^⑮。

(又方) 治男子尿血〔血淋下血〕^⑩，疼痛不忍者效。

大薊三錢 蒲公英二錢 豬棕草一錢 必提^⑪珠根三錢
柳樹根二錢 水煨點水酒服^⑫。

(又方) 治結核於項左右，〔或栗子瘡〕^⑬ 紅腫潰濫〔出膿久不收口者〕^⑭ 獨根大薊〔不拘多少或煮水牛肉、或豬肉，或單用，煨點水酒服，半月收口全愈。外用新鮮大薊，搗爛入胎髮灰、兒茶，血竭同拌，敷瘡口，生肌立效〕^⑮。

——云南叢書本卷中14—15頁

大薊，高尺餘，二月生苗，開紅、藍花，有刺。處處有之，俗呼爲青刺薊。氣味甘溫，無毒。主治女子赤白沃，安胎，止吐血鼻衄。令人肥。搗汁止崩中漏下立瘥。葉，治腸癰、腹臑、瘀血作暈，撲損、生研酒下或童便亦可。又治惡瘡疥癬，同鹽研罨之。

——范洪“圖說”卷四第31頁

- 校 ①原作“大計”誤，據務、世、翰、琴本、圖考改。
②原題下尙有“小薊，庾葉黃花”，茲剔出另列。
③④⑤據務、世、翰本增。又止吐血之“止”字。原誤作“上”據務本改。
⑥原作“新崩之血”，據務、世、翰、琴本改。
⑦據務、世、翰本增。
⑧原作“行經動怒”，據務、世、翰本改。
⑨原作“起紫紅斑”，據務、世、翰本改。
⑩翰本无黃芩，作“炙黃耆”，丛、務、世、琴本作黃芩。

⑩ 翰本此方多“香附一錢”。

⑪ 原作“大薊一兩”，据务、世、翰本改。

⑬ 丛、琴本作“水牛肉”，据务、世、翰本改。

⑭ 原缺，据务、世、翰本增。

⑮ 原作“臥忌鹽”，据务、世、翰本改。

⑯ 原缺。据务、世、翰本增。

⑰ 原誤作“鼻涕”，改作“必提”。

⑱ “猪棕草”务本作“猪宗毛”，“柳樹根”务、翰本作“柳枝”。

⑲⑳ 原缺，据务、世、翰本增。

㉑ 此段原作“點水酒服半月，外用胎髮燒灰，血結，兒茶厭之”。錯脫多字，詞意不明，据务、世本补入，其中“胎髮”翰本作“頭髮”。

植物形态 多年生单头粗大草本，自生田野荒地沟边，高可至80厘米。塊根細紡錘形，多枚簇聚，皮平滑，黃色，肉白色。莖棒圓，白綠色，中空，表面有極多淺槽，槽上生短白剛毛。叶互生，根出叶冬春貼地成叶簇，莖生叶愈上愈小，終成苞片狀，均几乎无柄。叶片輪廓为披針形，长10—40厘米，寬3—8厘米，有奇数羽狀缺刻。叶質厚，紙質，上面深灰綠色，暗而不光澤，多生短剛毛；下面色淡，只脉上有同式毛，或較短柔；两面均密生白色小乳突。上面脉稍下陷，常皺縮；下面大脉隆起，小脉均不显。缺刻边缘均生硬短剛毛。裂片对出，扭曲而直立，通常稍前傾，长达3—4厘米，寬2.5—3厘米，复作不規則之3—5裂。次級裂片向上者較大，寬橢圓形至长橢圓形不等；中央一片通常綫形，各裂片先端具刺。春夏，枝頂及近頂之叶腋中开头狀花序，多数，垂俯，直徑3—5厘米。总苞片8—13圈，最外者成叶狀，向內漸成綫形，最長者长1.5厘米，均白綠色，密生短剛毛，最內者漸近于无毛。花托倒圓錐体形，高約1厘米，白色，表面具極多小陷穴，陷穴間密生白色不分枝长硬毛。花全为管狀，长

約3.5毫米，冠毛白色，花冠管狀，長約2厘米，淺黃紫色，上部五裂成暗紫色，齒狹披針形，長4毫米。雄蕊五枚，長6毫米，遍生短柔毛；花藥合藥，綫形，花藥基部生數根向下之硬毛。子房扁卵形，禿淨，具黃色直斑；柱基蜜墊狀，花柱柱狀，長不及3厘米；柱頭黃白色，二裂。瘦果扁，長卵形至扁長橢圓形，長0.5厘米，寬約0.2厘米，冠毛易脫，果皮堅而光滑。（見附圖大薊）

藥用部分 根

附註 圖考引救荒本草謂：“大薊，葉可燻食，根有毒”。

又云：“滇南生者，高出人上。療瘡者，餌根比參耆焉。貌猙獰而質和淑，下堂執手，射雉始笑，不聆其言，觀其枝，惡乎知之。”吳氏狀物洵能盡大薊之妙。

圖譜云：“本種滇省昆明一帶通呼雞腳刺 或薊刺根（或本作雞刺根）。鄉婦每於農閒時十二月間，採根背負入市，常與同科之萬丈深同售。”又敘述本種之分布“爲昆明一帶之特產，多生四野荒地，溝洫邊沿尤爲常見。四月至七月，花隨結實後，着花之莖，卽就枯萎。”

原文 小薊^①，庾葉黃花^②。

——云南叢書本卷中15頁

小薊，二月生苗，高二三寸許，開紅藍花。有刺，俗呼爲雞腳刺，處處有之。氣味甘溫，無毒。根養精保血，破宿血，生新血，暴下血。金瘡或血崩，搗汁服之立瘥。作菜食，除風熱。夏月煩熱不止，取汁服之可解。

——范洪“圖說”卷四第31頁

校 ①滇本草各本小薊，均附列于大薊一目內。未別出。

②“庾葉黃花”務、世本作“葉嫩色黃”，翰本作“瘦色黃”，琴本作“庾葉黃色”。



大 薊

白 芨

本品为蘭科 (Orchidaceae) 植物白芨 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb.

別名 白芨 甘根 連及草 筭蘭 苻蕒 紫蕒 紫蘭 雪如來 朱蘭 白根 竹粟膠 大白芨

原文 白芨，味辛平，性微溫^①。治癆傷肺氣，補肺虛^②，止咳嗽，消肺癆咳血，收斂肺氣。

——务本堂本卷三第40頁

校 ①务世本原作“性微溫 味辛平”。依全书編例改。

②李本作“補肺氣虛”。

植物形态 多年生草本，自生石山上，湿润多苔石缝中。高約30—50厘米。块莖扁圓球状，三角形。皮綠白色，肉粘多粉，皮上有圓形节紋2—3圈，节上生黃白色鬚状不定根。頂芽一，側芽2—3，自块莖頂出。先发育为肉質短圓柱状橫出之地下莖，后抽叶及莖。莖一枝，自叶中直出 纤细，棒圓，綠色。叶2—6枚。下部鞘状。叶片下部抱莖展开而向上，长披針形，无毛，全緣，长18—45厘米，寬2—5厘米，先端尖，向底漸成对摺。大脉9—13根，成摺扇骨状，細脉无数。夏天莖頂出总状花序，着花4—11朵，花紫水晶色，略俯首，直徑3—4.5厘米。苞片小，长方状披針形或匙形，早落。萼片3枚，分离，长约3.5厘米，寬7—8毫米，中1枚略窄，均有色，呈长橢圓状披針形，先端銳。花瓣側二枚，全同側萼片；舌瓣白，略紅紫，着生雌雄蕊柱之基部，寬长方形 向基部作寬楔形，长2.5—3厘米，寬1.5—1.8厘米。上部三裂，內面具橙黃色縱起波状細帶五条，

自基部起平行向前至中裂近头而止，边具細波状缺刻，側裂斜长形，中裂长方形，頂端凹入或平截，长5—7毫米，寬4—8毫米，裂片的边均具有細波状皺紋。中柱稍向前曲，兩側有翅。花絲长不及1毫米，囊隔突出花粉中，向下。子房下位，略具綫稜，連甚短之花梗，全长1—2.5厘米。蒴果紡垂形，略具六稜，长约3.5厘米，頂冠以宿存殘缺柱基。种子极多，微尘状。（見附图白芨）

药用部分 块莖

附註 图考云：“黃元治黔中雜記謂：白芨根，苗婦取以浣衣，甚潔白，其花似蘭，色紅不香，比之箐雞羽毛，徒有文采，不適於用。噫！黃氏之言，其以有用爲無用，以無用爲有用耶？白芨爲補肺要藥，磨以膠盞，堅不可坼；研朱點易，功並雌黃。既以供濯取潔，又以奇豔爲容，陰崖小草，用亦宏矣。”（下略）

图譜录白芨，有詳尽之考証。又云：“多生石山上，濕潤多苔石縫中。五六月花，八九月實熟。滇省蒙自一帶有之，可達2,000公尺海拔，花期稍遲。”



白 芨

何首烏

本品为蓼科 (Polygonaceae) 植物何首烏 *Polygonum multiflorum* Thunb.

別名 交藤 交莖 夜合 地精 陳知白 馬肝石 桃柳藤 九真藤 赤葛 瘡帚 紅內消 野苗 山奴 山哥 山伯 山翁 山精 金香草 夜交藤

原文 何首烏，味微甘，性微溫^①。古本草註云：久服延年耐寒，且味澀苦。入腎爲君，澀精，堅腎氣。止赤白便濁，縮小便。入血分，消痰毒。治赤白癩風^②，瘡疥頑癬，皮膚瘙癢。截瘧，治痰瘧。^③

(附方) 治赤白癩風^④。

何首烏 苦參等分，酒洗，共爲細末。用皂角水泡，竹刀披開，〔取〕^⑤ 濃汁爲丸。

(又方) 治痰瘧。

何首烏 黑豆^⑥ 煎露一宿，次早煨熱，朝太陽服效。

(又方) 治寒熱往來虛瘧。

法半夏一錢 白茯苓三錢^⑦ 何首烏一錢炙 生薑一片 水煎露一宿，次早煨熱，朝太陽服。此方治瘧，以七天後可用。中氣虛者良效。若初病風邪未消，痰火不清，〔飲食不消〕忌用^⑧。

- 校** ①原作“性微溫，味微甘”，依全书編例改。
- ②④原作“癢風”依丛、李本改。
- ③从本缺味性療效一段。又在方剂之前有：“七寶丹、用首烏補腎”之句，詞意不明，未采用。
- ⑤“取”字据李本增。丛本作“将涎涎剔下爲丸”。
- ⑥从本作“何首烏，墨汁煎每用三錢”，无“黑豆”李本无此方。
- ⑦从本作“二錢”。
- ⑧原作“痰食不清，食之不改散忌用”詞意不明，据丛本改。

植物形态 多年生宿根纏繞草本，自生于山野。具橫走地下莖，地下莖具节，节上生块根。块根大小不一，外面赤褐色或暗褐色，平滑或隆曲，內为白色。莖为綠色或紫色的圓柱状纏繞莖，左捲或右捲，无毛。单叶互生。托叶鞘抱莖，透明白色至帶褐色。老时多破損。叶卵状心臟形，长2—12厘米 寬1.4—9厘米，先端漸尖或銳，基部近戟形，或心臟形，上面綠色，下面帶灰白色，两面具小乳突；側脉每側4—6，尖端鎖連，全緣或略呈波状。叶柄长1—6厘米，上面平而具淺槽。秋日开花，花多数排列为腋生及頂生圓錐花序，分枝极多。枝纤细，直徑仅2毫米，有細柔毛。花梗基部有叶状苞片，总花梗与分花梗之节亦具托叶鞘。花萼于基部下延以成花梗；萼片外圈三枚較大，倒卵形，先端微內弯，脊上具縱翅，內圈二枚較小，长倒卵形，无脊翅。花冠缺。雄蕊8枚，內三个稍长、花絲絲状，基部扩大，药卵形。子房橢圓状三角形；花柱短，柱头头状，三裂，宿存。坚果卵形，全体包被于宿存的花萼內，长约4毫米，具三稜，表面平滑，黑色而光亮。（見附图何首烏）

药用部分 主用其块根 枝叶亦可供药用

附註 图谱收录何首烏，有詳尽之考証。并謂图考所云：“滇南大者數十斤，風戾經時，肉汁獨潤者，今殊不可見。或誤以市售之葛根爲本種之根耳。”又云：“多蔓延叢薄籬落牆壁間，甚常見。在滇省以七至九月花，十月實熟。”



何首烏

鹿 竹

本品为百合科 (Liliaceae) 植物 *Polygonatum kingianum* Coll
S Hemsl.

别名 兔竹 生薑 黄精 救窮草

原文 鹿竹①，一名兔竹。味甘，性平，無毒。根如嫩生薑色，俗呼生薑。藥名黃精，洗淨，九蒸，九晒，服之甘美。俗亦能救荒，故名救窮草②。主補中益氣，除風濕、安五臟。久服輕身延年，不飢。治五癆七傷，助筋骨，耐寒暑，益脾胃，開心肺。能辟穀、補虛、添精，服之效。

——务本堂本卷一上第35頁

校 ①此藥仅务本收录，世本重印內容相同。

②原有“仙家多用”一句，茲略去。

植物形态 多年生草本，高約1米。地下部有根状莖，呈块状，常串联而生，黃白色，上具多数鬚根。地上莖略呈肉質，綠色，禿淨，圓柱形。叶3—5枚輪生，近于无柄，綫状披針形，長約5—10厘米，先端尖而捲曲，基部狹楔形，中脉明显，在下面隆起。花1—3朵生于叶腋間，花梗長約1—2厘米。花風鈴状，常下垂，淡綠色。花被合生。雄蕊6枚，生在花被管上，花絲极短。子房3室，花柱直立，柱头三枚。果圓球形，徑約10—15毫米，熟則呈橙黃色，內具种子多枚，种子近于圓球形。（見附图鹿竹）

藥用部分 地下莖

附註 图考：引救荒本草：“黃精苗，俗名筆管菜，一名重樓、一名菟竹、一名雞格、一名救窮、一名鹿竹、一名萎蕤、一名仙人餘糧、一名垂珠、一名馬箭、一名白及。生山谷，南北皆有之。嵩山茅山者佳。根生肥地者，大如拳；薄地者，猶如拇指。葉似竹葉，或二葉，或三葉，或四五葉，俱皆對節而生。味甘，性平，無毒。又云：莖光滑者，謂之太陽之草，名曰黃精，食之可以長生。其葉不對節，莖葉毛鉤子者，謂之太陰之草，名曰鉤吻，食之入口立死。又云：莖不紫、花不黃爲異。”吳其濬謂：“按圖卽尔雅委萎，滇南所產黃精頗似之。此正鉤吻相似者。”又图考黃精一條謂：“滇南山中，尤多黃精，辨別黃精鉤吻之不同甚詳。”又图考山草收有“滇黃精”謂：“与湖南所產同而大，重數斤，俗以煨肉，味如山蕕。莖肥色紫，六七葉攢生作層。初生皆上抱，花生葉際，四面下垂如纓絡。色青白，老則赭黃。此種与鉤吻極相類，滇人以其葉不反捲，芽不斜出爲辨。按救荒本草鉤吻黃精，莖不紫花不黃爲異。今北產莖綠，滇產莖紫，又惡可以此爲別。大抵北地少見鉤吻，故皆言之不詳。”录此以备考。



鹿 竹

千針萬綫草

本品为石竹科 (Caryophyllaceae) 植物 *Stellaria yunnanensis*

Fr.

原文 千針萬綫草，味甘，性微溫。補〔肝〕^① 脾胃。陰〔虛血〕^② 弱、神氣短少、頭暈、耳鳴、心慌、目中起翳生花、五心煩熱，午後怕冷，夜間發熱、小肚脹墜，腰疼脚酸，步行艱難，婦人白帶漏下淋瀝等症。調養精神，補養腎肝，任督二脈虧損，婦人虛弱要藥。

（單方）婦人白帶日久，頭暈、耳鳴、腰疼、夜間發熱，精神短少，飲食無味，治效。

千針萬綫草_{三錢} 水牛肉_{三五兩} 煨吃〔三四次效〕^③

——云南丛书本卷中第1頁

千針萬綫草，形軟枝碎葉，根似菊花參之根。一撮肥而白。又似百部，一條一條，氣味甘平無毒。主治：補肝、健脾，養腎，生血合血，退五熱，降火，止耳鳴，心神不寧。能升能降，婦人最良。採服止咳血良效。

——范洪“圖說”卷三第11頁


校 ①“肝”字据务本增。

②原作“陰血虛弱”，据李本改。

③原作“煨吃好”，据务本，李本增。

植物形态 多年生散生草本，自生于山林地带，长50—90厘米。根丛生，中部多膨大成棱形，外部黄棕色。莖圆柱形，秃净，节间长1.4—2.8厘米。叶无柄，对生，线状披针形至卵状披针形，长1.6—3.7厘米，宽2—7毫米，先端尖或长尖，基部钝形，只主脉明显；上面绿色，主脉略凹下，下面粉绿色，主脉凸出，全缘。二歧聚繖花序出于莖或枝的顶端，花序大，长28厘米左右。总花梗长3—5厘米。苞片二枚，披针形或卵状披针形，长3—6毫米，宽约1毫米，膜质。花萼5，分离达基部，披针形，边缘膜质，中间具三条绿色脉。花瓣五枚，白色，深二裂达基部；裂片椭圆形，较萼片短且身萼片互生。雄蕊8—10枚。雌蕊1枚，花柱3，分离。果为蒴果，卵圆形，长约5毫米，5齿开裂，外有宿存萼片。种子小，棕色，有稜角，上具突起。
(見附图千針萬綫草)

药用部分 根



千針萬綫草

香 附

本品为莎草科 (Cyperaceae) 植物 *Cyperus rotundus* Linn.

別名 藹 藹 侯莎 地毛 莎草 夫須 抱靈居士 抱雪居士 月萃 哆
三稜草 雀頭香 草附子 水香 稜 水巴戟 水莎 莎結 續根草 雷公頭
地籟根 水三稜

原文 香附〔味辛，性微溫^①，調血中之氣也。則有推行之意^②，開鬱氣而調諸氣，寬中消食，止嘔吐，和中養胃，進食。氣血調而陰陽固守，憂鬱開而疾病不生。開鬱調氣要藥，女人之至寶也〕^③。

(補註) 先賢製十珍香附丸。

大理府香附十四兩，每份二兩，分爲七份。

一份用童便浸，童便滋離中之陰也。

一份用好酒浸，好酒行經絡。

一份用醋浸，醋開鬱，消瘀血，順氣。

一份用鹽水浸，鹽水清坎水。

一份用茴香湯浸，滋腎水，補腰膝。

一份用益智仁湯浸，上行煖胃，下行補腎強志。

一份用蘿蔔湯浸，消痰，消食積也。春浸二日，夏浸一日，秋浸三日，冬浸五日^④。製畢焙乾，以香附爲君^⑤ 加：

藪艾四兩〔熟〕地四兩^⑥ 人參二兩 歸身四兩 阿膠二兩

撫芎二兩 淨棗仁二兩(炒)⑦ 白茯苓二兩 白朮二兩(土炒)
 天冬二兩五錢 縮砂仁二兩五錢 淮山藥二兩 橘紅一兩⑧ 玄胡
 一兩五錢⑨(醋炒) 黃芩二兩五錢(酒炒) 益母草四兩(炙)
 甘草九錢 以上俱上好之藥，如法炮製，共爲末，水
 酒煮神麩湯，煉蜜爲丸⑩。每服三錢，白滾湯送下。

——云南丛书本卷下第18—19頁

校 ①务本原作“性微溫，味辛”。据全书編例改。

②李本作“條達水之相也，肝苦急，急則有推行之意”。

③此段味，性疗效，丛本缺，据务本增。

④务、世本作“春秋浸三日、夏一日、冬五日”。

⑤务本作“以好酒煮黑豆爲君”。

⑥原作“生地”，据务、世、李本改作“熟地”。

⑦“炒”字据务、世本增。

⑧务、世、李本作“二兩”。

⑨务、世、李本作“二兩五錢”。

⑩务、世、李本作“共爲細末，煉蜜爲丸，或酒煮神麩爲丸”。

植物形态 多年生草本，地下有匍匐莖，其先端具块莖。莖通常单直立，三生‘稜形，高10—60厘米，表面光滑，綠色。叶由莖的基部丛出，三面排列，叶片綫形，长与莖相等或过之，寬2—8毫米。先端尖，全緣。具平行脉，中肋于背面稍隆起。叶鞘短于叶片。6至7月間开花，穗状花序，繖状出于莖的頂端，3—8枚，下有叶片状的总苞3—6枚；通常居中的一穗状花序最短，或近于无柄。小穗成总状或繖状排列，綫形而扁，长1—2.5厘米。鱗片相对排列，赤褐色，广卵圓形，先端鈍 带膜質而色淡綠，背面光滑，赤褐色，中央有数条平行脉較显明，基部兩側下延成白色薄膜而抱于小穗軸上。每鱗片內着生一

花；花两性，无花被，通常小穗基部的二鳞片内及顶端1—3鳞片内之花不发育。雄蕊3枚，药线形，长约2毫米，基着。雌蕊1枚，子房椭圆形，柱头三裂，较花柱稍长，伸于鳞片之外。果实为瘦果，倒卵状长圆形，呈三稜状。（見附图香附）

药用部分 块茎

附註 医門要卷四：“寒症胃脘疼，良薑、香附、枳實、神糲、法夏、台烏、砂仁。舌白者加黑薑治之。白厚者加黑附。”



香 附

白 龍 鬚

本品为蘿摩科 (Asclepiadaceae) 植物 *Tylophora ovata* (Lindl.) Hook.

別名 白微 小白微

原文 白龍鬚，一名白微^①。味苦澇，性微溫。專治面寒疼、肚腹酸痛、跌打損傷、筋骨疼痛^②。

(單劑) 或爲末，每服二錢^③燒酒送下，水煎點酒服亦可^④。

——云南丛书本卷中第5頁

校 ①务、世本作“白薇”。

②务、世、李、琴本无“跌打損傷，筋骨疼痛”两句。

③务、世、李本作“一錢”。

④务、世、李本作“燒酒爲引煎服”，琴本作“燒酒下”。

植物形态 多年生草本，高約45厘米。根多数；細长，圓柱形，外部淡黃白色。莖直立，圓柱状，具棕色短毛，梢端往往伸长成蔓状，卷絡他物上，并密布灰白色短毛。叶对生，柄短，約4毫米，具灰白色短柔毛。叶闊卵圓形或闊橢圓形，长4—7厘米，寬2.1—5.1厘米。先端具短尖，基部鈍或圓，上面綠色，沿脉疏生短柔毛，下面淡綠色，具疏短柔毛，全緣。夏天自叶腋及梢头抽花梗，簇生繖形花。花小，萼片5深裂。花冠繖状，5裂。裂片通常反卷，有一层鈎状副花冠，較花药为短。雄蕊5枚，着生花冠管基部，花絲形成雄蕊冠，頂端具膜質附属物。花粉块球形，沒有細小膜質的尖端。子房上位，

包于雄蕊柱內。花柱2枚，联合成一盘状柱头。果为尖角状蓇葖，长约4.5厘米，成熟后则裂开，散出种子。种子棕紅色，扁平，长约5毫米，頂冠以长而柔軟的絹毛。（見附图白龍鬚）

药用部分 根

附註 图考：“白微，本經中品。救荒本草，嫩角嫩葉，皆可燻食。江西、湖南所產皆同。根長繁，故俚醫呼白龍鬚。按細辛，及已諸藥皆用根；而根長多鬚，大率相類。諸家皆以根黃白柔脆粗細為別，然其苗葉皆絕不相類，而諸家或略之。故俚醫多無所從。唯因俗名採用，反不致誤亂也。”



白 龍 鬚

大 一 枝 箭

本品为石蒜科 (Amaryllidaceae) 植物 *Lycoris aurea* Herb.

別名 石蒜 金燈花 水麻 老鴉蒜 烏蒜 蒜頭草 瓊瓊酸 鐵巴箭
一枝箭 鹿葱 忽地笑 龍爪花 祖先花 蟬螂花 新米夜晚花

原文 大一枝箭，味甘、微苦，性〔溫〕^①陰也。滋〔陰〕^②潤肺，止〔肺中結熱〕^③咳嗽，除虛癆發燒，〔五癆可療〕^④，攻瘡毒，利小便，〔洗瘡神效〕^⑤，止咳血。

〔附方〕^⑥治癆熱咳嗽、痰帶血絲、或咳血發熱、小兒咳血效^⑦。

大一枝箭_{五錢} 續斷_{三錢} 花粉_{二錢} 石膏_{五分} 共爲末，每服二錢，入碗內〔滾水調，略蓋片時溫服〕^⑧。

— 云南丛书本卷上第21—22頁

校 ①原作“性微寒”，据琴本改。又图經本草及綱目均云“味辛溫”自应以“溫”为正。

②原作“陽”，依范、务、世、李本改为“陰”字。

③④⑤据范本增。

⑥从本原缺“附方”二字，且方中无剂量，依、务、世、李本增。

⑦“或咳血發熱，小兒咳血效”一句，务、世、李、琴本缺。

⑧原作“滾水冲碗內，以鐘蓋注後微溫服”詞意不明，依务本改。

植物形态 多年生草本，喜生溪边石缝中。鳞茎卵圆形而略扁，包有宿存的黑褐色鞘基。鳞茎内有侧芽1—2个，后增殖新鳞茎。叶基生，4—6枚，两面均深绿色，带形，通常长15—30厘米，宽1—2厘米。中脉上面微陷，下面突出，叶脉平行。夏日抽葶，葶圆柱形，肉质，实心，青色，基部有时带红晕斑纹，高30—60厘米，直径约1.5厘米，渐上渐细。花4—8枚，平列成一圈，簇生葶顶成繖形花序；花序直径13—15厘米。总苞片2枚，初包被各花，花时披下，渐就黄萎。花梗近乎棒圆，长1.5—2厘米，具一窄浅槽。花被橙黄色，基部融合成一短管，管长6—7毫米，管顶有6枚鳞片状副花冠。花被上部六裂，裂片线形，长约4.5厘米，宽5—8毫米，开出后向后反卷，边缘较薄，多波状起伏。雄蕊6枚，出花被管后倾下，而复向上弯开，长约7厘米，基部着生于花被筒上，花丝丝状，花药长椭圆形，丁字着生。子房下位，椭圆形，长约5—7毫米，秃净，三室，花柱丝状，黄色，长约10厘米，顶端渐尖带红晕，柱头点状，具细乳突。蒴果近球形，高约1.5厘米，冠以萎缩花被。种子卵形，略扁，高约6毫米，种皮亮黑色。（见附图大一枝箭）

药用部分 鳞茎

附註 图谱对本属各种汉名，有详尽之考证谓：“喜生溪畔石缝中，滇省常见于石灰岩区，海拔1,000—2,000公尺之间均有之。花约于旧曆七月中开放，故有呼为祖先花者。果八、九月成熟，熟者甚少，旋即萎去而抽出新叶。”



大一枝箭

小 一 枝 箭

本品为菊科 (Compositae) 植物毛大丁草 *Gerbera Piloselloides* (L.) Cass.

別名 百頭翁 毛大丁草 野犬人

原文 小一枝箭①，一名白頭翁。味苦，性溫。攻散瘡毒，治小兒頭禿瘡，消散癰癤結核，利小便，止尿血，〔止大小腸下血〕②，利熱毒，止膀胱偏墜氣〔痛〕③，療乳蛾〔疔〕④腮紅腫。

(奇方) 治小兒肺胃火熱、乳蛾〔疔〕腮紅腫疼痛、發熱頭痛。

〔小一枝箭〕⑤〔二錢〕⑥ 連〔翹〕⑦二錢 赤芍一錢 引點水酒服。

——云南丛书本卷上第22頁

白頭翁，滇中最驗。如白微而柔細稍長，莖上有毛。本經名野犬人。氣味苦，無毒。

主治溫瘧、狂症、寒熱、癥瘕、積聚、氣癭。逐療金瘡、鼻衄。止毒痢、赤痢、腹痛、齒疼、百節骨痛、一切風氣邪熱，煖腰膝。滇中多明目退翳，解楊梅毒瘡，解汞毒入筋骨疼痛。

——范洪“圖說”卷三第17頁

- 校 ①原作“小一支箭”，依务、世、翰本改。
②原作“解大腸血”，依翰本改。
③原作“腫”，依务、世、翰本改。
④原作“乍”，依翰本改。
⑤原作“白頭翁”，依务、世、翰本改。
⑥原作“一錢”，依务、世、翰本改。
⑦原作“蓄”，依务、世、翰本改。

植物形态 多年生草本，全体被綿毛。根为黄棕色，根軸肥厚。叶根生，具柄，长8—12毫米。叶矩圆形至卵形，长5—8厘米，寬2.4—4.4厘米，先端渾圓或鈍，边缘具极不明显圓齿。幼时上面被毛，而于老时常趋秃淨，下面密被綿毛。花莖长15—40厘米，圓柱形。头状花序单生，直徑約2.7厘米。总苞漏斗形，长16—18毫米，基部狭，苞片綫状披針形，被柔毛。舌状花极明显，雌性一列，紫色，长約17毫米。管状花两性，淡紅色，頂端5齿裂，多少2唇形。冠毛黃白色，与花冠等长。瘦果的喙于花时极短，成熟时約与果等长，冠毛淡黄色。（見附图小一枝箭）

药用部分 根



小一枝箭

瓦 草

本品为石竹科 (Caryophyllaceae) 植物 *Melandryum lankongense* (Fr.) Hand-Mzt.

别名 白前 滇白前

原文 瓦草，一名白前。味苦辛，性寒^①。開通關竅^②，清肺熱，利小便，治熱淋。

——云南丛书本卷中第13頁

校 ①务、世、李本作“性微寒”。

②务、世本作“開關通竅”。

植物形态 多年生斜臥草本，自生于山野、荒地及石灰岩等地帶，高达50厘米。根圓錐形，肉質。莖脆，棒圓中空，具稍膨大之节，有短柔毛与头状腺毛。叶无柄，对生，带肉質，橢圓形至橢圓狀卵形，长4—5厘米，寬2—3厘米，先端銳，基部楔形，邊緣略作波浪起伏，叶上面橄欖綠，下面帶灰白，两面具乳突及短柔毛，側脉不甚明显。二歧聚繖花序頂生，分枝处具对生叶状苞片。总花梗长4—6厘米，花梗长1—2厘米，小花梗极短，花后增长，具头状腺毛。花长2.2厘米，直徑1.2厘米。萼筒筒状，宿存，綠色，表面密被腺毛，长11毫米，頂部与底部微縮小，頂具5齿，牙状裂片，具十根綠色縱脉。花瓣5枚，暗淺紅色常帶綠暈，匙状倒披針形，全长15—18毫米。爪倒卵状披針形，瓣片短，橢圓形，2裂，每裂之外側又具1小裂。喉部具副花冠，鱗片二深裂，长约2毫米，寬約1毫米。雄蕊10枚，花絲吐露，长1.8厘米。花药橢圓形，长约2毫米，白色，丁

字着生。子房长椭圆形，高4毫米，直径1.6毫米，秃净。花柱三枚，丝状分离，长约1.5厘米。柱头微膨大，具小乳突。蒴果圆锥体形，高不及1厘米，直径6毫米，完全，1室，顶端以三裂瓣开裂，裂瓣具二齿牙。种子肾形，种皮棕色，长1毫米，宽0.75毫米，具5裂不甚整齐，近乎长方形突起。（见附图瓦草）

药用部分 根

附註 图考之“滇白前”条谓：“白前，别录已载。诸家皆以根似细辛、而粗直，叶如柳如芫花。陶隐居以用蔓生者为非是；然按图仍不得其形。滇产根如沙参辈，初生直立，渐长，莖柔如蔓。对叶亦微似柳。莖叶俱绿，叶亦软。秋开花，作长蒂，似万寿菊。蒂端开五瓣银褐花，细碎如翦。又有一层小瓣，内吐长鬚数缕。枝繁花浓，铺地如綺。”下引滇本草：瓦草，与原文同。

图谱谓：图考所收“滇白前”“白前”（滇南本草之白前，非本草纲目白前）与“瓦草”为一物，通呼“瓦草”。滇南本草作者附会为白前，吴氏以其与本草纲目所载非一物，故又增“滇”字耳。宜用“瓦草”，以别于官药之“白前”。



瓦 草

白 芷

本品为繖形科 (Umbelliferae) 植物 *Heracleum scabridum* Franch.

別名 香白芷 蛇床

原文 白芷〔味辛、微甘，性溫。升也，陽也，入陽明經。以辛入肺，正陽明頭痛之寒邪，四時發熱，祛皮膚遊走之風，止胃冷腹痛寒痛。除風溼燥癢頑痺，攻瘡癰，排膿定痛。治婦人漏下白帶散經，週身寒溼疼痛〕①。

白芷蘇葉散〔又名香蘇白芷散〕②。治四時感冒、風寒暑溼、頭疼發熱、乍寒乍熱，止陽明經頭風〔疼〕③。

白芷一錢 香附一錢 蘇葉一錢 川芎一錢 黃芩一錢 石膏一錢(煨)④ 防風一錢 甘草五分 引用生薑一片煎服。

白芷湯：治婦人溼痰下注于膀胱，以成白帶漏下之症。

白芷二錢 (用頭不用梢) 蒼朮二錢 〔川芎二錢〕⑤ 香附二錢⑥ 陳皮一錢 土茯苓二錢 蓮鬚一錢 引用糯米一撮，點水酒煎服。服二三次不效，加臭椿皮一錢 艾葉一錢⑦(炒) 忌魚、羊、蛋、蒜、韭菜。

(補註) 治婦人年少；素無症候，單是白帶症

者，是溼氣下注，此方用之最良。若久病虛弱，下注白帶者，是氣虛下陷，多成虛勞症，〔用之不效〕^⑧宜別選方。

——云南丛书本卷下第16——17頁

- 校 ①此段原缺，据务、世本增。
②此句原缺，据务、世本增。
③“疹”字据务、世本增。
④“煨”字务本作“燒”。
⑤从本无“川芎二錢”，据务、世本增。
⑥务、世本作“一錢”。
⑦务世本作“二錢”。
⑧此句据务、世本增。

植物形态 多年生草本，自生于川澤田野处，高可至1米余。莖基部增厚肉質，拽引入土成根状，具明显橫紋。頂部生不定根，皮肉白色，有濃郁香气。莖棒圓具多数淺肋，中空，表面密生白色微硬毛。叶为大型羽状复叶，輪廓卵状三角形，莖上部叶漸小，以成苞片状，粗糙，多編巖。叶柄近乎棒圓，上面具淺槽，基部擴張成鞘，鞘底抱莖。小叶片7，对出，下部者具叶柄，上部者无柄，輪廓卵形，基部心形，长达20厘米，寬达18厘米，作不同程度之三深裂，邊緣具不相等之齿牙与短纤毛。上面綠色至黃綠色，下面色淺，均具疏短毛。夏天，莖頂开花，复繖形花序，頂生。总花梗棒圓，长约15—20厘米。总苞約5枚，有时缺如。分花梗每繖序13—35，近乎棒圓，具肋。小苞片3—9枚，披針形至綫形，长5—15毫米。小繖序約具19—50花，繖形花序之周花极不整齐。萼片小，5枚，綫状三角形，宿存。花瓣5枚，大小不等，倒卵形，白色，长2—5毫米，寬1.5—4毫米，二深裂，先端之凹缺中具一內折而近乎三角形之尖端。雄蕊5枚，花絲长4毫米，白色。花药橢圓形，背着，暗綠色。子房側扁圓錐体形，

长1.5—2毫米，表面疏生短硬毛，2室。花柱短，直立，柱头不显。果实椭圆形，长7—8毫米，寬4—5毫米，分果具6根（背面4，腹面2），明显棕色油管。分果柄2，細、长6—8毫米，自果柄頂端膨大处即分开，成熟时，分果挂于分果柄，搖搖欲动。（見附图白芷）

药用部分 根 叶 果实

附註 按图考云：“滇南生者，肥莖綠縷，頗似茴香，抱莖牛枝，長尺有咫。對葉密擠，鋸齒搓枒，齟齬翹起，澀紋深刻，梢開五瓣白花。黃蕊外湧，千百爲族。間以綠苞，根肥白如大拇指，香味尤竄。” 其所述及图像均是本種無疑。

又图谱对白芷有詳尽之記載，敘述滇产白芷与外地所产白芷之不同，考証甚詳。又云：“產滇省各處川澤田野，海拔2,000公尺左右之處。五月開花，十月果熟。”



白 芷

土 黃 連

本品为小藥科 (Berberidaceae) 植物九蓮小藥 *Berberis Juliae* Schneid.

別名 雞脚黃連 石妹刺

原文 土黃連^①，〔一名〕^②石妹刺。味苦，性大寒。瀉小腸〔經〕^③ 實火、胃中實熱。利小便，止熱淋痛、牙根腫痛、咽喉疼痛、小兒乳蛾乍腮。

(單方) 土黃連〔爲末〕^④，泡人乳，點暴赤火眼腫脹疼痛，效。

——云南丛书本卷中第10頁

校 ①原作“土黃蓮”，据务、李、琴本改。

②③据务、李、琴本增。

④据务、李本增。

植物形态 常綠、有刺、小灌木，高至2米。小枝微有稜角，幼时帶黃色，第二年黃灰色或黃褐色。小枝具刺，刺堅硬，三分，長1—3厘米。葉簇生，硬革質，窄橢圓形至披針形或倒披針形，長2.6—6厘米，寬5—18毫米。先端銳尖或鈍，基部楔形，邊緣有刺狀鋸齒，多少反捲，上面脆綠色，中肋凹陷，下面淡綠色，中肋成脊狀隆起，細網脈不明显。花鮮黃色，直徑約6毫米，14—20朵簇生。花梗長5—20毫米。小苞片3枚，披針形，全部或先端部分染以紅色。萼片6枚，與花瓣同色而似花瓣，2列：外列披針形，全部或先端部分染以紅色；內一列爲卵圓形，較花瓣長。花瓣6枚，卵圓形，長約5毫米，

复瓦状排列。雄蕊6枚，与花瓣对生。雌蕊1枚，卵状矩圆形，子房上位，柱头无柄。果为浆果，卵状矩圆形，长约5毫米，有短而明显的柱头。（见附图土黄连）

药用部分 根

附註 图考木类有大黄连云：“生雲南，大樹枝多長刺，刺必三以爲族。小葉如指甲，亦攢生。結青白實。木心黃如黃柏，味苦。土人云：可以代黃連，故名。”觀其所敘形态，与土黃連并非一物。



土黃連

白芍 赤芍

本品为毛茛科 (Ranunculaceae) 植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pallas.

别名 犁食 餘容 解倉 鉗 攀夷 辛夷 金芍藥 木芍藥 將離 沒骨花 婪尾春 草芍藥 豔友 冠芳 殿春客 黑牽夷

原文 白芍^①，味酸、微甘，性微寒。主瀉脾熱，止腹痛，止水泄，收肝氣逆痛，調養心肝脾經血，舒〔經〕^②降氣，止肝氣痛。

白芍湯治肝氣疼痛，偶因動怒着氣^③，怯寒怕冷，左肋氣脹，上攻胸膈，或連胃口疼痛，背寒腰脊疼痛^④，身體屈伸俱難。

白芍三錢^⑤ 青皮五分 川芎一錢 片柴胡一錢 吳萸一錢 甘草八分

外加木香 沉香 玄胡 不拘多少，引茴香子八分煎服^⑥。

赤芍^⑦，味酸、微辛，性寒。泄脾火，降氣行血，破瘀血，散血塊，止腹痛，散血熱，攻癰疽，治疥癩瘡。

——云南丛书本卷上第24——25頁

校 ①务、世、李本作“白芍药”。

②原作“舒肝”，据务、世、李本改。

③务、世、李本作“因動怒生氣”。

④丛本作“背寒腰脊把着疼痛”。其中“把着”二字，系滇土話，依务、世本刪。

⑤务、世、李本作“二錢”。

⑥此段务、世、李本作“引用茴香子五分煎服，或加末香、沉香、玄胡亦可”。

⑦务、世、李本作“赤芍药”。

植物形态 多年生草本，常栽培于庭园間。根分歧，紡錘形，有縱橫紋，內白色。春天自宿根簇生新苗。莖圓柱形，高90—120厘米，莖叶均帶紅色。叶除頂端最后所生为单叶外，余多为复叶；小叶往往三深裂，裂片长椭圆形，或披針形，先端长尖，叶脉紅色。初夏莖頂开花，形大而美丽，有单瓣、重瓣两种，白色、紅色或其他顏色。外部萼片形如叶状。花瓣8或多数。雄蕊多数，金黄色。雌蕊数枚。果为蓇葖果，3—5枚。（見附图芍药）

药用部分 根

附註 医門要： “便血附方，芍药黃連湯，治大便後下血腹中疼。

芍藥(酒炒) 黃連(酒炒) 秦歸 淡桂 大黃 炙草
木香 檳榔”



芍 药

綿大戟

本品为瑞香科 (Thymelaeaceae) 植物 *Stellera chamaejasme* Linn.

別名 山蘿蔔 大將軍

原文 綿大戟(一名山蘿蔔^①)，味辛、苦辣，性微溫，有小毒。治胃中年久食積痰積，狀結如膠^②。攻蟲積，利水道，下氣，消水腫，吐痰涎。

(單方) 治水腫。綿大戟末，每服一錢八分^③，滾水送下，忌鹽百日爲止。若日數忌少，腫病仍發^④。但瀉去黃水，腫消；如瀉不止，冷粥補之。

(單方) 治一切積滯、食積、痰積、氣積、蟲積、痞塊疼痛、胸膈膨脹、肚腹鼓脹、飲食不消、面皮黃瘦、單腹脹。此藥消積化滯^⑤，以利爲度。虛弱者忌服，慎之^⑥。

綿大戟爲末，米糊爲丸，如馬豆子大。每服七丸，滾水下。用〔大戟須去皮心，連皮吃令人大瀉，連心〕吃令人大吐，心皮俱吃，令人吐瀉。獨根者良；生叉者不效^⑦。

——云南丛书本卷中第4—5頁

校 ①据务、世、李、琴本增。

②务、世、李本作“治胃中年深日入飲食結住，積久稠痰，

狀粘如膠”。

③务、世、李本作“每服五分”，琴本作“七、八分”。

④务、世、李本缺“若日數忌少，腫病仍發”一句。

⑤务、世、李本缺“此藥消積化滯”一句。

⑥务、世、李本缺“虛弱者忌服，慎之”一句。

⑦用“大戟須去皮心……生叉者不效”，一段，各本不同。

务、世本作“大戟皮令人瀉，亦令人吐，獨根者良”。李本作“大戟皮令人瀉亦令人吐，獨脚者良”。丛本自“用”字以下，缺“大戟須去皮心，連皮吃令人瀉，連心”十五字，茲依琴本增。又丛本作“生入者不效”。入字誤，依琴本改。

植物形态 多年生草本，自生于山地，高約30—50厘米，全体秃淨。宿根肥大，外表呈黃白色，有少数細的支根。莖自根端丛生，圓柱形。叶互生或对生，无叶柄。叶卵圓形，倒披針形或綫形，长1.2—2.6厘米，寬3.5—5毫米，先端漸尖或銳，基部闊楔形或圓形。上面脆綠色，下面粉綠色。全緣，无托叶。春夏間，莖頂簇生多花的头状花序，花序直徑2.4—3.6厘米，无花梗。花萼下位，細管状，管长1—1.5厘米。頂端5裂，裂片花瓣状，黃色，卵状矩圓形，长2—3.5毫米，寬1.5—2.5毫米，邊緣略具皺折，花瓣缺。雄蕊10枚，排成二列，花絲纤细，貼生于萼管上，花藥黃色，綫形，长1毫米左右，基部着生于花絲頂端。子房一室，倒卵形，长1—2毫米，頂部密被白色絲状毛，花柱极短，柱头头状。果为小坚果，淡黑色，为宿存干花萼所包被。（見附图綿大戟）

药用部分 根

附註 务本卷三后有外附单方：黃腫，用大戟單根不生岔者，切細，水酒煎服，忌盐味。



綿 大 戟

柴 胡

本品为繖形科 (Umbelliferae) 植物 *Bupleurum falcatum*.L. Subsp. *marginatum* (Wall.) Sm.

別名 竹柴胡 金柴胡 北柴胡 滇銀柴胡

原文 柴胡，味苦，性寒^①，陰中陽也。入肝膽二經，傷寒發汗解表要藥。退六經邪熱往來、痺痿。除肝家邪熱癆熱，行肝經逆結之氣，止左脅肝氣疼痛。治婦人血熱燒經，能調月經^②。

(補註) 傷寒症發汗，用柴胡，至四日後方可用；若用在先，陽症引入陰經，當忌用。發汗用嫩蕊^③，治虛熱調經用根〔好〕^④。

——务本堂本卷三第17—18頁

校 ①原作“性寒、味苦”，依全书編例改。

②此葯从本缺味性療效一段，故采用务本。又李本、世本与务本同。

③“蕊”字从本作“茸”。

④“好”字据丛本增。

植物形态 多年生草本，高40—60厘米。根細瘦弯曲，灰紅棕色，全体具橫皺紋，根头部分橫皺尤明显。莖圓柱形，有稜。叶互生，广綫形或狭披針形，长3—13.5厘米，質硬，全緣，叶脉平行，显著，两端狭細，叶面粉綠色。根生叶多具长柄。夏天，叶腋分枝，

生黃色小花，排成復繖形花序。總苞及小總苞均為披針形小葉狀，5枚。花瓣5枚，略向內曲。雄蕊5枚。子房下位，花柱2枚。果為分果，果實橢圓形，側扁。（見附圖柴胡）

藥用部分 根

附註 圖考有柴胡圖，謂即“以山西、滇南所產圖之”。又云：“滇南有竹葉、麥門冬二種，土人以大小別之”。又圖考有“滇銀柴胡”一條。謂“滇銀柴胡，綠莖疏葉，葉如初生小竹葉，開碎黃花。根大如指，赭黑色，有微馨。蓋即本草所謂竹葉者。前人謂銀柴胡以銀州得名，滇以莖葉者為猴柴胡，竹葉者為銀柴胡，相承如此，亦未可遽斥其妄。”

新纂雲南通志：“柴胡，騰衝高黎貢山及石頭山產者為良。莖高二尺餘，葉細如竹葉，花黃色，有芳辛氣味。維西、中甸出產亦佳。”

醫門擊要有柴胡湯方，錄如下：

小柴胡湯：治傷寒中風少陽症、往來寒熱、胸脅痞滿、默默不欲食；心煩喜嘔，或腹中疼，或渴、或咳、或痢、或悸；小便不利，口苦、耳聾、脈弦，或汗後餘熱不解，及春月時咳瘧發寒熱；婦人傷寒，熱入血室。

沙參三錢 黃芩一錢 柴胡一錢 法夏一錢 甘葛一錢五分
陳皮一錢 甘草五分 生薑引

柴平湯：治內傷外感

沙參三錢 白朮二錢 廣皮一錢 半夏一錢 蒼朮一錢
厚朴一錢 柴胡一錢 炒芩一錢 甘草五分 生薑引

大柴胡湯：治傷寒發熱，汗出不解，陽邪入里，熱結在里，心下痞鞭，嘔而下利，或往來寒熱，煩渴譫妄，腹滿便秘，表症未出，里症又急；脈宏或沉實弦數者。

柴胡一錢 半夏一錢 黃芩一錢 芍藥一錢 枳實一錢
大黃二錢 薑棗引

傷風附方：加味小柴胡湯

沙參 黃芩 柴胡 法夏 陳皮 甘葛 蘇葉

薄荷 甘草 葱薑引

柴平湯加劑：

沙參 法夏 柴胡 蒼朮 厚朴 炒芩 陳皮 加黑薑 加藿梗
加防風 加荆芥 甘草 薑葱引

療癰症內消治法：柴胡通經湯（加夏枯草）

柴胡 歸尾 連翹 黃芩 牛蒡 三稜 桔梗
黃連 紅花 生草



柴 胡

黃 芩

本品为唇形科 (Labiatae) 植物 *Scutellaria amoene* C.H. Wright.

別名 腐腸 菟盾 黃文 內虛 妬婦 虹勝 經芩 印頭 空腸 子芩 宿芩 狹尾芩 苦督郵 條芩 鼠尾芩 片芩 西芩 北芩

原文 黃芩，味苦，性寒。上行瀉肺火，下降瀉膀胱火。男子五淋，女子暴崩，調經〔安胎〕①。清熱、胎中有火熱不安，清胎熱，除六經實火實熱。所謂實火可瀉，黃芩是也〔熱症多用之〕②。

(附方) 治婦人月〔水〕③過多，將成暴崩，治效。

黃芩一錢 酒炒) 黃柏一錢 (炒黑色) 香附一錢五分 (童便浸)
白芍一錢 龜板二錢 (酥炙)④ 臭椿皮二錢 土艾葉一錢 (炒)
不用引煎服。

(補註) 月〔水〕⑤過多不止，是陰血不足以〔震〕⑥動脾土胞絡之火，故血走失而越常度也。是方用黃芩、黃柏制火，芍藥、龜板滋陰，爲壯水之主，以〔制〕⑦陽光也。艾葉之苦，椿皮之澀，所以固脫。〔又以〕⑧香附之辛，開〔其〕⑨鬱熱耳。

——云南丛书本卷中第15—16頁

校 ①各本均缺，据琴本增。

②④据务、世、翰本增。

③⑤原作“月來”，据务、世、翰、琴本改。

⑥原作“鎮”，据务、世本改。

⑦原为“鎮”誤。

⑧⑨据务、世、翰本增。

植物形态 多年生草本，自生山野，高30至100厘米。根表面褐色 内部黄色，长圆锥形。莖直立，四稜形，具絨毛。叶交互对生，矩圓状橢圓形，长9—22毫米，寬6—9毫米，上面綠色，下面粉綠色，全緣或略作淺波状，先端鈍，基部寬楔形，几无柄。夏季开藍紫色花，生于莖梢叶腋間，集成总状花序。花偏向一方，唇形，长约2.8厘米。花萼筒状，长3—4毫米，成二唇形，唇短而闊，外面密被直立柔毛，全緣，結果时封閉；上唇多为紫色，背上有一鸡冠状附属体，寬約2.5毫米半，长约1毫米，于果时增大成匙状，长5—7毫米，寬4—5毫米。花冠管长1.8—2.1厘米，自中部漸膨大，具数条藍紫色縱脉，通常由基部上弯成直伸状，外面密被柔毛，內面除上唇中裂部分疏被柔毛外，余无毛。上唇闊，3裂，中裂片較大，矩圓状方形，长约5毫米，寬約6毫米，邊緣几貼生成囊状，包雌雄蕊于其中；側裂片卵状三角形，长约6毫米，頂端鈍 直立，略向后弯。下唇近圓形，长6—10毫米，寬6—9毫米，全緣或頂端微凹，向外反折。雄蕊4枚，着生花筒內面近裂口下方，向上平行弯展于花冠上唇內 两两成对；外面一对长约16毫米，花絲絲状，花藥1室，綫形，黑色，长约1毫米，全着，藥室有白柔毛；內面1对长约7毫米，花絲同前，惟花藥为2室，个字着生，被毛。子房上位，深4裂，有短柄，柄下附有黄色密腺，花柱細絲状，几与花冠上唇等长，柱头不显。坚果极小，直徑不及2毫米，黑色，有小凸点。（見附图黃芩）

藥用部分 根 莖 叶可代茶飲

附註 图考云：“今入藥以細者爲良。”又云：“黃芩以秭歸產著，後世多用條芩。滇南多有，土醫不他取也。”



黄 芩

管 仲

本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物 *Potentilla fulgens* Wall.

别名 番白葉 翻白地榆 檳榔仁

原文 管仲，一名番白葉，味苦澀，性寒^①。治血崩白帶、大腸下血，用新瓦焙。治面寒疼，燒酒为引。

——务本堂本卷二第30頁

校 ①原作“性寒，味苦澀”。依全书編例改。

植物形态 多年生草本，自生山坡丘陵阴湿地。地下宿根肥大，圓錐形或不規則圓柱形，略弯曲，棕紫色，外有少数鬚根。莖直立，圓柱形。上部分枝，表面密被黃白色綿毛。根出叶丛生 平鋪地面或向上斜展，奇数羽状复叶。叶柄长2.4—3.5厘米，表面密生白色綿毛，基部托叶附着叶片上，扩大下延，呈鞘状而抱莖，兩側上端呈披針形而分离，內外面均有长綿毛。叶片大小相差甚大，頂端叶片最大。大叶片間間隔2—4对很小的叶片。小叶倒卵形至闊橢圓形，先端渾圓，基部闊楔形，边缘具尖鋸齿；上面濃綠色 被柔毛；下面白色 密布綿毛；脉在上面下陷，下面突起。莖生叶与根生叶同形，但較根生叶小 叶柄亦較短；莖頂端的叶近于无柄。夏秋开花，排列成聚繖花序，頂生。花黃色，直徑約2厘米。花萼綠色，宿存，5裂；裂片倒卵圓形至橢圓形，先端短，銳尖，基部鈍形，長約6—8毫米，寬3—4毫米。副萼片較小，卵状披針形，5裂，長約6毫米，寬約3毫米，先端尖，位于外側而与萼的裂片互生，两面均被黃白色綿

毛，尤以外面为特多。花瓣5枚，开放时平展，闊倒卵形，长6—10毫米，寬5—8.5毫米，先端微凹。雄蕊多数，位于雌蕊四周；花絲黄色，細柱形，长不及2毫米；花藥黄色，卵圆形，长约1毫米，基着。雌蕊多数聚生在有白毛的花托上，子房腎形，花柱側出，柱头不显。瘦果細小而为多，淡褐色，聚生于有白毛于花托上，为宿萼所包围。（見附图管仲）

药用部分 根



管 仲

野棉花

本品为毛茛科 (Ranunculaceae) 植物 *Anemone vitifolia* Buch-Ham.

别名 滿天星

原文 野棉花，味苦，性寒^①，有毒。下氣，殺蟲^②，小兒寸白蟲、虻^③蟲犯胃〔良效〕^④。

——云南丛书本卷中第10頁

野棉花，一名滿天星。形似耳風，小葉白毛花。性寒，味苦有毒。下氣。治小兒寸白蟲、虻蟲犯胃、疳疾等症。隨引經藥爲使。

——范洪“圖說”卷五第15頁

校 ①务本作“性微寒”。

②务本缺“蟲”字。

③从本作“猶蟲”，依务、世、李、琴本改。


④原作“用良”，据务、世、李、琴本改。

植物形态 多年生草本，野生在阴湿的林中及山溪岸旁，高34—100厘米，全体均有紧贴的白色刚毛。根圆柱形，旁生细侧根，根面有细条纹。莖直立，叉形分枝，黄褐色。根生叶的叶柄长1—2厘米。叶圆形或略呈不整齐五角形，三裂或五裂，裂片宽卵形，割裂深度多不及全片1/3，尖头，每裂片复浅分2裂，鲜4裂，边缘具圆齿，有细尖头，基部心脏形或耳形，长3.5—6.5厘米，宽3.2—7.5厘米。

叶上面綠色，有稀毛，下面灰白色，沿脉毛較密，莖生叶出自节上，多对生，較根生叶为小，叶柄亦短。花为聚繖花序，常为2—4花簇生。花柄下有叶状的苞，柄长至3.5毫米，苞片形态同莖叶，惟略小，花梗細长，长约20厘米。花芽下垂，开时直立，直径1厘米。花大美丽，徑約5厘米。花被5，白色或淡紅色，倒卵形，圓头或淺凹，长约3厘米 寬約2厘米，外面密生絲状白毛，雄蕊多数，黄色，长约5毫米。雌蕊球圓錐形或卵形，直径3.5毫米，密生細小柱头。瘦果卵圓形，密生长絲毛。（見附图野棉花）

药用部分 根

附註 綱目未录“野棉花”。吳其濬始据滇本草录入图考。謂：“此草初生一莖一葉。葉大如掌，多尖叉，面深綠，背白如積粉，有毛，莖亦白毛茸茸。夏抽莖頗似罌粟 開五團瓣，白花、綠心、黃蕊，楚楚獨立。花罷蕊擎如球，老則飛絮，隨風彌漫，故有棉之名。”
裴鑑：中国药用植物志謂：“野棉花产四川西部及云南、喜馬拉雅区域也有出产。生长在阴湿的林中及山溪岸旁。”又謂：“現時藥舖及业草藥者所售的所謂野棉花，其植物不属于野棉花一种，常以与野棉花种相近者代替或混杂之。惟种类既近，藥性当也相似。就銀蓮花一属中举出野棉花是单叶，与野棉花相切近两种 却是复叶（小叶三、有柄）。其中叶下面有稀白毛者名秋牡丹，叶下面茸毛密生者名大火草。”



野. 棉 花

鑽地風

本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物 *Rubus ellipticus* Smith var. *obcordatus* Franch.

別名 黃鎖梅 黃刺泡 鎖地風

原文 鑽地風，即黃鎖梅根①。味酸，性溫②。走〔經絡，治〕③筋骨疼痛、痿軟麻木，止日久赤白痢〔休息痢等症〕④。

(單方) 治赤白痢⑤。

鎖梅根、赤地榆煎服。

(又方) 治白痢、〔休〕⑥息痢。

鎖梅根、烏梅一個煎服。

(單方) 治日久大腸下血⑦，可用：

鎖梅根、槐寄生草等分煎服治之。單劑點水酒吃，效。

——云南丛书本卷中第33—34頁

校 ①从本“鎖”原作“所”，一律据务、世、翰、琴本改。

②各本均作“性微溫”。

③此三字原缺，据务、世、翰本增。

④此五字原缺，据务、世、翰本增。

⑤原作“治痢赤白痢。”前一“痢”字重出，故刪去。


⑥原作“體息痢”，据琴本改。

⑦原作“大腸下血日久”，据翰本改。

植物形态 常綠灌木，高約1.5—3米。莖，叶柄和叶軸均被紅棕色柔毛及倒鈎刺。莖呈圓柱形。叶为奇数羽状复叶，互生，通常小叶三枚。叶柄長1.6—2.5厘米，小叶闊倒卵形或倒心脏形，頂端小叶較兩側者为大，長約4.2—5.5厘米，寬約4.6—6厘米，邊緣有鋸齒。叶上面深綠色，沿叶脉处生細柔毛；下面粉綠色，密生白色細絨毛。叶脉隆起，側脉6—8对，直达叶緣，与主脉相交成45°角。托叶小，針形，長約3毫米。春初开花，頂生及腋生繖房花序。花白色，直徑約7毫米。萼片5枚，綠白色，闊卵形，兩面均有絨毛，長約3毫米，寬約2.5毫米，复瓦状排列。花瓣5枚，倒卵形，基部漸狹而成短爪状，与萼片互生而等長。雄蕊多数，分离。心皮多数，分离，生于突出花托上，花柱几頂生。聚合果由多数肉質小核果聚生于花托上所成。核果具一种子，成熟时与花托分离，直徑約5毫米。（見附图鑽地風）

药用部分 根

附註 檀萃农部瑣录：“鎖梅，蔓生、如何首烏。葉如錢大，有刺；實如黃豆大，味酸甜。”



鑽地風

續 斷

本品為山蘿藦科 (Dipsacaceae) 植物續斷 *Dipsacus asper* Wall.

別名 龍豆 寨拆 接骨 南草 鼓捶草 和尚頭

原文 續斷，一名鼓捶草，又名和尚頭。味苦、微酸，性溫。入肝，補肝，強筋骨，走經絡。止經中酸痛，安胎，治婦人白帶，生新血，破瘀血，落死胎。止咳嗽、咳血，治赤白便濁。

昔一人面寒腹痛堅硬，續斷三錢，燒酒半鐘，水半鐘^①煎服。

昔一人兩腿筋骨酸疼，服藥不效，用續斷五錢，醋半杯，炒乾，水煨點水酒服^②。

——務本堂本卷三第48頁

鼓捶草，獨苗對葉，苗上開花似錘，氣味苦淡無毒。耑治一切無名腫毒、楊梅、天泡諸瘡。每服七劑，一掃光全愈。忌用升藥。此症古來亦有。洗瘡即用此洗之最良。

——范洪“圖說”卷六第23頁

校 ① 从本作“燒酒一鍾，水一鍾”。

② 此藥仅務、李、世本有，余本缺。从本中仅列有附方，且誤排于葳靈仙之后。務、李、世本味、性疗效全同，惟李本附方原文為：“昔有一人面寒腹痛堅硬，續斷五錢，醋

半杯炒乾，水煨點水酒服”。比對之下，顯系兩方誤合為一，今采務本。

植物形态 多年生直立宿根草本，高54厘米——1米。宿根分生，細圓錐形。莖分枝，具稜。兩稜之間呈淺槽，稜上疏生粗糙剛毛，其餘部分生細柔毛。葉對生，基生葉柄長3.5—5.3厘米，密生硬剛毛。漸上漸短，以至無柄而抱莖。葉卵圓形至披針形，長4.8—9.2厘米，寬2.3—4.5厘米，先端鈍或漸尖，邊緣有粗鋸齒或重鋸齒，基部多作琴狀分裂。葉上面綠色，下面綠白色，兩面均生白黃色剛毛，中脈在上面微隆起，下面明顯隆起，側脈上面不顯，下面微隆起，與中脈相交約成45°角。秋天，枝頂開花，多花相集成頭狀，直徑約1.7厘米，下部有線形具毛茸苞片多枚，每花外有尖端呈粗刺狀苞片包圍之，苞片倒卵形，長約4毫米，外面及邊緣有細長毛及剛毛，內面有較短細柔毛。花萼呈淺盤狀，有4角，內外兩面密布細柔毛，着生于邊緣上的毛較長。花冠白黃色，倒鐘狀，長約8毫米，表面密生短曲絲毛，頂端4裂，裂片倒卵形，長約2.5毫米。雄蕊4枚，着生花冠筒內面，距基部約4.5毫米處，與裂片互生。花絲較花藥稍長，花藥橢圓形，黃色，長不及2毫米，背着。雌蕊1枚，子房下位，1室。果實為瘦果，綫形，長約3毫米，通常外被苞片，淡褐色，表面有明顯的4肋，先端亦有4短尖頭，萼宿存。（見附圖續斷）

藥用部分 根

附註 圖考：“續斷，本經上品，詳唐本草注及宋圖經。今所用皆川中產，范汪以為即大薊根，恐誤。但大薊亦無馬薊之名，或別一種。諸說既異，圖列兩種，又無蔓生似芋，兩葉相當者。此藥習用，並非珍品，不識前人何以未能的識？川中所產，往往與本草刺戾。今滇中生一種續斷，極似芥菜，亦多刺，與大薊微類。梢端夏出一苞，黑刺如毬，大如千日紅花。苞開花白，宛如蔥花。莖勁經冬不折。土醫習用。滇蜀密邇，疑川中販者即此種。繪之備考。”

務本卷二后附單方：“痰火而手足疼痛酸麻，用續斷根醋煮過，細切曬乾，臨時以酒煎送下。熬三次，服後將渣包子患處。”



續 斷

狗 屎 花

本品为紫草科 (Boraginaceae) 植物 *Cynoglossum amabile* Stapf. et Drummond.

别名 倒提壺 一把抓 牛舌頭花 藍狗屎花 附地菜 狗舌花

原文 狗屎花，一名倒提壺，一名一把抓。味苦〔微鹹〕①性寒。入肝腎二經，升降肝氣。利小便，消水腫，瀉胃中溼熱，治黃〔疸〕②眼仁發黃、周身黃如金，止肝氣疼，治七種疝氣疼。

白花者治婦人白帶、淋症。

紅花者治婦人赤帶紅崩，瀉膀胱火熱。

(單方) 治男子婦人白帶③、黃疸、淋瀝、眼目白輪、黃如金色、周身黃色④、頭面〔浮〕⑤腫、兩足水腫⑥。

藍狗屎花一兩 金鐘茵陳五錢⑦ 引點水酒服，忌煎、炒、魚、羊、蛋、蒜、豆⑧。

(單方) 治七種疝氣疼、小腸氣疼、膀胱氣疼偏墜，腎子腫大，腎囊腫硬，光亮如水。

藍狗屎花葉(晒干)五錢或一兩 荔枝核七个(火燒) 茴香子二錢(炒) 水煨，臨服點水酒。

——云南丛书本卷下第4—5頁

校 ①原缺，据务、世、翰、琴本增。

②从本均作“黃疸”，依务、世、翰、琴本改。

③琴本缺“白帶”两字。

④琴本缺“淋瀝、眼目、白輪黃如金色、周身黃色”句。

⑤原作“黃”，依务、世、翰、琴本改。

⑥从本作“兩膀水腫”依务、世、翰、琴本改。

⑦务、世本作“二錢”，翰本作“二兩”。

⑧务、世、翰本作“忌魚羊蛋蒜”。

植物形态 多年生草本，自生于山地，高可至50厘米。根长而细，圆锥形，有侧根。幼时肉质，浅灰黄色；老时半木质，黑褐色。莖圆柱状，紫绿色，密被白色直绒毛。底叶多具长柄，长5—8厘米。叶椭圆形或匙状，长6—14厘米，宽2—4厘米，背色稍淡，先端尖或钝圆，基部楔形，全缘，而有时波状起伏；叶脉上面陷入，下面突出，显著。莖叶无柄，叶披针形，长约5厘米，宽2厘米，先端钝，基部呈浅心形，略抱莖。夏季开花，莖顶花序多不规则分枝，开花于花序之俯向一面，无苞片，具花梗。花萼钟状，长2—3毫米，五深裂。花冠管约与萼片等长，白色。裂片五，近圆形，顶部有时微凹，长约2—3毫米，宝兰色，在芽中复瓦状褶合。花冠喉部着生5枚小鳞片，与花冠裂片同色，对生。雄蕊5枚，复于鳞片下而对萼片，花丝几全与花冠管融合，药短椭圆形，长1毫米，黄色，背着。子房扁圆形，径约1毫米，四深裂，秃净。花柱出自子房基部，圆柱形，顶部渐尖削而着生平截之柱头，高不出花冠管。秋日，果实成熟，为宿萼小坚果，四枚，长不及1毫米，全面密生小形肉质之锚状刺。（见附图狗屎花）

药用部分 根部

附註 图考：“附地菜……雲南生者，葉柔厚多毛，茸茸如鼠耳……土醫用之。”又图谱云：“狗屎花之名通云，以其卑賤易生于各處荒地，頗疑其本作狗舌花。……狗舌、牛舌，均得之于葉形及毛

茸。倒提壺，像其果形。一把抓，則以其果實成熟後，其錨狀刺易鈎入毛絨或衣服中，而附着不脫……。產滇東、滇西、滇南各處，海拔一千五百至三千公尺。喜生于附郭或村旁，荒地田野常見。花期自三月至十月不斷，果隨時成熟。”



狗 屎 花

葳 靈 仙

本品为菊科 (Compositae) 植物旋复花属 (Inula. sp.) 之一种。

別名 小黑藥、草威靈

原文 [葳靈仙^①，味辛苦，性溫^②。行十二經絡。治胸膈中冷寒氣痛，開胃氣，能治噎膈、寒溼傷筋骨，止溼脚氣。燒酒煎服，祛脾風。多服損氣。] ^③

(奇方) 治冷寒攻心，面寒背寒，肚腹冷疼，痞〔塊〕^④ 堅硬〔滿腹膨脹〕^⑤。

葳靈仙三錢 香白芷三錢 赤地榆四錢 杏葉防風五錢
吳黃二錢^⑥ 茶匙草五錢 過山龍一錢^⑦ (酒炒) 用好酒二斤煎熱，服二杯止痛。

一人常食糯米飯，傷食，結滯胃中不消。日久面黃肌瘦，胸膈膨脹，肚大青筋，或時作泄，乍寒乍熱，肢體酸困^⑧。

葳靈仙三錢 砂糖三錢^⑨ 點水酒服之良效。

一人脚溼氣，脚邊腫痛，經絡痛，步履難行。

葳靈仙三錢 點水酒服效。

一人背寒痛不可忍。

葳靈仙三錢^⑩ 夏枯草五分 煎湯沖燒酒服效^⑩。

——云南丛书本卷下第20—22頁

校 ①务、世、李本作“威靈仙”。

②原作“性溫，味辛苦”。依全书編例改。

③从本缺味性疗效一段。依务、世、李本增。

④原作“滿”，依务本改。

⑤原无此句，依务、世本增。

⑥务、世、李本作“三錢”。

⑦务、世李本作“二錢”。

⑧此段务、世、李本作“傷食結滯胸中，乍寒發熱，肢體酸困”。

⑨务、世、李本作“五錢”。

⑩务、世、李本作“二錢”。

⑪此方之后，从本尚附有药方九个，系續斷、旋復花等，与葳靈仙无关，已分別移入續斷等条内。

植物形态 多年生草本，高約60厘米。根細，圓柱形，紫棕色。数根丛生，上部与莖相接处生数丛灰黄色綿毛。莖圓柱形，紫棕色，密生灰黄色硬毛，尤以上部为多。叶互生，几无柄，卵状披針形，长4.2—5.5厘米，寬1.4—1.9厘米，先端鈍，基部狭楔形，叶緣疏鋸齿状。叶上面綠色，叶脉平，被粗毛，毛的基部呈小瘤状，下面灰綠色，叶脉隆起，被灰黄色硬毛，尤以叶脉上为最密。側脉3—4对，与主脉相交約成45°角。夏天，枝梢及叶腋抽花梗，开花，头状花序，异型，为聚繖花序式排列，直徑約8—14毫米。总苞3—4列，复瓦状排列，长短不等；苞片披針形，长約3毫米，外两列被黄白色长毛，內两列只边缘被淡褐色絨毛。外圍的雄性花，白色，舌状而放射。盘花两性，管状，頂端五裂；花托秃裸，有窩点。瘦果近圓柱形，长約1毫米半，有縱稜和长柔毛。冠毛多数，长約5毫米。（見附图葳靈仙）

药用部分 根

附註 务本卷下，有“外附良方”多条，茲将与葳靈仙有关各条，逐录如下：

藥酒仙方：治男女手足麻木、腰膝痿軟。筋骨疼痛、四肢無力、

痰火濕氣等症。

生地 蒼朮 全秦歸 桂枝 川芎 牛膝 杭芍 續斷 廣陳皮
五加皮 葳靈仙 茯神 酸木瓜 此係本方。 外加 鑽地風
松明節 老鶴草 金錢參(乳炙) 再加飛松香。

以上用新瓦罐泡穀子燒酒飲。或重湯煎一炷香時，取出隨便飲之。

葳靈仙通治：於九月內丙、丁、戊、己日，尋葳靈仙根（以不聞水聲者），洗淨焙乾，杵爲末。以好酒和，令微濕，裝甌內蒸透，放大竹筒內，牢塞其口，勿令泄氣。過二三日，又取出，以酒拌濕，如前蒸之。九蒸九晒，如乾膠漆狀。白飯杵丸，如桐子大，每服二、三十丸，溫酒送下，名“靈仙丹”。卽痢不瀉（上四字疑衍）。其所治諸症如左：

男女中風不語、手足不遂等症。

口喎眼斜、筋骨疼痛、熱毒瘡毒。

胎風頭風、暗風大風、顛狂傷寒、頭疼、鼻流清涕。服至二度，傷寒卽止。

治頭目眩暈、白癜風、皮膚風癢。

治癆疾、連腰骨節風、遶腕風等症。

治言語滯塞、痰積食積、膀胱氣，口流涎水、手足頑痺、氣壅、腰膝疼痛，久立不得、時氣瘴氣、憎寒壯熱、頭疼尤甚、攻耳成膿而聾。又冲眼赤、大小腸秘 服此立通，飲食卽化。

治黃疽黑疽、面無顏色、癩癧偏項。

產後秘澀、背痛腰疼、從高墜損。

心痛注氣、膈氣冷氣、腎臟風壅、肚腹脹滿、頭目浮腫、咳嗽喘息、坐臥不安、疥癬諸瘡服此俱效。

婦人月經不通、動紅多日、血氣冲心、陰汗、盜汗、鴉臭、氣臭難堪，宜勤服之。更煎湯頻洗，每平旦時，以舌唾津調葳靈仙末，塗遍身內外，每日一次。

治痔疾秘澀、血痢絞腸及脚氣足不能履地者。此簡易而功溥，可便宜以濟人。



葳 靈 仙

貫 衆

本品为水龙骨科 (Polypodiaceae) 植物 *Cyrtomium falcatum* (L.fil) Presl.

別名 厥薇菜根 鳳尾草 貫節 貫渠 百頭 虎卷 扁苻 泊萍 藥藻 草鴟頭 黑狗脊 貫中 貫經 全緣貫衆

原文 貫衆^①，即蕨薇菜根。味鹹澀，性寒^②。祛毒，止血，解水毒。二三日間，泡水盆中^③。凡用，去毛，切片于火上，白酒汁醮上焙乾。

(附方) 治婦人白帶。制法如前——研末，開水服。

(又方) 治刀傷流血〔不止〕^④。

貫衆(去毛)^⑤ 髮灰(炒爲末)^⑥ 龍骨(煨)^⑦ 各等分，共爲細末，搽患處，能止血收口生肌^⑧。

——务本堂本卷二第31頁

校 ①丛、翰、琴本均作“貫仲”，应以务、世本为正。

②原作“性寒，味鹹澀”。依全书編例改。

③此句翰本作“三月四月水發，泡水盆中”。

④据丛本增。

⑤丛本作“去尾爲末”。

⑥“炒爲末”三字据丛本增。

⑦“煨”字据丛本增。

⑧此药丛本缺味性疗效，仅存附方，故采务本。

植物形态 坚硬直立多年生草本，山野自生。根状莖粗短而直立，密被鱗片。叶丛生，奇数羽状复叶。羽叶柄粗壮，有多量鱗毛。羽叶暗綠色，长30—70厘米，闊10—20厘米，輪廓长矩圓形 羽片互生，有短柄，通常长7.5—10厘米，卵圓形至鑷刀状卵圓形，頂端长、漸尖。叶緣全緣或不显明波状，叶脉环結成頗大的網孔，有着生囊群而延伸的內藏細脉。孢子囊群大，圓形、散生而密布于背面叶脉上或叶脉頂端，子囊盖盾状，脫落或不脫落，邊緣波状，膜質褐色；环带有16个加厚細胞。孢子两面形，有疣状突起物。（見附图貫衆）

药用部分 根莖

附註 新纂云南通志：“貫衆爲殺蟲劑，屬羊齒類，一名鳳尾草。生陰濕山地。大理月街，此味藥材多遠銷各縣。”（下略）



貫 衆

羊 蹄 根

本品为蓼科 (Polygonaceae) 植物 *Rumex nepalensis* Spreng.

別名 土大黃 東方宿 連蟲陸 鬼目 蓄 秃菜 遂牛蕒 敗毒菜 牛舌菜 水黃芹 羊蹄大黃 金橋麥蘧 猪耳朵 牛舌大黃 秃葉 大生葉

原文 羊蹄根，味苦，性大寒。治諸熱毒，瀉六腑實火，瀉六經客熱，退虛癆發燒。利小便，治熱淋。殺蟲，搽癬瘡①、癩瘡。

葉、貼②熱毒紅腫，血風癬瘡。

(單方) 搽癬瘡③。古方單劑，加花椒搽，今增補用④：

羊蹄根一兩 石黃二錢 雄黃二錢 [枯礬二錢] ⑤ 臭菊花二錢 花椒一錢 共爲末，真菜油調搽，或素燭油亦可。

[又，土大黃，一名羊蹄根，味苦寒。同猪骨髓油拌蒸，搽楊梅結毒，亦能拔皮膚之火。解熱生肌] ⑥

——云南丛书本卷上第21頁

羊蹄根，一名土大黃——即秃葉，一名天王葉。氣味甘滑，性寒無毒。主治：腸風下血、大便秘結不通。一治小兒五疳肚大、筋青黃瘦、大傷脾胃。

化蟲下蟲最良。又解諸魚毒，可以作菜，同煮食良。

採根，曬乾爲末，敷馬刀、石癰、疔毒、癬瘡、疥癩、癰疽、瘰癧等症，用醋爲使。破爛用油調搽，神驗。

採葉，貼太陽穴，治暴赤火眼疼痛效。

——范洪“圖說”卷十二第49頁

投 ①务、宝本作“疥瘡”。

②从本原作“帖”，依务、宝、琴本改。

③务、宝本作“疥瘡”，綱目亦作“疥瘡”

④此句务、宝、琴本缺。

⑤“枯礬二錢”依务、宝、琴本增。

⑥此段丛本未載，务本另列于卷一下第12頁。今合并于此。

植物形态 粗壮多年生草本，高可达1米余，自生田野近水处。根圆锥形，多分枝，外部棕色，内黄色，表面有细根及细根脱落之残痕。莖硬粗壮、綠色，有时染以紅色，圓筒形，具縱槽。叶互生，在莖基部者簇生、有长柄。叶柄半圆形，基部略膨大，长约12.5—20厘米，渐上渐短，莖稍部叶柄长约1厘米、叶卵状披针形，长7—19.5厘米，寬2.2—7.5厘米；先端钝或浑圆，基部心脏形，近截形或闊楔形。中脉在叶上面平或略隆起，在下面形成显明隆起，網脉明显。叶上面綠黄色，下面色略淡，两面均染以紫斑或无，边缘具淺波状皺折。叶鞘多破碎或消失。花簇生叶腋成輪状，合成圆锥花序。花小、綠色。小花梗纤细，长2.5—5毫米。花被6裂，排成2輪。外輪3裂片长卵形 基部合生、长约2毫米，外面有明显小乳突，膜質边缘窄，向外扩张；内輪3裂与外輪互生，亦成长卵形，长约4毫米，寬約1.5毫米，中間有一条明显的脊，中部以下边缘有刺。雄蕊6枚，长2毫米。花絲短；花药淡黄色，椭圆形，着生花絲頂端，长约1.5毫米。子

房上位，三角状，长约1毫米。花柱3枚，柱头流苏状。果实为瘦果，包藏于扩大的内轮花被内，三稜形，长4毫米。种子一枚，梭形，长约3毫米。（见附图羊蹄根）

药用部分 根、叶

附註 名医别录著录“酸模”云：“極似羊蹄而味酸，亦療疥。”

本草拾遺以为即山大黄。綱目分而为二，图考因之是也。

又务本卷二外附单方：“治風火牙痛，用羊蹄根煎湯漱之。”



羊蹄根

東風草

本品为茄科 (Solanaceae) 植物茄 *Solanum melongena*. L. var *esculentum* Nees.

別名 茄落蘇 崑崙瓜 草龍甲 蓮莖 茄子根

原文 東風草①，味甘平②，性寒，陰也。主發風積動寒痰，吃之令人嘔吐、面皮作癢、動肝氣。有肝積者，吃之令人左脅作脹③、損肝④。不宜多食。

根梗，味甘，微苦，性寒。主行肝氣，洗皮膚癢癢，遊走諸風。祛婦人下陰濕癢、陰〔濁〕瘡⑤。

〔茄子，味甘寒。治寒熱五臟癆症〔及瘟疫症〕⑥。用醋磨敷腫毒散血。止乳疼，消腫寬腸。燒灰米湯飲，治腸內風，下血不止及血痔。根⑦葉治凍瘡。蒸熱⑧治癱瘓。多食損目、肚疼下痢，婦人多食傷子宮。又治偏墜如神。又京墨、文蛤入茄內，三旬取墨，烏鬚〔髮甚效〕⑨。

——云南丛书本卷下第25—26頁

按 ①此藥各本重出：从本見卷下第11頁及第25、26頁。务本見卷一下第13—14頁、卷三第56頁。別見世、李本及通志引。茲以从本卷下第25—26頁為主，參以其余各節、各本校訂。又，藥名標引，亦不一致。从本作“東風草”，另一條作“茄子”。务本作“茄子”，一條云：“根名東風

草”。

②从本作“味甘”，据他本增“平”字。

③务、世、李本作“左脇氣脹”。

④务、世、李本“損肝”作“損陰”。

⑤从本作“蠲”，依务、世、李本改。

⑥原作“瘟疾尸勞”，据通志改。

⑦通志作“梗葉”。

⑧通志作“蒸熟”。

⑨“髮甚效”三字据通志增。

植物形态 直立、粗壮、分枝一年生栽培植物，高20—90厘米。鬚根多数，細圓柱形，扭曲，外皮白黃色。莖圓柱形，黑紫色，略具光泽，被污黃色星狀柔毛。叶为单叶，互生。叶柄长3.5—3厘米，棒圓形，上面略扁，深紫色；下面帶綠暈，密被星狀柔毛。叶卵形至矩圓狀卵形，长6.8—15厘米，寬5.7—14.2厘米，先端鈍或圓，基部不等，邊緣有不規則淺裂或淺波狀。叶上面深綠色，下面綠色，兩面具星狀柔毛，尤以下面特多。叶脉黑紫色，上面略凸，下面凸出，側脉通常4对，与主脉相交約成 80° 角，网脉明显。夏季开花，通常单生，直徑約4厘米，淡紫色，傾斜或下垂。花梗黑紫色，棒圓，长約3.2厘米，密被星狀柔毛和疏刺。萼鐘狀，长2.4厘米，5裂，有时有一、二枚又复裂，黑紫色而略帶綠暈，除密被星狀柔毛外，有疏刺。花冠輪狀合生，筒短，长約6毫米，花冠6—7裂，裂片矩圓狀倒卵形，长、寬均为2厘米，先端銳尖，邊緣具不明显疏稀圓齿，开放前折疊狀，兩面均具有星狀柔毛，以外面最密。雄蕊6—7枚，着生花冠喉上，全长1.2厘米。花絲扁平，綠白色，长4毫米。花药矩圓形，长8毫米，黃色，頂裂，基着。雌蕊1枚，子房长方狀圓錐形，长約1.8厘米，綠白色，有明显的縱稜9。花柱2枚，圓柱狀，长1.1厘米，分离，白色，自子房頂部至中上部密被柔毛。柱头头狀，綠色。果肉質，平滑而亮，紫色，长达25厘米，形状各式，由圓、卵形至长柱形。种子多数。

(見附图東風草)

药用部分 根 莖 叶 果实

附註 医門學要：“治婦人乳花，用茄子自開者，燒灰搽之。初起服神仙活命飲，加黃花地丁；後服十全大補湯，加鹿角、阿膠、紅花治之。”



東風草

漏 蘆

本品为百合科 (Liliaceae) 植物萱草 *Hemerocallis fulva* Linn.

别名 蘆葱 萱草 宜男花 金針菜 黄花

原文 漏蘆，一名蘆葱，又名萱草，又名宜男花，又名金針菜。味甘平，性寒。治乳結紅腫硬痛、乳汁不通、乳癰乳巖^①，攻癰瘡。滇中產者，其性補陰血，止腰疼，治崩漏，止大腸下血。

(附方) 治男婦腰痛。

漏蘆根果^②十五個 猪腰子一個 以上二味水煎服三次。

(又單方) 治大腸下血，諸藥不效者用此良。

漏蘆果^③十個 茶花五分 赤地榆三錢 象牙末一錢 以上四味水煎服三次。^④

——务本堂本卷三第47頁

校 ①原作“岩”，据李本改。

②从本作“漏蘆根”。

③从本作“漏蘆一個”，李本作“漏蘆果十五個”。

④从本仅載單方，无性、味、治效，故改用务本。

植物形态 多年生草本，生于原野或栽培。根莖极短，有肥厚纖維根。叶基生，綫状披針形，长30—60厘米，寬約2.5厘米，下面帶白粉，有稜脊，多脉。初夏，叶丛間抽直立无叶花莖，高达1米。花

序圓錐狀，具5—12花，花橙紅色或黃紅色，無香味，長7—12厘米。花柄短，有小而披針形膜質苞片。花被管柔弱，長不及2.5厘米。花被裂片長圓形而向外反捲，外裂片寬1.2—1.8厘米，內裂片較寬，寬約2.5厘米，邊稍作波形而有網脈。雄蕊6枚，着生于喉部，突出，花絲綫狀，外傾，花藥多少丁字着生。子房矩圓形，3室，每室胚珠多顆。蒴果，三角形，革質，室裂。種子有角，黑色而有光澤。（見附圖漏蘆）

藥用部分 根 果 花



漏 蘆

重 萇

本品为延龄草科 (Trilliaceae) 植物 *Paris Polyphylla* Sm. var *Yunnanensis* (Fr.) H-M.

别名 蚤休 蚩休 重楼金线 重台 草甘遂 螫休 紫河车 七葉一枝花 草河車 重樓一枝箭 獨足蓮 草紫河

原文 重萇^①，一名紫河車，一名獨脚蓮。味辛苦，〔微辣〕^②性微寒。〔俗云：是瘡不是瘡，先用重萇解毒湯。此乃外科之至藥也。主治一切無名腫毒。〕^③攻各種瘡毒癰疽〔發背最良〕^④，利小便。

〔單方〕治婦人乳結不通，紅腫疼痛與小兒吹着。

〔重萇三錢 水煎〕^⑤，點水酒服。

——云南丛书本卷上第23頁

校 ①原作“重萎”，范、琴本作“重樓”，据务、世、翰本改。

②范本作“性寒”，“微辣”两字据琴本增。

③④据范本增。


⑤据务、世本增。

植物形态 多年生秃淨草本，自生山地阴湿处，高可至1米。根块状，横臥土中，长8.5—17.5厘米，直径2.5—5.2厘米，有明显的节，外表黄棕色，内为白色，靠莖端节上生多数細圓柱状略扭曲須根。莖圓柱形，紫色，基部有白色膜質鞘。頂端有叶6—9片，輪生。叶柄

深紫色，上面有槽，下面圓形，長4.5—12毫米。葉橢圓形或倒卵圓形，長4.2—9厘米，寬2.3—5.3厘米，先端銳尖，基部鈍。上面綠色，下面淡綠色。葉脈上面略凹，下面突出，脈網明顯，中脈兩側上舉而成波狀繃折，全緣。夏天開花，生于莖頂。萼片橢圓形，似葉，6—9片，長3—4.6厘米，寬1.2—1.6厘米，兩面均綠色，上面脈不顯，先端銳尖或漸尖，基部漸窄成短柄。花瓣綫形，頂端膨大作箭狀，長3.2—5.7厘米，黃綠色，6—9枚，與萼片互生。雄蕊12—16枚，長1.6—2.5厘米。花絲短，圓柱形，長4—7毫米，綠色或紫色。花藥矩圓形，長1.2—2厘米，黃色，外向，全着。子房卵狀，綠色，有明顯的稜6條，長5—7毫米，頂端具一紫黑色六角形的蓋。柱頭亦呈紫黑色，6—11裂，長3—9毫米。秋天果成熟，卵形，黃色。種子紅色，甚多。（見附圖重葇）

藥用部分 根

附註 圖考云：“蚤休，本經下品。江西、湖南山中多有，人家亦種之。通呼草河車，亦曰七葉一枝花。為外科要藥。滇南謂之重樓一枝箭。以其根老橫紋粗皺如蟲形，乃作蟲葇字。亦有一層六葉者，花僅數縷，不甚可觀，名逾其實。子色殷紅。滇南土醫云：味性大苦大寒，入足太陰。治濕熱瘡癩下痢，與本草書微異。滇多瘴，當是習用藥也。”



重 萋

草 血 竭

本品为蓼科 (Polygonaceae) 植物 Polygonum Poleaceum Wall.

别名 回頭草 草血結 金黃雞

原文 草血竭^①，一名回頭草。味苦辛、微澀，性微溫^②。寬中下氣，消宿食，消痞塊年久，堅積板硬，胃氣疼^③，面寒疼，婦人癥瘕，消浮腫，破瘀血，止咳嗽。

(附方) 治男女痞塊疼痛、癥瘕積聚。

草血竭焙为末，每服一錢，沙糖熱酒服。氣盛者，加檳榔、台烏。

(又方) 治寒濕氣浮腫。

草血竭^{三錢} 茴香根^{三錢} 草菓子^{二錢}^④ 共為末，同鰵魚^⑤ 煮吃之，三、四次效。

——务本堂本卷第三第14頁·

校 ①务、世、李、琴本作“草血結”，丛本作“草血竭”。依图考引文及参照綱目改。

②丛本作“性溫”。

③图考引作“治胃疼寒濕”。

④此方丛、琴本无剂量。

⑤丛、琴本作“魷魚”，图考引作“鱈魚”。

植物形态 多年生草本，自生于山石間，高約40厘米。根块

状，棕黑色，具多数細根。根生叶柄长约5—12厘米，近圓柱形，有鱗节处略膨大。叶披針形至矩圓状披針形，长8—22厘米，寬6—45毫米，先端尖或銳尖，基部闊楔形或近圓形。叶上面綠色，中肋略凸，下面粉綠色，中肋凸出，网脉显著，直达叶緣而突出。叶緣略反卷。莖生叶互生，叶柄长1.5—3.5厘米，有时近无柄，托叶变形成鞘状，其余均同根生叶。夏天莖梢开花，多数花集生为穗状花序，长约3—8厘米，花淡紅色。花柄极短，长约2毫米，花被之下有一节。苞片和小苞片均膜質，披針形，背面有条明显褐色中脉。花被5裂，复瓦状排列。雄蕊5枚，生于子房周圍。子房卵状压扁，长约0.5毫米，花柱二裂。果为坚果，包藏于多少扩大的花被內。（見附图草血竭）

药用部分 根

附註 图考草血竭，引滇本草原文。并謂：“生雲南山石間，亂根細如團髮，色黑。橫生長柄。長葉微似石韋而柔。面綠背淡，柄微紫。春發莖開花成穗，如小白蓼花。”



草 血 竭

地 不 容

本品为防己科(Menispermaceae)植物Stephania Delavayi Diels.

别名 地芙蓉 烏龜梢 金絲荷葉 金綫吊烏龜 地膽 山烏龜
地不榮

原文 地不容①，味苦②，性溫③，有毒。治一切癩疾。吐〔痰〕、倒食④。氣虛者禁忌。吐痰甚於常山⑤，恐傷人命。常山吐痰，有轉達之能，地不容無轉達之能，故爾忌用。

——云南丛书本卷中第13頁

地不榮，軟枝細籐，葉似小荷錢，根大而肥。性溫，味苦辛，有小毒。主治癩疾、吐痰、倒食。氣血虛弱之人，忌用此藥，只可敷瘡，不可妄服。耑治一切癰疽疔毒發背。無名腫毒不出頭者，用雞蛋清調搽，留頂，一夜即出頭。出頭後，切勿妄敷。熱毒只採葉貼患處即愈。若服即中其毒，慎之！

——范洪“圖說”卷五第16頁

按 ①李本作“地不榮”。

②务、世本作“味苦辣”。

③务、世本作“性微溫”。

④图考引作“一切癰吐倒食”，从本原作“吐倒食”。依务本加“痰”字。


⑤务本作“甚於常山白朮”。

植物形态 多年生无毛、草质藤本，栽培或野生，长达数米。块根盘状，直径达25厘米，皮层厚，暗灰褐色，肉黄白色，粉质。莖上部缠绕，圆筒形或略具角稜，草质、柔脆、红色，密布淡绿色细点。下部多埋地中，本质化多瘤节。叶草质，上面深绿色，略有光泽，下面淡绿色，略呈白粉状。叶盾状着生，方稜状阔三角形至近于圆形，先端钝圆，微凹，有一小尖突，基部约略截断状或圆。叶全绿，缘常红色，主脉7—9，向前三根最粗。叶柄纤细，圆筒形，基部扭曲，多肉质，红色，通常长于叶片，长8厘米以上。花序腋生，单性异株，平顶状繖形花序。雄花序径约10—12毫米，花在20枚以上；雌花序莖达5—7毫米，花少于15，均具细梗。花暗深紫色，具白粉，细小。雄花莖达3毫米，柄长约3—5毫米。萼片5—6，花瓣状倒卵形，长约1.5毫米，宽约1毫米，先端尖，内弯。花瓣3—5，长不及萼片之半，阔倒楔状圆形，污紫黄色。雄蕊柱高约1毫米，绿色，顶渐膨大成盾状；药室5—7，黄色，合生，围绕雄蕊柱之盾形顶部。雌花径约0.5毫米，具1毫米长之粗柄，花序外部者具一倒卵形萼片及二、三片短楔形同色花瓣，内部者多数仅具花瓣。心皮单一，卵形，暗深紫色，具带绿色不规则状5—7裂之柱头，基部有一绿色圆形腺盘。核果圆形，成熟时变为红色，径达6—9毫米，花柱痕在近柄处。种子环状，白色。（见附图地不容）

药用部分 块根 叶

附註 图考零婁农曰：“余在湘中，按志求所谓地不容者，不可得。及来滇，有以何首乌售者，或云：滇人多以地不容伪为何首乌，宜辨之。余喜得地不容，甚於何首乌也，遂博访而获焉。其根苗大致似交藤，而根扁而瘠。叶厚而圆，开小紫花。询诸土人则曰：其叶易衍而根易倾，殆无隙地能容也，故名。或以其叶团似荷钱，而易为地芙蓉，失其意矣！考图经：生戎州，今为安顺府，与滇接。宋版不及滇，故不以爲滇产。”（下略）

又，图谱对地不容之形状、名称及有关参考文献著录较详。



地 不 容

土 瓜

本品为旋花科 (Convolvulaceae) 植物 *Ipomaea bungalensis* Lingel et Borza.

别名 山土瓜 滇土瓜 土蛋 黄菟瓜

原文 土瓜，味甘平〔甜無毒〕^①。一本數枝，〔葉〕^②似葫蘆，無花〔一苗便葉，似何首烏〕^③，根下結瓜，有〔紅〕^④白二種。〔紅〕^⑤者治婦人赤白帶下，通經解熱。〔治咳嗽肺經結熱成癰，亦〕^⑥治〔婦人〕^⑦〔乳結不通〕^⑧，陰陽不分，子宮〔虛冷〕^⑨，男子精寒。服之，年老亦能生子，又健脾胃而生津液，生食止嘔療飢，產臨安者佳。蓄至二三年，重二三斤一枚者更佳。^⑩

〔紅〕^⑪土瓜，味甜，性平。補脾，解胃熱，〔寬中〕^⑫，利小便，^⑬止大腸下血。

〔單方〕土瓜皮點水酒煎湯服，治膀胱偏墜〔氣疼〕^⑭或一子大硬。

〔補註〕紅土瓜入脾胃二經，得土之氣，故有補脾之說。血入胃脘^⑮，故大腸下血，治之良^⑯效。

〔白土瓜^⑰，味甘，性平。白者入肺經，治肺熱，消渴，利小便。治肺癰^⑱咳嗽，通乳汁。〕^⑲

按 ①③据范本增。

②务本原缺“葉”字，据图考增。

④⑤原作“赤”，据图考改。

⑥⑧据范本增。

⑦据图考增。

⑨原作“久”，据图考改。

⑩此节从本无。据务、世本另条增入，并据图考引文校正，与下文似重出，惟务本原分列二条，兹合并叙述，不复改易。

⑪原缺“紅”字，据翰本增。

⑫原缺“寬中”二字依翰本增。

⑬原作“利下小便”，据务、世、翰、琴本改。

⑭原缺，据琴本增。

⑮原作“胃死”，据务、世本改。

⑯据翰本增。

⑰白土瓜从本作“白玉瓜”，据务、世、琴本改。

⑱“肺癰”下，原文尚有“肺熱”二字，与上文相較，系重出，据翰本删。

⑲白土瓜一节，原系分列，兹合并叙述，并采用务本卷二第24頁原文。

植物形态 蔓状的草质藤本，常匍匐地面，块根有球形或卵圆形等。其表皮红色或呈黄白色，肉白色，有乳状粘液。叶互生，叶柄长约0.9—2.1厘米，近叶片处有细小刚毛。叶宽卵圆形、椭圆形或矩圆形，长1.9—4.8厘米，宽1.4—2.7厘米，先端短尖，基部圆形或钝。无托叶，中脉在腹面，微下陷，背面隆起，侧脉5—9对，不达叶缘而向前弯，与中脉相交约成45°角。细网脉明显，全缘或具浅波状缢折。叶上面暗绿色，下面绿色，两面均光滑无毛，或靠基部边缘具柔毛。夏天开淡黄色花，花大而美丽，径约3—4.5厘米，长约4厘米，单生叶腋或成简单聚繖花序。花梗长约叶柄之三倍，顶端膨大，开

始膨大处有极不明显之小苞片2枚。萼片5，卵圆形，长达1.3厘米，宽达0.6—0.9厘米，瓦盖成筒状排列，先端锐尖，边缘膜质。花冠黄色，漏斗形，芽时折叠状。雄蕊5枚，着生于花冠管上，花丝淡黄色，丝状，基部略膨大而具毛茸，长约1.5厘米，花药白色，椭圆形，着生花丝顶端，长4—4.5毫米，内向。雌蕊1枚。子房上位，圆锥体形，直径约1.5毫米，基部附着黄色密腺。花柱单生，细丝状，长约2.3厘米，柱头上具两枚小圆球。果为蒴果，内具种子多粒。（见附图土瓜）

药用部分 块根

附註 图考标列滇土瓜謂：“土瓜生滇黔山中，細蔓，長葉微圓，秋開如鼓子花，色淡黃，根以爲果食。”桂馥札朴：“土瓜形似萊菔之扁者，色正白，食之脆美，案卽爾雅黃菟瓜，譌爲土瓜。”又云：“遵義府志俗呼土蛋，歲可助糧。按此草有花，一開卽斂。滇本草以爲無花，殆未細審。”



土瓜

慈 菇

本品为澤泻科(Alismataceae)植物慈菇*Sagittaria sagittifolia* L.

別名 茨菰 藉菇 河鳧茛 白地栗

原文 慈菇，味苦甘①，性微寒②。〔主治厚腸胃〕③，止咳嗽、痰中帶血、咳血、嘔血。

(單方) 治虛勞咳嗽出血。

生慈菇(去皮)(搗爛)④三錢 蜂蜜二錢 引米湯沫〔調勻，飯上蒸熟，熱服效〕⑤。

——云南丛书本卷中第24頁

校 ①务、世、翰本作“味甘微苦”。

②务、世、翰本作“性温”，翰琴本作“性寒”。

③原作“主治受腸”，依务、世、翰、琴本改。

④原无“去皮”二字，又誤“爛”为“攔”。据务本增改。


⑤原作“引米湯沫，調慈菇飲止蒸服”。詞意不明，据务、世、翰本改。

植物形态 多年生草本，多栽培于水田中。有秆匍枝，枝端膨大而成球莖，翌春即由此而生新植株。叶柄肥大，长20—40厘米，三稜形。沉水的叶狭带形；浮水叶卵形或近戟形。突出水面的为戟形，长5—20厘米，闊或狭，先端钝或短尖，基部裂片多少向二侧开展。夏秋开花，花莖长14—45厘米，有花3—5輪，每輪有花3—5朵，下輪为雌花，上輪为雄花而有較細长的柄。苞片短，短尖或钝，花徑約1.8厘米。萼片3枚。卵形，紙質，鈍。花瓣三枚，膜質，白色而基部紫

色，脫落。雄蕊多枚。心皮極多數，聚集于一花托上。瘦果斜倒卵形，先端短尖。（見附圖慈菇）

藥用部分 球莖

附註 滇海虞衡志：“慈菇烏芋，滇皆有之。慈菇一根，歲生十二子，如慈母之乳諸子，故以名之。一名白地栗，謂地栗之白者，別於烏芋之黑也。霜後葉枯，根乃練結。旋掘爲果，煮以灰湯。他處慈菇麻澀，而省上不然，則治之有法也”。



慈 菇

草 果 藥

本品为薑荷科 (Zingiberaceae) 植物 *Hedychium Spicatum* Ham.

別名 豆蔻 良薑花 草果

原文 草果藥，味辛苦，性大溫^①。寬中〔利膈〕^②理氣，消胸膨脹，化宿食。〔開〕^③胃氣，治九種胃疼、面寒、背寒，消痞塊積滯。〔血塊服之即消〕^④。〔產滇中者最效〕^⑤。

——务本堂本卷二第19頁

校 ①原作“性大溫，味辛苦”。依全书編例改。

②据范本增。

③据翰本增。

④⑤据范本增。

植物形态 多年生高大芳香草本，高至1米以上，野生山坡阴湿处。根莖块根状，上面露地面；每年以单軸生长法增殖一株，当年莖枯落后貼地留一圓疤。叶鞘基永存，纖維状，抱根莖。莖直立、粗壮、中实、脆嫩、多汁，由互相拥抱之叶鞘密复。叶二列、无柄。叶鞘管状、斜开，长达15厘米，淺綠色，頂部突出成叶舌，叶舌长达2.5厘米，卵状三角形，邊緣染以紅色。叶片近于平展，深黃綠色，下面綠白色，长橢圓状披針形，长约30厘米，寬約10厘米，上下面平坦，秃淨，先端短，漸尖，基部楔形，邊緣略呈波状；中肋上面略凹，下面突出，側脉每側約十余，細脉无数，均弧状斜升，彼此平行。穗状花序

頂生，長10—20厘米，寬約10厘米。花芳香，着生頗疏，斜升。花軸綠色，禿淨。苞片長橢圓形，長約2.5厘米，鈍頭，兩側內捲，淡綠黃色，每苞一花。小苞片一枚，在軸之右側，形同苞片，色更淡，均紙質，脆嫩。萼筒管狀，長達3.5厘米。花冠管長約為萼筒之二倍或不及，其裂片瓦復，反折，綫狀倒披針形，略呈螺旋而兩側內捲，均禿淨，淡黃白色。兩側花瓣狀廢雄蕊狹長，反捲，長約3.5厘米。唇瓣（內輪廢雄蕊之融合體）與兩側者等長，匙狀倒卵形，深二裂，有明顯瓣爪，白色，基部染以紅色。管狀花絲着生于花冠管之喉部，長略與花冠裂片等，橙紅色。花藥狹長，橙紅色，背着，離生，箭底。花柱紆柔，從二藥間穿過而露柱頭于分離藥頂上，柱頭膨大成陷穴，具刷狀毛，子房寬橢圓形，長約5毫米，疏生柔毛，下位，三室。蒴果扁球形，徑約2.5厘米，三稜不顯，禿淨。種子卵形，紅色，長約4毫米，種皮光滑有細綫紋。（見附圖草果藥）

藥用部分 果實 種子

附註 本草綱目，李時珍曰：“草豆蔻、草果雖是一物，然微有不同。今建寧所產豆蔻，大如龍眼而形微長。其皮黃白，薄而棲峭。其仁大如縮砂仁，而辛香氣和。滇廣所產草果，長大如訶子，其皮黑厚而棲密，其子粗而辛臭，正如斑蝥之氣。彼人皆用筆茶，又作食料恆用之物……。”

圖譜收“草菓藥”謂：“即滇南本草之良薑？非他書。”且謂圖考所收高良姜，今該種昆明不可復見。按：草果藥與良姜，雖同屬薑荷科，治效亦相近，然滇南本草仍分列為二。茲依滇本草分刊，至圖譜之考証，可供參考。



草 果 藥

淫羊藿^①

本品为小檗科 (Berberidaceae) 植物 *Epimedium acuminatum* Fr.

别名 仙靈脾 放杖草 棄杖草 千兩金 乾雞筋 黃連祖 三枝九葉草 剛前 碇草

原文 淫羊藿，性微溫，味微辛。入肝腎二經，與陽治痿，強筋骨。用剪剪去邊上刺，羊油拌炒^②。

——务本堂本卷三第37—38頁

校 ①务本作“藿”，依李本改。

②此药仅务、李两本收录，李本内容全同。

植物形态 多年生草本，自生，高22—50厘米。有匍行根莖，根外部紫色，生多数鬚根。常数莖丛生。莖圓而硬，生少数棕色长柔毛。叶为三出复叶或二间三出复叶，根生或莖生。根生叶有长叶柄，长约17—25厘米。小叶柄长2.4—4.8厘米。小叶卵圆形，长4—7厘米，寬1.9—3.7厘米。頂端急尖或漸尖，中間一片基部心臟形，兩側者基部斜心臟形。叶上面脆綠色，中脉及側脉下凹，網脉細而明显；下面灰綠色，中脉及側脉均隆起，側脉3—5出，不达叶緣而向前弯。脉上有棕色細柔毛。春天，自叶的中央抽花梗，成頂生总状花序，直徑2.5—5厘米。花梗上也有少数棕色細柔毛。萼片8枚，花瓣状，成2組对生，外部萼片較小，紅色，內部萼片淡青色。花瓣4枚，白色，有长針状距。雄蕊4枚，与花瓣对生。子房上位，一室。花柱針形，柱头扩大。蒴果伸长，有不等大的2个裂瓣，小裂瓣脫落。种子少数，有肉質假种皮。（見附图淫羊藿）。

藥用部分 莖 叶

附註 滇本草謂淫羊藿“用剪剪去邊上刺，羊油拌炒”。与雷公及藥性解相合。雷公云：“凡使仙靈脾，須用夾刀夾去葉枝盡後，細剉，用羊脂相對拌，炒過然後用。”藥性解云：“每斤去花，細剉，拌羊脂四兩，炒盡脂爲度。”

圖考引柳宗元仙靈脾詩：“神哉輔吾足，幸及兒女奔。”說明“此草爲治腰膝之要藥。”



淫 羊 藿

八仙草

本品为茜草科 (Rubiaceae) 植物拉拉藤 *Galium aparine* Linn.

别名 拉拉藤 猪殃殃 锯子草

原文 八仙草，味辛苦，性微寒。入少陽太陰^①二經，治脾家濕熱、諸經客熱、〔虛癆童癆〕^② 諸癆症、虛熱、煩熱、筋骨疼痛。濕氣傷筋，故筋骨疼。走小腸經，治五種熱淋，利小便、赤白濁、玉莖疼痛，退血分煩熱，止小便血。

(附方) 五種熱淋，小便赤，尿前急脹，馬口膿糊，玉莖疼痛。

滑石二錢 甘草一錢 八仙草三錢 雙果草二錢 〔水煎〕^③ 引點水酒服。

——云南丛书本卷上第18頁

校 ①从本及图考作“少陽、太陰”，务、翰、琴本作“少陰、太陰”。应以丛本图考为正。


②③原缺，据务、翰本增。

植物形态 一年生草本，蔓状或攀援状，生于路旁或山野，长20—40厘米。莖綠色，纤弱，四方形，分枝，稜上有倒生小刺，触之粗糙。叶6—8枚輪生，无柄，膜質，綫状披針形至橢圓状披針形，长2—4厘米，寬2—6毫米，先端具針鋒尖头，中部以下漸狹；上面綠色，被倒生白色刺毛；下面淡綠色，除沿中脉及邊緣被毛外，余

光滑无毛，侧脉不明显。春天，叶腋开花，疏散聚繖花序，有花3—8朵。花序柄与叶等长或短之。花细小，直径约1毫米。萼截头状，长不及1毫米，有钩毛。花冠淡绿白色，有时染以紫色；花瓣4枚，卵形，极短。雄蕊与花瓣同数而互生。子房下位，2室，花柱与雄蕊等长，2裂。果稍肉质，孳生，直径2—4毫米，长2—3毫米，表面密生白色钩毛，容易附着人衣和他物。（见附图八仙草）

药用部分 全株

附註 图考：“拉拉藤，到处有之，蔓生，有毛刺人衣。其长至数尺，糾結如亂絲。五六葉攢生一處，葉間梢頭，春結青實如粟。”又謂：“救荒本草蓬子菜，形狀頗類。雲南呼八仙草，俚方用之。”



八 仙 草

珍珠草

本品为石竹科 (Caryophyllaceae) 植物漆姑草 *Sagina maxima* A.Gray.

别名 漆姑草 瓜槌草 牛毛黏

原文 珍珠草，味辛，性温①。治面寒疼②，新瓦焙乾③爲末，熱燒酒服。

——云南丛书本卷中第6頁

校 ①务本誤为“惟温”。


②图考作“痛”。

③依务、世、李本增。

植物形态 二年生或一年生小草本，生于山野和庭园路旁等的阴湿环境处。莖丛生，高2.6—15厘米。叶对生，綫形，长0.5—0.9厘米。春夏間开花。花小，白色，直徑約3毫米。花萼五枚，卵形，长2—3毫米，寬約1毫米，綠色，邊緣膜質，无毛，分离直达基部。花瓣与萼片同数而互生，卵圓形，長約2.5毫米，寬約1毫米。雄蕊5—8枚。子房上位，卵形。花柱5，外展成星形；柱头上有毛状突起。花后結卵形蒴果，長約3毫米，5齿开裂，齿外露反卷。种子多数，种皮褐色，不光滑，上有突起。（見附图珍珠草）

药用部分 全株

附註 图考：“瓜槌草，一名牛毛黏，生陰湿地及花盆中。高三四寸，細如亂絲，微似天門冬而小矮，糾結成簇。梢端葉際，結小實如珠，上擎彙彙。瓜槌牛毛，皆以形名，能利小便。雲南謂之珍珠草，俗方以治小兒乳積。”（下引滇本草原文略）



珍珠草

馬 蹄 草

本品为繖形科 (Umbelliferae) 植物 *Centella asiatica* (L)
Urban.

別名 積雪草 崩大碗 錢鑿口 崩口碗 老公根 葵蓬菜 老鴉碗

原文 馬蹄草，味苦，性寒。〔治〕①子午潮熱、頭暈怕冷、肢體酸困、飲食無味。男婦童疳，虛勞發燒不退〔熱〕②者用之。利小便。

(單方) 治虛勞發熱，午後怕冷、夜間作熱。天明自汗身涼、神氣短少，頭暈心慌耳鳴。

馬蹄草 羊蹄根 山薄荷 引點水酒、童便服，〔水牛肉爲引〕③。

——云南叢書本卷中第9頁

校 ①据务、世、李、琴本增。


②原作“涼”字，据务、世、李本改。

③此句原在利小便句下，据琴本移于此。

植物形态 匍匐状多年生草本，自生于原野低湿阴地上。节上生根，近秃淨或稍被疏毛，节間长3—8厘米。叶具长柄，叶柄长1.5—7厘米。叶綠色，圓形或腎形，直徑2—4厘米，有鈍齿，基部深心形，秃淨或被疏毛。花序柄2—3个聚生，短于2厘米，秃淨或被毛，每一柄之頂端有3—6朵无柄之花，聚生成一头状花序，此花序为二枚卵形苞片所包围。萼截头状。花瓣5枚，紅紫色，长约1毫米，花

芽时复瓦状排列。雄蕊5枚，着生于花盘周围。子房下位，心皮侧向压扁，长2.5—3毫米，有网纹，每侧有2稜。果侧向压扁，小而果皮厚。（见附图马蹄草）

药用部分 全株



馬 蹄 草

瓦 松

本品为景天科 (Crassulaceae) 植物 *Sedum multicaule* Wall.

別名 佛指甲 鉄指甲 禾雀蒯 佛甲草

原文 瓦松，又名佛指甲。味甘、微辛^①，性微寒。治咽喉腫痛，消乳蛾^②。行經絡，風寒濕痺，筋骨酸痛。洗瘡濕熱毒。

(附方) 治咽喉腫、乳蛾疼痛。

新鮮瓦松；不拘多少，搗爛，加清水攪濁後，澄清，去渣不用。能用酒者，點酒服；不飲酒者，點醋服。^③

——务本堂本卷第2頁

瓦松，入足少陰，咽疼喉疼，單雙乳蛾。採根入足陰，治筋骨疼，風濕可散。夷人採搗敷額門，止鼻衄不止，包打傷亦良^④。

——范洪“圖說”卷三第13頁

校 ①务、世、李本原作“性微寒，味甘微辛”。从本作“味平、性寒”。

②从本无“治咽喉腫痛，消乳蛾”二句，务本中无“治”字，依李本增。务本“蛾”字誤为“哦”字，依李本改。

③从本无附方。


④范洪“圖說”原作“止鼻不止神，包打傷亦良”。

植物形态 多年生草本，全体光滑无毛，高10—18厘米。着地部分节节生根，莖淡紅色，染以紫紅色突起細斑点，上部多分枝。叶輪生或对生，无柄，綫形，长7—25毫米，寬1.5—2.5毫米。先端近短尖，基部有短矩，两面均綠色，无脉。夏末开花，疏散聚繖花序。花黃色，細小。萼叶状，5枚，无距或有时具假距，綫状披針形，通常不相等。花瓣与花萼同数，互生，卵状披針形，长4—6毫米，寬約1.5毫米，先端长，銳尖，背面具不明显的脊。雄蕊10枚，5枚着生花瓣近基部处，余5枚着生子房周圍与萼片对生。花絲絲状，长2.5—4毫米，頂端漸尖。花藥橢圓形，黃色，长不及0.5毫米，背着雌蕊由5分离心皮組成，徑約3毫米。花柱5枚，柱状，与雄蕊等长，柱头点状。（見附图瓦松）

药用部分 莖叶

附註 务本卷二有外附单方，原文如下：

鼻疳：鼻疳爛通其孔者，用鹿角一兩焙焦，白礬一兩炒過，頭髮五錢，燈上燒過，共研爲末。先用花椒湯洗淨疳孔，然後搽之。如疳不收口，可用瓦松燒存性，研末搽之。



瓦 松

五葉草

本品为牻牛儿苗科 (Geraniaceae) 植物 *Geranium nepalense* Sweet.

別名 老官草 五瓣花

原文 五葉草，〔出京都者良，名老官草。治筋骨痰火症，河南衛輝亦出〕^①。味辛苦，性溫^②。祛^③諸風皮膚發癢，通行十二經絡。治筋骨疼痛風痰痿軟，手足〔筋攣〕麻木^④。利小便，瀉膀胱積熱。〔攻〕散諸瘡〔腫〕毒^⑤，退癆熱〔發燒〕^⑥。治風火牙疼、疥癩〔痘〕疹〔等症〕^⑦。〔兼解諸癆熱，其應如響〕^⑧。〔敷跌打損傷，能定痛治瘀〕^⑨。

（奇方）治婦人經行，預染風寒，寒邪閉塞子宮，令人月經參差，前后日期不定，經行發熱，肚腹膨脹，腰肋作疼，不能受胎。服之〔即能調經受孕〕^⑩；以經行〔後〕^⑪月事斷止，用淨酒和水煎，臨臥時服。

五葉草五錢 川芎二錢 大薊二錢 吳白芷二錢 引水酒一小杯，和水煎服。

晚間服後忌風，見風令人手足面目^⑫腫，小便利自消，〔勿怕〕^⑬。


- 校 ①此四句据务、世、李本增。
- ②务、世、翰本作“性微温”。
- ③原作“去”，据务、世、李本改。
- ④据李本改。琴本作“拘攣”。
- ⑤⑥据务、世、李本增：“退癆熱發燒”句，范本作“退骨蒸之虛熱”。
- ⑦原作“瘡疹”，据务、世、李本改。
- ⑧此二句据范本增。
- ⑨此二句据琴本增。
- ⑩原作“有脂奇效”据琴本改。
- ⑪据务、世、李本增。
- ⑫据务、世本增。
- ⑬据务、世、李本增。

植物形态 多年生草本，自生于田野荒地上。幼时近乎直立，以后斜卧地上，长可达50厘米。主根微增厚。莖棒圓，略曲折，綠色，有时带暗紅色，生倒向短毛。托叶細小，长达7毫米，基部与叶柄融合而露出腺形尖端。叶柄棒圓，在基生叶上长达18厘米，愈上愈短，常扭曲，而基部略形膨大。叶輪廓作五角形或三角形，长达5厘米，寬达6厘米，3—5掌状深裂，裂片輪廓作菱形，长达2.5厘米，寬达2厘米，先端銳，基部闊楔形，邊緣具缺刻状锯齿叶上面綠色，背面灰白色，两面均生白色細剛毛。深秋开花，单生或二花組成之伞形花序，直徑1厘米，高6毫米。花梗通常于花后伸长。頂端具二枚小苞片。花柄細，长约1.5厘米，果时弯曲下傾。萼片5枚，长椭圆形，橄欖綠色，长6毫米，寬2毫米，先端具尾尖，膜質，具纤毛，背面具短柔毛，宿存。花瓣5枚，淡粉紅色或白色，倒卵形，长7毫米，寬5毫米，先端心状凹入，基部两侧具疏生短柔毛，具五紅色脉。雄蕊10枚，外圍5枚較短。花絲长约3.5厘米，基部擴張成卵状长椭圆形，沿緣疏生短柔毛。花药淡紫色，椭圆形，长约0.5厘米，丁字着生。子

房上位，近球形，高約1毫米，具5深稜，表面疏生长柔毛。花柱五，融合成一五角柱状之喙，密生短伏毛。柱头五裂，微微外展，柱头面紅色，宿存。果为宿萼蒴果，果实将近成熟时，子房即与五角形之軸分离而平举。五分果椭圆形，灰褐色，表面具短毛，开裂。种子椭圆形，暗褐色。（見附图五葉草）

药用部分 全株

附註 图譜收录本种，有詳尽的考証。



五葉草

水 金 鳳

本品为鳳仙花科 (Balsaminaceae) 植物水金鳳 *Impatiens uliginosa* Fr.

原文 水金鳳，味辛，性寒。洗濕〔熱〕①、筋骨疼痛、疥癩癬瘡。

——云南丛书本卷中第13頁

校 ①据务、世、李本增。

植物形态 一年生肉質草本，自生于山野溪旁湿地。莖高約35—70厘米，淡綠色多水份，表面滑澤，密生細小紅点。叶互生，有柄，柄基部着生淡紅色托叶狀的疣狀腺体 2 枚。叶柄淡紅色，长 4—12 毫米。叶片长橢圓形或橢圓狀披針形，长 5—12 厘米，寬 1.6—3 厘米，先端长尖，基部楔形而入叶柄，在基部近叶柄处有 2—3 对淡紅色疣狀腺体，邊緣有粗鋸齿，齿端有疣狀刺突出。叶片上面綠色，下面淡綠色或有时紅色。中脉上面微隆起，下面隆起；側脉通常 8 对，不达鋸齿尖端而向前弯。春夏間，叶腋抽細花梗，着生数花，排列成总狀花序。花两性 左右对称，大而美丽。各花皆具小梗，梗光滑，長約 2 厘米。花淡紫色，直徑約 2.2 厘米。萼片 3 枚，复瓦狀排列，其側生 2 枚小，淡紫色，斜卵圓形，長約 8 毫米，寬約 6 毫米，中間有一脊隆起而略作舟形；其最下一枚大，呈囊狀，具紫紅色条纹和細小圓点，向后延伸而成一中空的距，距尖端弯曲。花瓣五枚，其中 4 枚两两集合而成三枚，最上 1 枚近圓形，長約 9 厘米，寬約 1.3 厘米，背面有脊，通常直立，側生 4 枚連合，基部有黃塊和細小紅点。雄蕊下部分离，上部合生，环繞子房，5 枚，与花瓣互生，長約 5 毫米。花絲扁，長約 4

毫米。花藥淡黃色，2室，个字着生。雌蕊由5个心皮結合而成。子房上位，长卵圓形，长约4毫米，5室。花柱单体而短。蒴果肉质，圓柱形，两端尖，长约17毫米。（見附图水金鳳）

藥用部分 花根

附註 图考，水金鳳列水草內謂：“生雲南水澤畔，葉、莖俱似鳳仙花，葉色深綠。”引滇本草原文。又云：“殆能去濕，夏秋時，葉梢生細枝，一枝數花，亦似鳳仙而有紫黃數種，尤耐久。”



水 金 鳳

蛤 螞 草 車 前 子

本品为車前科(Plantaginaceae)植物車前 *Plantago major* Linn.

别名 茅苡 牛舌 騰烏 當道 牛遺 馬烏 蝦蟇衣 車輪菜 地衣
地胆頭 錢貫草 白貫草 蛤蟆葉 車前草 茅苡

原文 [蛤螞草, [子名車前子] ①。味苦鹹②, 性寒。消上焦火熱, [清] ③胃熱, 明目, 利小便, 分利五淋, [赤白便濁] ④, 止水瀉, [消水腫] ⑤。] ⑥
[退眼赤] ⑦。

(奇方) 治小兒傷食吐瀉, 失于調養⑧, 日久脾虛作脹, 肚大青筋, 肚腹壅脹或發熱, 服之奇效。

淮山藥一兩(生用五錢, 飯上蒸用五錢)⑨, 車前子五錢, 發熱加銀柴胡三錢, 有蟲加蕪夷⑩三錢, 無蟲不加, 共爲末, 每服二錢, 空心滾水下⑪。

——云南丛书本卷下第6——7頁

校 ①务、世本“蛤螞草”与“車前子”分为两目, 从本“車前”缺味性疗效。兹据务、世本补入, 合为一条。范本作“即大車前草葉”。

②务、世本“車前子”条, 原作“味鹹”, 依务、世本“蛤螞草”条作“味苦鹹”, 蛤螞草实有苦味。

③⑤原缺, 据范本及务、世本“蛤螞草”条补入。

④原缺, 据务、世本“蛤螞草”条补入。

⑥此节据务、世本“車前子”条补入。

⑦据范本增。

⑧务、世、李本作“不急調治”。

⑨“淮山藥”用量，务、世、李本作“一兩五錢，飯上蒸用一兩，生用五錢”。琴本作“一兩、蒸五錢”。

⑩务、世、李本作“撫夷”。

⑪务、世、李本缺“共爲末，每服二錢，空心滾水下”二句。又丛本于奇方前，未著录药性治效，依务、世、李、琴本增。

植物形态 多年生草本，自生于原野，高11—26厘米。根为多数鬚根，有一短而厚的根莖。叶全部根生，有长柄。叶柄长达8厘米，上面有槽，直立或斜展。叶矩圆状卵形或闊卵形，肉質厚，长3—7厘米，寬1.7—3.2厘米，全緣，或有不明显的鈍齿；上面綠色，下面淡綠色，光滑或着生短柔毛，有脉5—7条，下面隆起而明显。夏天叶丛間出花軸，穗状花序，长6—12厘米，直立，纤弱。开綠白色小花，花通常密集，外有一鱗片包被。花冠小漏斗形，較萼稍长。先端4裂；裂片小三角形向外扩展或反卷。雄蕊4枚与花冠裂片互生，伸出于花冠筒外，花絲細絲状，长约6毫米。雌蕊1枚，子房卵形，长约1毫米，花柱絲状，长3—4毫米，柱头密被白色羽状細絲毛。果实为宿萼蒴果，呈紡錘形，长约5厘米，成熟时横裂为二，上半部有如一盖，长钟形，頂端具有花柱殘底，下部有宿萼。蒴果內有卵形黑色，种子4—8粒，长约3毫米。（見附图蛤蟆草）

药用部分 全株及种子

附註 务本卷一上及图考有“大楓草，亦名車前或大蛤蟆葉”。务本謂“形似車前草”。道光云南通志卷68引滇南本草：“車前，名大楓草，一名蝦蟆集。”均与此“蛤蟆草”名称相似，并非一物。

务本卷二后有外附單方，原文如下：“小便不通，用车前草搗汁入蜜，同煎服；風赤眼，用车前子洗淨，杵爛敷眼胞上。”



蛤 螞 草

遍地金

本品为金絲桃科 (Hypericaceae) 植物 *Hypericum elodeoides* Choisy.

原文 遍地金，味苦澀，性寒。〔有收斂之功〕^①，治日久水瀉、久痢赤白。

〔遍地金〕^②，引〔用〕烏梅〔一個〕^③，糖〔少許〕^④，湯煎服。

——云南丛书本卷中第23頁

校 ①②③④原缺。据务、世、翰本增。

植物形态 一年生草本，高約20—30厘米。根呈鬚根状，黃棕色。莖直立，紅色或綠色，圓柱形，直徑約2毫米。叶对生，卵形或橢圓形，无柄，长1—2厘米，寬約0.5—1厘米，先端渾圓，基部略作心形，微抱莖，具腺状长毛。上面綠色，下面淡綠色，全緣。花为頂生聚繖花序。萼片5—6枚，卵状披針形，綠色，长2.5—5毫米，寬1—2毫米，先端尖，邊緣具紅色长腺体。花瓣5—6枚，黃色，橢圓状卵形，长3—5毫米，頂端銳。雄蕊多数，着生子房基部，合成三束，长短不等，花絲細絲状，黃色，花药橢圓形，背着，亦呈黃色。雌蕊1枚，子房卵圓形，長約4毫米，三室，秃淨，花柱三。蒴果近圓錐形、胞間开裂，長約3毫米。种子多数，棕色，細小。（見附图遍地金）

药用部分 全株



遍地金

金 鐘 茵 陳

本品为玄参科 (Scrophulariaceae) 植物 *Siphonastegia chinensis* Benth.

別名 陰行草 黃花茵陳 鬼麻油 吊鐘草

原文 金鐘茵陳，味苦，性寒。〔利小便〕^①。
療胃中濕痰熱發黃，或眼仁發黃，或周身發黃。消水腫。服後忌豆。


——云南丛书本卷下第 2 頁

校 ①原缺，据务、世本增。

植物形态 一年生草本，生于林野向阳之地，高36厘米至1米以上，全体密被短柔毛。莖直立，上部多分枝。叶对生，有短柄，羽状分裂。裂片狭，綫形至披針形，长约1—3厘米。夏季开花，花多数，排列成总状花序。萼下有綫形小苞二枚，长3—9毫米。花梗細圓柱形，长1.5—3毫米。萼細长管状，长约15毫米，有10条突起的綠色縱脉，脉間膜質，先端5裂；裂片橢圓状卵圓形，长约4—6.5毫米，寬約1.5毫米。花冠黃色，超出萼外，唇形，长约2.1厘米，直徑約8毫米；花冠管細，长约1厘米，上端膨大，裂成2唇形，下唇較寬，上唇外面被长柔毛。雄蕊4枚，着生裂口下方，花絲黃色，細絲状，长约1厘米，花藥橢圓形，长2毫米，背着。雌蕊1枚，子房上位，长卵圓状橢圓形，略扁，长约4毫米，花柱单体，絲状，柱头头状。果实具宿萼，含多数种子，于10月成熟。（見附图金鐘茵陳）

藥用部分 全株

附註 圖考：“陰行草，產南安，叢生。莖硬有節，褐黑色，有微刺，細葉。花苞似小罌，上有歧，瓣如金櫻子形而深綠。開小黃花，略似豆花。氣味苦寒，土人取治飽脹，順氣化痰，發諸毒。湖南嶽麓亦有之，土呼黃花茵陳。其莖葉頗似蒿，故名。花浸水，黃如槐花。治證同南安，陰行茵陳，南言無別。宋圖經謂：茵陳有數種，此又其一也。滇南謂之金鐘茵陳，既肖其實形，亦聞名易曉。主利小便，療胃中濕痰熱發黃，或眼仁發黃，或周身黃腫，与茵陳主療同。其嫩葉綠脆，似亦可茹。”



金鐘茵陳

響 鈴 草

本品为蝶形花科 (Papilionaceae) 植物 *Crotalaria ferruginea* Grah.

別名 假地蘭 馬響鈴

原文 響鈴草，味苦〔微〕①酸，性寒。入肺，斂肺氣。止咳嗽，消痰，定喘。

(單方) 治久咳嗽、痰〔中帶〕②血，響鈴草蜜〔炙〕③煎湯服效。

——云南丛书本卷中第25頁

響鈴草，生田野間。軟枝綠葉，葉下有一大葉，似豆狗形。內有細子，老黑色，氣味辛、酸苦。主治石淋內結，亦止咳嗽吐痰，定喘降氣，神奇。搗爛敷瘡最良。

——范洪“圖說”卷三第15頁

校 ①原本无“微”字，据务、琴、翰本增。

②原作“上代”依务、翰本改。

③原作“炒”依务、翰本改。

植物形态 多年生草本，直立或略橫展，通常分枝甚多。根圓柱形，細長，外表棕黃色。莖綠色，圓柱形，被黃褐色粗毛。叶为单叶，具短柄，紙質，矩圓形或卵狀矩圓形，長1.5—5厘米，寬0.5—

2 厘米。先端鈍，基部楔形，两面均被粗毛。托叶披針形，宿存，常反拆。总状花序伸长疏散，有花 2—8 朵，連花序柄长 4—10 厘米，被黃褐色扩展长毛。苞片似托叶，宿存。萼长 12—15 毫米，被黃褐色緊貼絲毛，分裂几达基部。上面裂片披針形，下面裂片綫形。花冠黄色，稍短于萼，旗瓣沿脊部有毛。莢果狭矩圓形，长 2.5—3.5 厘米，秃淨。有种子 20—30 顆，种子腎形，褐色，有光泽，长约 2 毫米，寬約 1.5 毫米。（見附图響鈴草）

药用部分 全株



響 鈴 草

苦馬菜

本品為菊科 (Compositae) 植物 *Lactuca asper*。

別名 瀕苦菜 苦益菜 羊奶菜 小鵝菜

原文 苦馬菜①。味苦，性大寒。純陰之物，得向陰之處則生②。涼血，治血熱妄行，止一切血症：吐血、〔嘔血〕③、咯血、咳血、衄血、大腸下血、女子逆經倒血。消痰，消癭瘤，消咽喉結氣，化痰毒，洗瘡毒。

(附案) 昔〔有一人〕④，吐血咳嗽〔痰帶血，發熱惡寒，肢體痠疼，自汗、盜汗，飲食無味〕⑤，吐痰又如瑪瑙紅白，形樣似膿。一醫授以此方，後救數十人，其功良效。

苦馬菜搗汁一小鐘 全〔秦〕歸⑥三錢 〔淮〕熟地⑦二錢 〔淮〕生地⑧一錢五分 杭〔芍〕⑨一錢 粉丹皮一錢 陳皮一錢 川貝母一錢 黑元參一錢 白茯苓一錢〔五分〕⑨ 天門冬三錢⑩ 浙麥冬二錢 百合一錢 甘草五分

不用引〔水煎服〕⑪，忌魚、羊，煎炒〔熱物〕⑫。

(補註) 人身之血，猶地中之水也。水行就下，故下流運行不息，滋養臟腑，貫注經絡。血為榮，氣為衛。榮衛晝夜循環，運行不息。心生血，脾統血，肝藏血，腎納血，臟得血能津，腑得血能潤，目得血能

視，舌^③得血能言，手得血能握，足得血能步。血隨氣行，氣逆而血逆矣。若氣血偏勝而成〔疾〕^④，勞傷火動，皆令失血。陽勝陰虛，火載血上，錯經妄行，則爲逆矣。陽有餘，氣盛則升，血出上竅，自口鼻而出也。陽不足，氣虛則陷，血出下竅，大小便而出也。先吐血，後見〔痰〕^⑤者，或痰出帶血絲者，陰虛火盛，治以滋陰降火可也。先見痰、後見血，痰上帶紫黑色者，如瑪瑙紅白者，是肺胃積熱也。治以清肺^⑥化痰涼血之法。鮮血者，新血也，宜止之。紫黑成塊者，瘀血也，宜消去之。色淡微黃者是白血，此症見之，是名危症也。鼻血名血衄，出於肺，名肺火熱極^⑦也。咳血出於肺，因傷風，肺有熱痰^⑧，陰虛肺勞，咳血作虛〔出肺也〕^⑨。咯血出於胃，咯出血屑成塊也。腎虛不納血。嘔血出於脾，吐血出於脾胃，〔唾血出於腎，鮮血隨唾而出也〕^⑩。溺血尿血出於小腸熱積也^⑪。

——云南丛书本卷中第20——22頁

校 ①范本作“苦買菜”。

②丛本作“純陽之物，得向陽之處則生”。“陽”字誤，据务、世、翰、琴本改为“陰”字。

③据范本增。

④丛、琴本作“昔一女子”，务、世本作“昔一男子”，两歧。兹据翰本改为“昔有一人”。

⑤此段原缺，据务、世、翰本增。

⑥原作“全歸”，据务、世、翰本增。

- ⑦⑧原作“懷”，据务、世、翰本改。
- ⑨“杭芍”原作“杭芍”，白茯苓原作“一錢”。据务、世、翰本增改。
- ⑩务、世、翰、琴本均作“二錢”。
- ⑪据务、世、翰本增。
- ⑫据琴本增。
- ⑬原作“口”字，据务、世、翰本改为“舌”字。
- ⑭务、世本“疾”字作“痰”字。
- ⑮原作“疾”字，据务、世、翰、琴本改为“痰”字。
- ⑯务、世本作“清熱”。
- ⑰原作“急”，据务、世本改。
- ⑱各本作“餘痰”。
- ⑲据务、世本增。
- ⑳此句据务、世、翰本增。
- ㉑务、世、翰本作“熱積故也”。

植物形态 直立，野生草本，高20—60厘米。莖略帶方形，中空，下部多紅紫色，上部綠色，有腺毛，单莖或分枝，禿淨而有乳汁。叶根生及互生，矩圓形至披針形，长5—14厘米，寬2—5厘米，不分裂或羽状深裂。頂端的裂片为三角形，长2.5—3.5厘米。基部漸窄呈兩側有翼的叶柄或呈耳形而抱莖，邊緣有不規則的尖齒。上部的叶狹而抱莖，基部有一尖銳的耳，先端長尖。春天开花，头状花序組成矩圓錐花序。总花梗长0.7—3.6厘米。总苞狭圓錐形或圓柱形，长8—12毫米；苞片披針形，1—3列，薄，外—列較短，长约4毫米，最內的一列与总苞等长。花黄色，两性，全为舌状，直徑1.5—2厘米。花冠全长9—11毫米，距基部約 $\frac{1}{2}$ 处連成細管状，白色，外被多数冠毛，肢片黄色，頂端五裂。雄蕊5枚，着生花冠管内面，花絲纤细，分离，花药相連呈管状，包圍于花柱外面。子房下位，橢圓形，花柱絲状，柱头二又，伸出于花药管之上。瘦果淺褐色，有喙，

橢圓形而扁，長約3毫米，表面有縱稜，冠毛豐富，白色，柔軟。

(見附圖苦馬菜)

藥用部分 全株

附註 圖考：“滇苦菜即李時珍所謂胼。葉似花蘿蔔菜葉，上葉抱莖，似老鸛嘴，每葉分叉攢挺如穿葉狀。而別錄以為生益州，凌冬不死者也。滇人亦呼苦馬菜。貧人摘食之，四季皆有，江湖間亦多。故李時珍以為即苦菜，與北地苦蕒迥異。中州或謂為蒲公英，用治毒亦效。蓋性皆苦寒，所主固可同耳。畿輔通志：苦益菜，可生食，亦可曬乾，即此。”



苦 馬 菜

烏 藥

本品为馬鞭草科 (Verbenaceae) 植物 *Clerodendron yunnanense* Hu.

別名 臭牡丹 滇常山

原文 烏藥，一名臭牡丹。味辛苦，性溫。消胸膈肚腹脹，下氣，利小便，消水腫，止氣逆腹痛。

〔烏藥花〕①治婦人紅崩，點水酒煨服。

——云南丛书本卷下第8頁

校 ①原作“其花”，据务、世、李本改。

植物形态 落叶大灌木，高可至2米以上。枝暗紅色，有縱向皮孔。幼枝密盖污黄色短卷毛茸。叶对生，无托叶。叶柄棒圓，长1.2—3.5厘米，亦生污黄色或白色短卷毛茸。叶片腎状卵形至卵形，先端銳，漸尖或圓形，基部心形，长4—14厘米，寬4.7—12厘米，全緣，或稍帶波状，或具粗疏不規則的鋸齒，上面綠色，下面帶灰白色，兩面均密生短柔毛，触之有臭气。夏季开花，平頂，聚繖花序，頂生，寬3—10厘米。总花梗长3—5厘米，具密生污黄色或白色短卷毛茸。次生花梗，基部具橢圓形苞片。花柄具綫状苞片。花白色，略帶紅暈，長約1.4厘米。花萼鐘形，宿存，長約8毫米，外部密生短柔毛，頂上具五裂片，裂片卵状三角形。花冠漏斗状，長約9—12毫米，花冠管細，長約4毫米。裂片五，寬而先端近圓形，長約5毫米。雄蕊4枚，着生于花冠喉部，花絲細，長約8毫米，花药橢圓形或卵圓，背着。子房球形，長約1毫米，禿淨，花柱长1.6毫米，柱头2裂。果

实为宿萼核果，核果球形或倒卵形，亮藍黑色。（見附图烏藥）

药用部分 花 叶 根 莖

附註 图考云：“滇常山生雲南府山中，叢生，高三四尺，葉莖俱如木本，葉厚韌，面深綠，背淡青，茸茸如毛。夏秋間，在莖端開花，三萼并擢，一穗數十朵。花如杯而有五尖瓣，翻捲內向，中擊圓珠，生青熟碧，蓋花實并綴也。花厚勁，色紫紅，微似单瓣紅山茶花，但小如大拇指，不易落。宋圖經海州常山八月花，紅白色，子碧色似山棟子而小，微相仿佛。”



烏 藥

魚腥草

本品为三白草科 (Saururaceae) 植物 *Houttuynia cordata* Thunb.

别名 蕺菜 薺菜 足耳根 狗貼耳 熱草 十藥 重藥

原文 魚腥草，味苦辛，性寒〔平〕①。治肺癰咳嗽〔成勞〕②（帶膿血者，痰有腥臭）。解大腸熱毒③，療痔瘡〔五痔皆痊〕④。

（附方）治肺癰吐膿吐血。

魚腥草 天花粉 側柏葉〔等分〕⑤ 煎湯服之即愈。

（又方）治痔瘡，不論內外。

魚腥草，煎湯點水酒服，連進三服。其渣〔薰〕⑥洗患處⑦，有膿者潰，無膿者自消。

——务本堂本卷二第22——23頁⑧

校 ①②③④据范本增。

⑤据翰本增。

⑥原作“薰”，据翰本改。

⑦据翰本增。

⑧此药原文，丛、琴本缺第一方，故采用务本。

植物形态 有臭气，多年生草本，自生于田野阴湿地。下部的茎匍匐地下，节生鬚根；上部莖直立，高30—60厘米，光滑无毛，有时

紫色。叶互生。托叶寬而长，頂端鈍，基部抱节或全部連生于叶柄，通常下半与柄合生，上半分离，长1—2.8厘米，边疏生纤毛，紙質，綫形，鈍头。叶柄长3—3.5厘米，基部抱莖，有稀毛或几乎无毛。叶心形，頂端漸尖至长尖，长4.5—7厘米，寬4—6厘米，全緣。上面暗綠色，有細粒密生；下面常現紫色，两面除叶脉稍被柔毛外，全秃淨，基出三脉，其上側脉二。穗状花序，出自莖的頂端，长约1.5厘米，与叶对生。花序梗长1.5—3厘米，每莖一序。花序下面具白色总苞四片，倒卵状方形，頂端圓，长1—2厘米，寬7—12毫米，除边有短細毛外，余无毛。花小而密 无花被，只有极小的苞片一枚，披針形。雄蕊3，长约3毫米，花絲长约為花粉囊中的二倍，无毛。雌蕊卵形，柱头3，秃淨。果为蒴果，頂部开裂。种子卵形，有条紋。（見附图魚腥草）

药用部分 莖 叶

附註 图考：“魚腥草，生陰濕地。細莖短葉，秋作細穗，如綫三叉。天陰則氣腥，馬不食之。實極小，歎歲則茂。北地謂之熱草，亦採以充飢。”



魚 腥 草

魚 眼 草

本品为菊科 (Compositae) 植物 *Dichrocephala Benthamii* Clarke.

別名 星莠草 星宿草

原文 魚眼草，味苦，性寒。治小兒臟腑極熱風熱。小兒瀉綠水者，搗汁〔燉〕①乳服，〔或〕②搗汁點酒〔服〕③截瘧疾尤效。

〔(補註) 小兒乳食結④，日安夜哭。蓋因腹痛屬綠屎之故〕⑤，〔并皆治之。又治水疔，合沙糖搗濫，敷即愈〕⑥。

——云南丛书本卷下第2頁

- 校 ①原作“頓”，依翠本改。
②③依务、世、翰本增。
④原为“乳結”，依文意增。
⑤此三句依务、世本增。
⑥此四句依翰本增。

植物形态 一年生草本，幼时近乎直立，以后老枝斜卧地上，高8—20厘米。分枝多，莖紫色或綠色，密被白色柔毛。叶互生，倒卵形或矩圓狀橢圓形，长3.5—6.5厘米，寬1.2—2.4厘米，先端銳尖，基部漸狹成耳形，邊緣有不規則齒缺，在叶中部以下者，常成琴狀羽裂，上面暗綠色，下面綠色，兩面均被柔毛。春末至夏秋开花。头状花序极小，为圓錐花序式排列，异型，球狀或半球狀。总苞不明

显。苞片2列，卵状披针形或卵形，绿色，缘膜质无色，少被绒毛。花托半球形，具多数椭圆形突起。花全为管状，外围的雌性，多列，全发育，花冠圆锥体形，顶端2裂，白色。中部的两性发育，花冠绿黄色钟状，顶端4裂。雄蕊4枚，与花冠裂片互生，花药基部2齿裂。雌蕊1枚，花柱长，伸出花冠之外。瘦果扁平，无冠毛。（见附图鱼眼草）

药用部分 全株



魚 眼 草

扁 柏 葉

本品为柏科 (Cupressaceae) 植物側柏 *Biota orientalis* Endlicher.

别名 側柏 扁松 黃柏 香柏 崖柏 柏刺 榭 偏柏 柏枝葉

原文 扁柏葉^①，味辛、微酸苦，〔性寒〕^②。搗汁治吐血、鼻衄血、嘔血、小便尿血。婦人暴崩下血，并皆治之^③。

——云南丛书本卷中第20頁

校 ①丛、琴本作“扁柏葉”，务、翰本作“側柏叶”。

②原缺，据务、翰、琴本补。

③务本作“附方：治止吐血、鼻衄血、嘔血、淋血、婦人暴崩下血。側柏葉搗汁，點水酒服”。

植物形态 常綠乔木，高10—15米。树干直立而端整，树冠塔形。树皮薄，灰紅褐色。树枝向上伸展，小枝綠色，扁平，排列成一个平面。叶鱗片状，紧抱枝上，成对互生，排列成4列。花小，单性，雌雄同株，生于小枝頂端。雄花球黄色，卵球形。雄蕊6—10枚，具細短花絲，花药2—4室，药隔圓形。雌花球紫色，无柄，由6—8心皮組成，每一心皮内面基部着生2胚珠。球果卵球形，直徑約18毫米，嫩时綠色，肉質，被藍白色的蜡粉，成熟时藍紫色，开裂；果鱗6—8片，木質，肥厚，卵圓形或橢圓形，外面先端下部有一鈎状突起，下部4片較大，各具种子2枚，頂端2—4片較小，不具种子。种子无翅，深褐色，呈卵圓形，長約6毫米，寬約3毫米。

(見附图扁柏葉)

藥用部分 叶 种子 果 根 皮 枝 节 油脂

附註 柏实早見于本經上品：“味甘平。主驚悸，安五藏，益氣，除濕痹。久服令人悅澤美色，耳目聰明，不飢不老，輕身延年。生山谷。”名醫別錄謂：“柏葉尤良。柏葉，味苦，微溫，無毒。主治吐血、衄血、痢血、崩中赤白。輕身益氣，令人耐寒暑，去溫痹、生肌。四時各依方面採，陰乾，根白皮，主火灼爛瘡，長毛髮。”

陸佃埤雅云：“柏有數種，入藥惟取葉扁而側生者，故曰側柏。”此外唐本草，圖經、綱目等，對柏枝节、柏实（柏子仁）、柏根白皮、柏叶、柏脂等，均分別有解說。云南扁柏，分布地区甚廣，柏枝叶有止血功效 亦屬民間习用单方，与滇本草相符合。

務本卷二外附良方：“湯火瘡，用生柏枝葉杵爛敷之，或用柏枝樹油白皮燒灰敷，可治火灼爛瘡。”

醫門擊要：“便血附方，剪紅丸治臟腑虛寒下血不止，面色痿黃，日久羸瘦。

側柏葉(酒炒)	鹿茸(醋炙)	附子片	續斷(酒炒)
阿膠(蒲黃炒)	黃芪	當歸(酒炒)	白礬(煨)”



扁 柏 葉

五味草

本品为紫堇科 (Fumariaceae) 植物 *Corydalis stenantha* Fr.

别名 金钩如意草 地锦苗 紫堇 水金钩如意

原文 五味草，一名金钩如意草。味有五，故名五味。性微寒。祛风，明目退翳，消散一切风热、肺劳咳嗽发热、肝热劳烧怕冷①，走筋络，治筋骨疼、痰火等症。

昔太华山赵道人久服此草，轻身延年，聪耳明目。

(单方) 治眼目生玉翳，或生〔雾〕②翳，青盲。

五味草二钱 穀精草一钱 木贼草五分 青箱子五分 共合一处，煎汤服。

——云南丛书本卷中第8页

校 ①原作“肝劳发热怕冷”，依琴本改。


②原作“露”，依琴本改。

植物形态 一年生直立、秃净、柔弱草本，多生于林荫荒地，高25—50厘米。主根圆锥形，侧根纤维状。莖柱形，单出或略分枝，纤细，多叶。叶为二回三出，轮廓五角状阔卵形，长4—7厘米，宽7—10厘米，基生叶的叶柄较莖生叶的叶柄长。小叶片膜质，上面绿色，下面淡绿色，具白粉，楔状近圆形，长2.5—4厘米，宽1.3—4.5厘米，三回裂至三深裂，深裂片又三回裂，长1.5—2.5厘米，

寬2—3厘米，先端銳或鈍，基部寬楔形。小葉柄長8—18毫米。總狀花序長6—10厘米，着生10—16花。花梗長5—15毫米，基部具苞片。上部苞片匙狀長倒卵形，全緣，三齒至三圓裂，向下漸成葉狀。花左右對稱，紫堇色，長20—23毫米。萼片二枚，卵形，緣具淺尖齒，易脫。花瓣脊上具翅，基部多少相融合。上面一片，斜漏斗形，具長距，微向下彎，鈍頭，距中有一黃色指狀密腺；下面一片匙形，長10—13毫米，寬5毫米，側面二片具長爪。瓣肢倒卵形，全長10—12毫米，寬4毫米，二片頂端互相粘着，構成船形，包護雌雄蕊。雄蕊二束，每束三枚，長11毫米，融合花絲薄片狀，中部略膨大，花藥長1毫米，卵形。雌蕊綫形，長12毫米，上部漸狹成花柱，花柱宿存，柱頭扁平。蒴果長角狀，長達2.5厘米，全體具細突起，含種子處略膨大。種子腎形至近圓形，種皮亮黑，具極細網紋。（見附圖五味草）

藥用部分 全株

附註 圖考在“地錦苗”條下，引滇本草“五味草”。并謂“地錦苗，江西園圃平野多有，春初發生。莖葉似胡葵，而葉末稍圓。梢枝開紫花，如小魚形，參差偃仰，附當花中，尾尖首頷。有兩小瓣，開合如唇，花罷結角。入夏漸枯。”又云：“按救荒本草，地錦苗生田野中。小科 苗高五七寸，莖葉似圓葵。葉間開紫花，結小角豆兒。苗葉味苦，燥熟浸淨，油鹽調食即此。滇南謂之‘金鈎如意草’，一名‘五味草’。”



五味草

地 草 果

本品为堇菜科 (Violaceae) 植物地草果 *Viola philippica* Cav.
Subsp. *malesica* W. Beck.

別名 堇堇菜 寶劍草 半邊蓮 犁頭草 紫金鎖 紫花地丁

原文 地草果，味辛酸，性微〔寒〕①。入肝經，走陽明。破血破氣，舒肝家鬱結之氣，風火眼暴赤疼痛，祛風，退翳，〔白〕②膜遮睛。蓋肝氣結而翳成，散〔結則〕③雲翳自退。但肝實者可用，肝虛者忌之。婦人奶乳閉結不通，腫脹硬疼〔紅腫成癰〕④，〔并皆治之〕⑤。

地草果，〔滇中有三樣〕⑥：開白花、綠花〔入肝〕⑦，治眼科良。開紫花者〔散血，故治婦人乳結疼效〕⑧。開黃花者，治寒氣肚疼效。⑨

（奇方）治婦人乳結不通，或小兒吹着，或〔自身壓着〕⑩乳汁不通。見症若頭疼、怕冷、發熱、口乾、身體發困、乳頭乳傍紅腫脹硬、咬疼如針刺。

古方單劑治乳汁不通疼痛，今加增治之，良效。

地草果二錢 川芎錢半 青皮五分 北柴胡一錢 白芷一錢
天花粉一錢 金銀花一錢 甘草節五分 引點水酒服。

（補註）乳頭厥陰肝經所屬，乳傍陽明胃經所屬。乳母不知調養，忿怒鬱結，故厥陰之氣不行，陽

明之乳〔汁不得升騰〕^⑪，以致有乳房紅腫疼痛〔結核〕^⑫之症。是方，地草果、青皮、川芎、柴胡行肝經鬱逆之氣，白芷、花粉〔升陽明之乳汁〕^⑬，甘草和中緩肝，銀花消紅腫熱毒，〔乳汁自然流通或潰或散，因症調治而愈〕^⑭。

（增補）治目疾暴赤火眼，風熱腫痛，羞明怕亮，翳膜遮睛。

地草果一錢 川芎一錢 白蒺藜一錢〔去刺搗汁〕^⑮ 木賊五分 穀精草一錢 白菊一錢 黃芩一錢 梔子一錢 蟬蛻一錢〔去頭足〕^⑯ 引點羊肝一片煎服。

——云南叢書本卷上第16——17頁

校 ①从琴本及圖考作“溫”，范、務、世、翰本作“寒”，以“寒”字為是。

②“白”字據范本增。

③原作“散肝氣”，據圖考改。

④此句據范本增。

⑤此句據翰本增。

⑥⑦⑧據范本增。

⑨此段范本作“滇中有三樣：紫花者散血，故治婦人乳結。白花者入肝，治眼。黃花止腹中冷痛，最效。”

⑩原作“身體壓注”，據務、世、翰本改。

⑪原作“不升”，據務、世本增。

⑫此二字據務、世本增。

⑬原作“行陽乳汁之不升”，據琴本改。


⑭此二句據翰本增。

⑮⑯據務、世、翰本增。

植物形态 多年生草本，自生于山地。根有多数支根及鬚根。叶丛生，叶柄长约4.2—8厘米，具短柔毛。叶卵状心脏形，长1.4—3厘米，寬1.5—2.8厘米，叶緣圓齿状，二面均生短毛。托叶小，与叶柄合生，膜質。春天，叶間抽花梗，开青紫色花，花单生，徑約1.7厘米，花梗有时长于叶，中部以下有披針形小苞片二枚，长约1厘米。萼片披針形，长约0.6厘米，綠色，邊緣膜質，基部不等的下延。花瓣五枚，最下一枚最大，基部距形，距鈍。雄蕊五枚，花药向內环繞雌蕊，药隔扁平，延伸于药室外，而成一薄質的附属体，两枚花药的基部有附属体，延伸于距內。子房上位，卵形，柱头截形，略扩大具喙。果实为蒴果，3瓣裂。种子球形，黃色。（見附图地草果）

药用部分 全株

附註 图考繪董董菜、犁頭草、寶劍草、如意草四图，在“犁頭草”一条下，引滇本草“地草果”条以說明之。謂：“犁頭草即董董菜，南北所產，葉長圓尖缺各異，花亦有白紫之別。又有寶劍草、半邊蓮諸名，而結實則同。滇南謂之地草果，以治目疾乳腫。”



地 草 果

麥穗夏枯草

本品为唇形科 (Labiatae) 植物 *Prunella asiatica* Nakai.

別名 鐵綫夏枯草 麥夏枯 夕句 乃東 燕面 鐵色草 滁州夏枯草 牯牛嶺

原文 麥穗夏枯草，開紫花者形如麥穗，〔又名〕^①鐵綫夏枯草。味苦，微辛，性微溫。入肝經，祛肝風，行經絡。治口眼歪斜，止筋骨疼，舒肝氣，開肝鬱。治目珠〔脹〕^②痛，消散瘰癧〔周身結核〕^③、手足周身節骨酸疼。

〔附方〕治嘴歪，或因惡風吹着，或因胃痰犯〔肝〕^④，口眼歪斜。單用〔麥穗〕^⑤夏枯草一味，燒酒服，應效。

〔麥穗〕夏枯草^⑥三錢 胆南星五分 防風一錢 鈎藤草一錢 〔水煎〕^⑦ 引點水酒臥時服。

〔(附案)有紀姓者，身胖多痰，因風吹口歪，用麥夏枯煨水酒服立愈。後傳方與人，屢用屢驗。〕^⑧

——云南丛书本卷上第18—19頁

校 ①据务、世、琴本增。

②原作“夜痛”，据翰、琴本改。

③据务、世、翰本增。

④据务、世、翰、琴本增。

⑤⑥原作“夏枯草”，惟此方既系“麥穗夏枯草”附方，应

加“麥穗”二字，以資區別。

⑦据务、世、翰本增。

⑧附案原缺，据翰本增。

植物形态 一年生多枝斜臥草本，野生草坡阴湿处，高14—40厘米。主根不甚发达，多側根。莖方形，紫綠色，有时略扭曲，幼部沿稜生有短毛，老部漸稀疏或近光滑，近地匍匐之节多生不定根。叶对生，无托叶，綠色，下面色較淡。叶柄越上越短，以致无柄。叶片卵形至长橢圓形，长1.5—4厘米，寬1—2厘米，先端銳尖或略鈍，基部闊楔形至近圓形，无柄者基部略呈心脏形，叶緣疏生淺圓齿或全緣，叶两面均疏生白色短毛或无毛，中脉不甚明显，側脉3—4对。春夏間，开紫色花，花序穗状，短而密，长1.6—4.7厘米，由生长苞片腋中之輪生聚繖性花丛6—7层构成。苞片每层2枚，膜質，叶状对生，扁腎形，长5—14毫米，寬6—12毫米，先端尖，綠白色，染以紫色，边具纤毛，其他部分具短柔毛。花萼鐘形，前方有粗毛，后方光滑，长约10—11毫米，紫綠色，具二唇 宿存；上唇长约7毫米，平坦，頂端有3小淺齿，边具纤毛；下唇較窄，2裂，裂片三角形，端漸尖，背面有粗毛，沿边亦有纤毛。花冠唇形，淡青紫色，具长约1毫米之短柄，长8—10毫米，下部管状，向上展开而略为平坦，上唇作帽状，倒卵形至长橢圓形，頂端微凹，背面有微毛或近光滑；下唇开展，3深裂，兩側裂片斜卵形，中裂片扇形，边緣向內微卷而細裂。雄蕊4枚，着生上唇1对长约2毫米，着生下唇1对长约5.5毫米。花絲絲状，下唇1对頂端具2短裂，其中一端着生花药，花药白色，有小瘤突。雌蕊1枚，子房小，4裂，呈綠色。花柱柱状，高約7毫米，柱头2裂。果包藏于宿存褐色萼筒中。小坚果4枚，橢圓形，高不及2毫米。（見附图麥穗夏枯草）

药用部分 全株

附註 圖譜謂：“滇南麥穗夏枯草，即他省之夏枯草。其曰麥穗者，蓋象其花序形狀，以別於他種夏枯草。”註詳夏枯草，茲不重述。



麥穗夏枯草

接骨草

本品为唇形科 (Labiatae) 植物 *Lamium amplexicaule* L.

別名 蓮台夏枯 毛葉夏枯 燈籠草 蓮台夏枯草 佛座

原文 接骨草，〔一名〕蓮台夏枯草，〔又名毛葉夏枯，又名燈籠草〕^①。味苦，性溫，行十二經絡。〔治〕^②筋骨痰火疼痛，手足麻木不仁。祛周身游走之風，散癩癰手足痰核。治跌打損傷，接骨。止腦漏鼻淵，效。包痰火紅腫疼痛。

（單方）治一女子兩腿生核，形如桃李，紅腫硬痛。

接骨草三錢 引點水酒服，五服後全愈。〔後〕二年又發，加葳靈仙、防風、虎掌草，〔三服而愈〕^③。

（單方）吳姓以此草治跌打損傷紅腫疼痛，不能落地；接骨草^④、苧麻根、蜂蜜、雞蛋清、大薊共五味，搗爛包患處。一宿一次，三次全愈。

日久腫疼，加生薑、葱頭三棵〔再包〕^⑤

治痰火發時，或手足紅腫疼痛。

接骨草五錢 雞脚刺根三錢^⑥ 土黃蓮二錢 共搗爛點酒包敷疼處三次，腫消疼止〔後，加蒼耳，白芷、川芎、去黃連、雞脚刺根，點水酒煎服三次。此二方屢經証驗，惟新病可用，久病不可用〕^⑦。

(單方) 治腦漏疼痛，鼻流黃涕腥臭。

接骨草^{三錢} 增加〔香〕白芷^⑧ 川芎 蒼耳子引點水酒服。

一人〔路〕^⑨ 遇狂風吹着，口歪眼斜，半身麻木疼，用之神效。

接骨草 防風 鈎藤 胆南星 引點水酒燒酒服，良效。

—云南丛书本卷上第19—20頁

接骨草，氣味溫辛平。此草行十二經絡，治跌打損傷，骨碎筋斷，酒下如神。或左癱右瘓，四肢不仁，服之則愈。此乃仙草中之將軍，其功不能盡述，滇中之人多不識者。

—范洪“圖說”卷四第22頁

校 ①②③原缺，据务、世、翰本增。

④琴本作“接骨草根”。

⑤原缺，据务、世、翰本增。

⑥务、世、翰本作“二錢”。

⑦此段原缺 据务、世、翰本补入。

⑧原作“白芷”，据琴本增“香”字。

⑨据务、世、翰、琴本增。

植物形态 草本，基部稍木質，匍匐，上部直立或傾上生长，高9.5—60厘米，鬚根系入土不深，約7—8厘米。莖方形，肉質，綠色或紫色，疏具白色短柔毛。节間长2.5—12.5厘米。叶对生，无柄，穿莖。叶片近腎形，长1.4—2.6厘米，寬2.4—4.3厘米，頂端近圓

形，基部截形或微凹，邊緣有缺刻。上面脆綠色，中脉及細网脉均凹陷。下面色淡，中脉及網脉均隆起，叶片上生白色柔毛。花多朵成輪，腋生或頂生，无花梗。花萼卵状鐘形，長約5毫米，淡綠色，有柔毛，中部略膨大，頂端5齒裂，裂片三角状披針形，長約2.5毫米，頂端長尖，邊緣有白色長柔毛。花冠玫瑰色，花冠管直，長約1.8厘米，有柔毛，上部擴大成二唇；上唇闊矩圓形，長約5毫米，寬3毫米，全緣，頂端截形，兩側向下彎而成舟形，背面密被与花冠同色的柔毛。側裂片極短，中裂片長，又復成二裂。裂片矩圓形，斜展，長約3.5毫米。雄蕊4枚，着生花冠管基部，兩兩成對，藥室有毛，花絲長3—4厘米，花藥橢圓形，長約0.5毫米。雌蕊1枚，子房上位，四室，心皮2个，4裂，花柱生于子房裂隙的基部，花柱細長，柱頭2裂，雌雄蕊均藏于舟状上唇中。果4枚，由具一種子的小堅果組成，生于萼的基部。（見附圖接骨草）

藥用部分 全株

附註 通志：“接骨草，生祿豐，根可熬膏爲藥。”



接 骨 草

酸 餃 草

本品为酢漿草科 (Oxalidaceae) 植物酢漿草 *Oxalis corniculata* Linn.

別名 酸漿 三葉酸 三角酸 酸母 醋母 酸箕 鳩酸 雀兒酸 雀林酸 小酸茅 赤孫施 鹹酸草 酸味草 酢漿草

原文 酸餃草，味酸澀^① 性寒。止久瀉滑痢^②、赤白痢疾、或〔休〕息痢^③。〔用沙糖同煎服〕^④。

——云南丛书本卷中第23頁

校 ①务、世、翰本作“味酸微澀”。

②务、世、翰本作“治久瀉腸滑”。

③务、世、翰本作“久痢赤白休息”，又从本誤为“體息”，故改。

④丛本缺此句，依务、世、翰本补。

植物形态 多年生草本，自生于山野路旁，被以疏长毛。莖細多枝，平臥地面 长可达50厘米，通常节节生根。叶互生，有小叶三片，叶柄长2.5—5厘米。托叶小，与叶柄合生。小叶倒心臟形，无柄，长5—10毫米，寬6—13毫米。上面深綠色，光滑，下面色較淡，两面疏生白色柔毛，中脉在上面略凹，下面凸出，至夜小叶閉合，下垂，翌朝又展开。从春至秋，自叶腋抽花梗，开黄色花，1至数朵生于花序柄上，排列为繖形花序，长8—10毫米。花序梗长约与叶柄等。花梗长6—15毫米。苞片3—5枚，綫形，长约2毫米，被毛。萼片五枚，披針形，长5—7毫米，寬1—2毫米，被白色柔

毛，具窄膜質邊緣。花冠黃色，與萼片同數，在蕾中作回旋狀排列。花瓣倒卵形，長約8毫米，寬約長之半，外面肉紅色，基部綠色，有明顯的脈8至10條。雄蕊10枚，排成兩層。花藥橢圓形，背着。花絲綠白色，着生于子房基部，而包被子房。雌蕊1枚，圓柱形，子房上位，5室，花柱5，分離，柱頭上被黃色瘤狀突起。果實為宿萼蒴果，近圓柱形，長1—1.5厘米，有柔毛，略扭曲，具明顯的五條槽，每室有種子數顆，成熟時開裂，能將種子彈出。（見附圖酸餃草）

藥用部分 全株



酸餃草

酸 漿 草

本品为茄科 (Solanaceae) 植物 *Physalis Chinense* Franch.

別名 燈籠草 醋漿 苦葳 苦耽 皮弁草 天泡草 王母珠 洛神珠
紅姑娘 姑娘菜 九古牛

原文 酸漿草，味辛鹹，性溫。利小便，治五淋、玉莖疼痛，攻瘡〔毒〕^① 治腹癰，破氣血。

——云南丛书本卷下第6頁

酸漿草，氣味酸，微溫。主治癰疽發背大毒、腎腫莖痛等症。服之，可以破血消腫通利甚妙。

——范洪“圖說”卷七第14頁


校 ^①据务、世、李本增。

植物形态 披散，分枝草本，高可达1米以上，全体密被白色柔毛。莖褐色，木質，有稜，节間膨大。叶通常互生，有时2枚聚生。叶柄圓柱形，上面平，长0.9—2.6厘米。叶卵圓形，长4—8.2厘米，寬2.9—6.5厘米，先端尖，基部心臟形或偏斜，叶稍厚，邊緣多少波状，上面暗綠色，中脉及側脉平，網脉突出，下面灰綠色，脉隆起。春夏开花，单生叶腋或頂生，淡黄色，直徑1—2厘米，长约1.1厘米。花梗长8毫米左右。花萼鐘状，长约7毫米，頂端5裂，裂片3角形，长3.5毫米，結果时膨脹，将果包圍。花冠合瓣，闊鐘形，裂片通常5枚，有时6枚，喉部里面有紫褐色斑点和环状絨毛，管短，长5毫米左右，內面被絨毛。雄蕊5枚，着生花冠近基部处。花药橢圓形，长3毫米，着生花絲頂端，藍紫色，与花冠裂片互生。雌蕊1

枚，子房上位，2—3室，胚珠多数。花柱单生；柱头头状，长4.5—6.5毫米。果为浆果，球形，直径约1厘米，初为绿色，成熟时变为橘红色，包藏于一囊状的宿萼内，宿萼顶尖，有10条红色脉。（见附图酸浆草）

药用部分 宿萼

附註 范洪“圖說”所述酸漿草之藥性療效與其他版本所列酸漿草者相似。



酸漿草

九里光

本品为菊科 (Compositae) 植物 *Senecio scandens* Buch-Ham

别名 千里光 千里及 九里明 黄花枝草 黄花演 黄花草 金釵草
粗糠花

原文 九里光，味苦，性寒。洗疥癩癬瘡，去皮
膚風熱①。

——云南丛书本卷下第4頁

校 ①务、翰两本同。

植物形态 攀援状多年生草本，自生曠野。莖木質，高可达2米，棒圓略具綫稜。幼枝稍作之字形具短毛，其后禿淨。叶互生，向上漸成无柄之叶状苞片。托叶在叶柄基部，耳状，綠色，常抱莖，甚小。叶柄长5—15毫米，上面平或略凹，下面凸，基部寬展。叶狭三角状，卵形至披針形或鐮刀形，长3—9厘米，寬1—2厘米。先端漸尖，基部寬楔形至近圓形。側脉10对或較多，上面略下陷，下面突起，两面均具极短細柔毛。叶緣具不規則疏远淺尖，边緣具短曲纤毛。由头状花序組成繖房花序，頂生或腋生，直徑約10厘米。头状花序下之花梗長約1厘米，具多数鱗片状苞片，总苞片綫状披針形，長約3毫米，具白色边緣，宿存，果时开展而后翻下。花托盘状，周花舌状，雌性，全长約11毫米。冠毛絲状。花冠白色，肢片亮黄色，长橢圓形，具三縱走平行脉。子房下位，圓柱形，表面密生短柔毛，花柱柱状，柱头二裂。管状花两性，冠毛絲状。花冠頂部膨大成长鐘形，黄色，頂端五裂，裂片三角形。雄蕊五枚，合藥。雌蕊同前，但花柱較

长，长约5.5毫米。瘦果长椭圆形，长约2.5毫米，具5浅肋，棕褐色，疏生白短柔毛，顶端具开展之白色冠毛。（见附图九里光）


药用部分 莖叶

附註 陈藏器本草拾遺載“千里及”，綱目与图經本草之“千里光”合并敘述。图谱謂即系滇本草之“九里光”，惟“千里及，千里光”治疮兼治目疾，而“九里光”专作洗疮用。从本卷中第11頁別有破錢草，一名千光草，“明目退翳膜”。茲据草医及标本区别，別为一物。

綱目拾遺：“按千里光爲外科聖藥。俗諺云：有人識得千里光，全家一世不生瘡。綱目不載，入外科用”。又引白草鏡：“治目不清，去紅綠白障，迎風流淚”。又引王三才医便云：“治蛇傷，治鵝掌風。用千里光草一握，蒼耳草一中握，朝東牆頭草一小握，共入瓶內，水煎百沸，以手少擦麝香，向瓶燻之。仍用絹帛繫臂上，勿令走風，三次即癒。”又引王安采藥方：“治時疫，赤鼻，聾耳火眼，諸瘡癰腫毒破爛及鵝掌風。合千里光膏點赤眼，貼楊梅瘡，加狗油熬粉霜尤妙。”

图考云：“李時珍以千里光，千里急併爲一種，極确。惟黃花、濱花与此草同而葉異。南安人以其花洗目，呼爲黃花母。云：有毒不可入口，非此草也。”又云：“藥物異地則異名，而千里光之名，起嶺嶠，下豫章，逾彭蠡、洞庭，達於夜郎、牂牁，無弗同者。聞名而知其必有功於目已。其花黃如菊，盛于秋，得金氣 殆菊之別子耶。花老爲絮，則與蒲公英又類族也。滇醫以洗瘡毒，蓋以此。”（下略）

图谱既引图考“千里光”之产地治效，并作中名之考証云：“與今湘、贛之九里明，滇之九里光，形狀治症均同，圖考所圖尤肖。據此，諸名之爲一物，而此物必是本種，可無疑義。光、明義同，千、九音近，而及、急、茛并从一声轉訛，以及爲正，喻其恢复目力 可及千里也。”（下略）



九里光

木 賊

本品为木賊科 (Equisetaceae) 植物纤弱木賊 *Equisetum debile* Roxb.

别名 節節草 筆管草 鬮眼草 豆根草 纖弱木賊 鎖眼草 銼草

原文 木賊，一名節節草，一名筆管草，一名豆根草。味辛^①微苦，性微溫^②。行十二經絡。散肝家流結成翳^③，治暴赤火眼珠脹痛，退翳膜〔消弩〕^④肉遮睛^⑤，〔兼〕^⑥治五淋，玉莖疼痛，小便赤白症。根治婦人白帶^⑦淋瀝，破血〔積〕^⑧，通婦人經閉。止大腸下血^⑨。

——云南丛书本卷上第17—18頁

校 ①务本作“味辛酸”。

②务、翰本作“性微寒”。

③务、翰本作“散肝家鬱結”。

④原作“帑”，依务、翰本改。

⑤丛本此处有夹注云：“以上是木賊草本治，但木性不同”。

务本原文云：“以土木賊本性治，但土性不同。”詞意两本不同，均費解。翰本无此节，茲依翰本从略。

⑥依务、翰本增。

⑦务、翰本作“赤白帶下”。

⑧原作“血塊”，依务、翰本改。

⑨务、翰本无“止大腸下血”句。

植物形态 多年生草本，自生山野。莖由地下的根莖生出，細長有節，節間多半中空。莖單出或簇生，分枝或不分枝，通常高可達1米，直徑約2—15毫米，表面有稜和溝，稜6—30條，平滑或有一行密集的小刺，溝中有2組分離氣孔。小枝一條，或為2—3條一組，很少4—5條的。小枝又可能再分枝。葉輪生，很小，與葉梢連接，葉鞘常呈管狀或漏斗狀，緊貼，短或略伸長，先端呈齒牙狀，包被節間的基部。孢子葉穗長約2.5厘米，頂端短尖或有小突尖。孢子囊6—9個，在實葉下面邊緣排成一列。孢子圓球形，有絲狀，頂端成棒狀，十字形着生彈絲4條。（見附圖木賊）

藥用部分 全株

附註 滇本草謂木賊有“通婦人經閉”之效，為嘉祐本草等所未敘及。



木 賊

臭 靈 丹

本品为菊科(Compositae)植物 *Laggera pterodonta*(DC)Benth.

別名 飛廉 獅子草 臭葉子

原文 臭靈丹，味苦〔辛〕^①，〔性溫〕^②有毒。陰中之陽也，治風熱積毒，臟腑不和。通行十二經絡，發散瘡癰。五臟不和，積熱成毒〔生癰瘡。六腑不合，積熱成毒，〕^③生疽癰。熱毒注于血分，肌肉成疥癩。多吃牛馬肉，積熱成毒，〔重〕^④生疽癰，輕生血風癰瘡。〔吃則〕^⑤令人胸膈嘈雜，心犯作嘔吐。皮〔膚〕發痒^⑥，煩熱不寧。一切風〔熱〕^⑦毒瘡，服之良效。

採得，陰乾爲末。每服一錢，滾水點酒服。小兒痘後趕毒不收口，臭靈丹葉貼之愈。

（單方）截瘡。靈丹草尖七个，搗汁點酒服之。吃後行走急好^⑧。

——云南丛书本卷中第12頁

校 ①②原作味苦溫，据务、世、李、琴本改。

③④⑤原缺，据务、世、李本增。

⑥原作“皮肉”，据务、世、李本改。

⑦原作“風寒”，据务、世、李本改。

⑧各本均无“行走急好”四字，仅丛本有。

植物形态 荒地垃圾堆习見草本，通常高0.5—1米，分枝繁密，全体密被綠色头状腺毛，触之有极劣臭味。莖棒圓形，有5—8行連續而具不規則缺刻之翼，翼向基部漸枯黃消失。叶互生，橢圓形至长卵形，长10—25厘米，寬5—12厘米，具不規則之波状鋸齒，先端尖，基部寬楔形或截形，沿叶柄漸狹窄，复沿莖下延成翼，側脉12—15对，漸弯，斜升，上面平，下面突出。花时全体成一着叶重复。聚繖性圓錐形复花序，側枝或聚繖性圓錐花序，每分枝頂端冠以单个头状花序，最先成熟开放。头状花序幼时圓錐体形，多直立，花时截頂圓錐体形，俯垂，长达1厘米，寬約8毫米。总苞5—6圈，綫状披針形，先端漸尖，向外弯曲，最外最下之三四圈青綠色，暈以暗紫色，具污色腺毛，长3—4毫米，內部一圈邊緣干膜質，中間具綠色脉，近秃淨，长可至8毫米，頂端帶紫紅色，果时全部开展。花托盘状，平，具极多蜂窩状小陷穴。直徑5毫米。花管状；中間之15—20枚为完全花，全长8毫米。冠毛白色，一列。花冠长7毫米，白色，頂部帶玫紅色，具5小齿，基部綠白色。花药长2毫米，花絲几貼于花冠上。子房长1毫米，具短柔伏貼毛，花柱长6毫米，頂部微膨大，柱头二裂，周花数极多，为雌蕊花，全长7毫米。冠毛同前。花冠亦为白色，长5毫米。子房長約1毫米，疏生短柔伏貼毛，花柱与花冠等长，柱头2裂。花柱基部具花盘。果实长橢圓筒形，长1.5毫米，頂平截，棕褐色，外具短柔伏貼毛，冠毛一列，白色，絲状，微具細毛。（見附图臭靈丹）

藥用部分 叶

附註 图考謂：“云南所產臭靈丹，即飛廉。”按：飞廉列本經上品。“味苦平，主骨節熱，脛重酸疼。久服令人身輕，一名飛輕，生川澤。”名醫別錄，唐本草、蜀本草、圖經本草及綱目等均收录。宋沈括夢溪筆談謂：“今方家所用漏蘆，乃飛廉也。飛廉一名漏蘆。苗似苦苣，根如牛蒡，綿頭者是也。”图考云：“今醫家罕用飛廉者，不能的識，宋圖經已云然。然則後之醫者，並其名而不知，宜矣。余至滇，見土人習用治寒熱毒瘡，以臭靈丹為要藥，園圃中多有

之。就而審視，乃飛廉也。……滇本草雖別名臭靈丹，而主治與本草別錄同而加詳。……余既喜見諸醫所未見，凡以此草，本生河內，乃中原棄而不用，邊陲種人，藉手祛患。物固有屈於彼而伸於此者。……”（下略）

圖譜則謂：“圖考以臭靈丹即本草之飛廉，疑非是。本種在國內產于滇省及西康，非若陶隱居所說處處有之以及吳氏所云，此草本生河內，乃中原棄而不用也。”



臭 靈 丹

竹 箒 子

本品为藜科 (Chenopodiaceae) 植物地膚 Kochia scoporia Schrad.

別名 箭 王蕪 地膚子 地葵 地華 地麥 掃帚 鴨舌草 獨帚 益明 涎衣草 落帚 地帚 干心妓女 地膚 地面草 掃帚草 雞兒木 白地草 千頭子 竹箒草

原文 竹箒子^①，即地膚子。味苦，性寒^②。利膀胱小便積熱，洗皮膚之風，療婦人諸經客熱，清利胎熱，婦人濕熱帶下用之良^③。

——务本堂本卷三第20頁

竹箒草，形似掃箒，葉似竹而嫩。老時，其葉脫落，可以爲箒掃地。子即地膚子也。氣味苦寒，無毒。主治赤白痢疾，燒灰調服甚佳。一治眼目疼痛，煎湯洗之。一治大腸熱泄瀉，一退婦人五燒之熱。兼能和氣、瀉腸胃，解一切惡瘡之毒。

——范洪“圖說”卷十一第40頁

校 ①李本作“竹掃子”。

②务、世、李本作“性寒味苦”，依全书編例改。

③此藥只見于务、世、李本。

植物形态 一年生直立，分枝草本，自生原野路旁等处。莖高至

1.5米，有或无毛。叶互生，披针形或线形，顶端尖，通常有纤毛，全缘，较大的叶长至5厘米以上，基部渐窄成短柄，无叶柄。夏秋开花，花极小，绿色，单生于叶腋。萼5裂，裂片内弯，其变异甚大，翅短，半圆形，膜质，有脉，全缘。结果时将果包围。雄蕊通常5枚，突出。雌蕊1个。花柱通常2枚，基部短，合生。胞果扁球形，为花被所包围，果皮膜质。种子多少扁平，种皮膜质。（见附图竹箨子）

药用部分 种子



竹 箨 子

石 椒 草

本品为芸香科 (Rutaceae) 植物 *Boenninghausenia sessilicarpa* Levl.

别名 石交 石椒 石胡椒

原文 石椒草①，味苦辣②，性温。有小毒，走经络。止胸膈气疼〔冷寒攻心〕③，腹胀疼，胃气疼〔或膨胀可消〕④，散发瘡毒〔已成未成，服之神效〕⑤。

(附方) 治冷寒胃气疼痛。

石椒草不拘多少，〔连〕⑥根葉〔俱可〕⑦爲末，每服一錢五分，熱燒酒服。⑧

—云南丛书本卷上第22頁

校 ①从本作“右椒草”，范、务、世、翰本作“石椒”，茲据琴本題名。

②范本作味苦。

③据范、务、世本及图考增。

④⑤据范本增。

⑥据翰本增。

⑦据丛、琴本增。


⑧从本无附方，仅有“不拘多少，葉根俱可”两句，詞意不明。茲据务、世本补入。

植物形态 多年生直立草本，山野自生。根圆柱形，略扭曲，表

面黃白色，有縱紋及黑色圓形小突起，鬚根少數。莖圓柱形，紫紅色，無毛。葉為二回或三回三出羽狀復葉，有時有五出的。總葉柄長2—16毫米。小葉倒卵形至矩圓形，長3—6毫米，寬約2—5毫米，先端渾圓或微凹，基部闊楔形，紙質，全緣，有透明腺點，柄短。頂端羽狀三小葉大小相等，兩側羽狀三小葉，頂端1枚較大，側邊2枚較小。花排列为圓錐花序，花小，兩性，白黃色。萼4裂，近圓形，中部以下合生，先端略圓或鈍。花瓣4枚，卵圓形，長約2毫米，寬約1毫米，薄膜質，有透明腺點。雄蕊6—8枚，長短相間，花絲分離，着生于肉質環狀花盤的周圍。子房由4枚分離心皮所成。花柱短，單一，基部分離成四，各與分離心皮相連，柱頭頭狀。果由4個蒴果狀的果瓣所組成。（見附圖石椒草）

藥用部分 全株

附註 圖考“石交，生雲南山坡，高尺餘。褐莖如木，交互相糾。初附莖生葉，漸出嫩枝，三葉一簇，面綠背紫。大者如豆，小者如胡麻。參差疎密，自然成致。”下引滇本草與原文同。



石 椒 草

杏葉防風

本品為繖形科 (Umbelliferae) 植物 *Pimpinella candolleana* Wight. et Arn.

別名 馬蹄防風

原文 杏葉防風，味辛，性大溫。溫中散寒氣，治九種胃氣疼，胸腹中寒脹氣疼^①，〔寒疝偏墜〕^②。截寒熱往來痰瘧^③。

(單方) 治胃氣疼痛，古方單劑用，今增補加用。

杏葉防風五錢(瓦焙)^④ 草荳蔻二錢 小茴香二錢(炒) 共為細末，每服二錢，用燒酒熱服^⑤。

(又方) 治胸膈氣脹，面寒背寒硬梗^⑥，肚腹疼痛。古方單劑為末，每服一錢。今增加後劑效。

杏葉防風五錢^⑦(焙) 香白芷三錢^⑧ 葳靈仙二錢^⑨ 赤地榆三錢^⑩ 過山龍一錢^⑪ 茶匙草三錢^⑫ 引燒酒一鍾合水酒各半煎服，或泡藥酒亦可。

(又方) 治九種疝氣^⑬，古方單劑用，今加增用。杏葉防風二錢 橘核仁錢半^⑭(炒) 地草果^⑮一錢 小茴香一錢(鹽水炒)^⑯ 荔枝核三錢(燒，搗碎)^⑰ 水煨，引點水酒熱服^⑱。

(又方) 治偏身氣疼、疝氣〔偏墜〕^⑲，或膀胱

氣疼。

杏葉防風二錢 吳萸五分^⑩ 白頭翁一錢 小茴香一錢(鹽水炒)^⑪ 赤木通二錢 水煎，引點水酒服^⑫。

(又方) 治一切瘧疾。

杏葉防風採新鮮者搗汁一小鍾，點燒酒對太陽吃^⑬，要在辰時方效〔俟欲發未發之前〕^⑭，將渣葉、男子左手，女子右手，將藥於脈臑上包好，過時方解。

——云南叢書本卷上第10—11頁

校 ① 务、世、翰本缺“胸腹中寒脹氣疼”句。

② 据务、世、琴本增。

③ 务、世、翰、琴本无“截”字。

④ 务、世、翰本为“杏葉防風三錢”，从本无“瓦焙”两字。务、世、翰本增。又琴本此方无剂量。

⑤ 原作“用熱燒酒服”依务、世、翰本改。

⑥ 原作“面寒疼，胸膈氣脹，面寒硬硬。”依务、世、翰琴本改。

⑦ 务、世、本作“五分”。

⑧ 务、世、本作“一錢”。

⑨ 务、世、琴本作“三錢”。

⑩ 务、世本作“一錢”。

⑪ 翰本作“二錢”。

⑫ 务、世、翰本作“五錢”，琴本作“二錢”。

⑬ 原作“七種疝氣”，务、世、翰本作“九種疝氣”，琴本作“七種疝氣”。

⑭ 务、世、翰本作“五分”。

⑮从、琴本作“蛇果草”，翰本作“蛇草果”，务、世本作“地草果”。

⑯原缺“鹽水”二字，依务、世本增。

⑰“搗碎”二字，依务、世、翰本加。

⑱依务、世、翰本加“水煨”二字及“熬”字。

⑲据务、世、琴本增。

⑳从本作“五錢”，务、世、翰本作“五分”，琴本作“八分”。

㉑依务、世、翰本加“鹽水炒”三字。

㉒依务、世、翰本加“水煎”二字。

㉓原作“朝陽服”，依务、世、翰、琴本改。

㉔依务、世、翰本加此句。

植物形态 多年生草本，自生于山野。根細长錐形，长5—15厘米；生有枝根。夏天抽莖，莖棒圓，具多数白色細直槽，中空，高30—50厘米，幼时略具短柔毛。根生叶的叶柄較莖生叶柄为长，长3—7厘米，半圓形，上面有淺槽，具疏短柔毛，基部兩側扩展成无色鞘状构造而微抱莖。叶心形或卵状心形，长1.2—4.2厘米，寬1.5—3.5厘米。叶緣圓齿牙状，中脉不显，側脉多从莖基部幅散，背面沿脉生短柔毛，上面深綠色，下面色稍淺。莖生叶愈上愈小，叶柄亦較短而成鞘状。叶片3—5裂，具不甚規則齿牙，至上部而成3—5深裂；裂片狭长，具不規則之尖缺刻。6—11月开花，花序为复繖形花序，頂生或腋生，莖頂者最先开放，直徑3—5厘米。总花梗及分花梗具疏稀短柔毛。总苞片无或一二枚，細小。分花梗长1—1.5厘米。小苞綫形，2—3枚。花梗长3—4毫米，亦疏生短柔毛。花細小，白色，徑約2毫米。萼管与子房合生；萼肢缺少。花瓣5枚，近圓形，在周花中大小不等，在中花中較整齐，长约1毫米，寬与长同。雄蕊5枚；早落，与花瓣互生。子房下位，近乎側扁圓錐体形，花柱二枚，柱头不显。果实細小，棕褐色，分果柄极短。（見附图杏葉防

風)

藥用部分 根 叶

附註 圖譜：“杏葉防風一物，今滇南官藥肆、草藥攤販均收之。多由鄉婦於春冬之際，將未抽花莖之植物採掘成筐，背負入市求售。其名其物鄉人幾無不知者，滇南本草所載即此。然只著功用未載形狀，他書亦未見記載，又滇省以外，未見有應用者。”



杏葉防風

竹葉防風

本品為繖形科 (Umbelliferae) 植物竹葉防風 *Sesili Delavayi* Fr.

別名 雞足防風

原文 竹葉防風，味辛，性溫^①。以本體能瀉脾^②，以性味^③能治風。通行十二經絡，引領即到。卑賤之品，〔治肺風熱〕^④，療一切風寒溼痹，筋絡疼痛^⑤，瘡癰〔發背〕^⑥〔等症〕^⑦。能解附子毒〔產滇中最奇，治病神速〕^⑧。

又〔主治煩滿脅痛，頭面風寒，四肢攣痛，金瘡腫痛及男子一切癆病。久服補中益神，兼治左癱^⑨右瘓最良〕^⑩。

— 云南叢書本卷上第 9 頁

校 ① 范本“竹葉防風”有二條。卷三作“性溫”。卷八作“微甘平”。

② “瀉脾”，務、世、翰、琴本作“瀉肺”。

③ “性味”，務、世、翰、琴本作“氣”。

④⑥ 據范本增。

⑤ “筋絡疼痛”，范本作“筋骨疼痛”。

⑦ 據務、世、翰本增。

⑧⑩ 據范本增。

⑨ 原為“左癱”。

植物形态 多年生草本，自生向阳或干燥的石质草坡上，高22—60厘米，全体黄绿色，有时带红晕。主根圆锥形，肉质，色黄。莖直立，圆柱形，中空，基部具宿存纤维状叶基与叶柄。叶三回羽状复叶，向上渐成二回或一回，以至苞片状。基生叶，叶柄呈棒圆形，长4—9厘米，愈上愈短，以至无有，基部扩展成叶鞘，叶鞘愈上愈显，先端微膨大。小叶披针形，长5—8厘米，宽约0.5—0.8厘米，先端锐，基部渐削，叶脉平行，纵走。复繖形花序数个，顶生及近顶腋生，顶上一个最先开放，直径3—4厘米，果时增大至5厘米左右，由5—8个小伞序组成。总苞片通常1—2枚，有时缺少或多至5、6枚，针状狭三角形，长约2毫米。分花梗长1—1.5厘米。小苞片8—10枚，短小，针形，花梗短，长1—2毫米，果时增长。萼片不易辨。花瓣5枚，宽椭圆形，长1.5毫米，宽约0.7毫米，先端渐尖，内弯，密，白色。雄蕊5枚，不吐露，花丝长约0.6毫米，弯。花药椭圆形，长约0.6毫米，背着。子房倒圆锥形，高约0.6毫米，秃净，柱基腺盘厚，花柱短，柱头极不显。果实常只一心皮发育，卵形腹背向扁，高约3毫米，肋微突，绿色，沟暗绿色至黑色，二分果横切面近梯形，腹面平，宽约2毫米，全部具油管十根。（见附图竹葉防風）

药用部分 根

附註 图谱：“竹葉、蓋取其狹披針形，葉脈平行，有類竹葉之故。又因竹葉柴胡之類似而得名也。”又云：“惟產滇省昆明、姜驛、鄧川，皆在金沙江上流諸支流羣山中，約1,900公尺處，向陽或較乾燥之石質草坡，疏望，偶見，七至九月花，十月實熟。”



竹葉防風

繡球防風

本品为唇形科 (Labiatae) 植物 *Leucas ciliate* Benth.

原文 繡球防風，味苦辛。性微溫^①。入肝經，破肝家滯結鬱氣。舒肝氣流結，〔破肝血，通經閉，祛風熱^②明目、退〕^③翳膜遮睛，治小兒雀〔盲〕^④眼，白翳青盲，殺肝蟲。但肝氣實有鬱結者可用，若肝虛者忌之。

(奇方) 小兒痞疔攻眼，雀眼青盲(雀眼者，不有翳膜，只晚不見物)，白翳遮睛。^⑤

繡球防風一兩^⑥ 蛤粉大錢^⑦(煨) 共爲末，每服五分。白羊肝三錢，竹刀破開羊肝，將藥入肝內，紵蔴綁好，入瓦罐內煎吃，五服全愈。忌鹽。^⑧

——云南丛书本卷上第10頁

繡球防風，味苦淡、平、無毒。主治楊梅結毒，癰疽發背，無名腫毒。洗癬瘡、疥癩良。其子同地草菓爲末，用黑羊肝煎湯，治小兒疔疾眼眦最效。

——范洪“圖說”卷八第17頁

校 ①丛、琴本作“性微溫”。务、世、翰本作“性微寒”。

②③④依务、世、翰本增。

⑤务、世、翰、琴本无“雀眼青盲……遮睛”一段，統写

为“一切眼疾”。

⑥务、世、翰本作“一錢”。

⑦务、世、翰本作“三錢”。

⑧务、世、本作“竹刀破入藥在肝內，麻紫瓦罐內，水煎服”。琴本作“共爲末煑羊肝或鴨肝用，每服五分。”翰本作“竹刀切開入藥在內，布紮瓦罐口煎服”。

植物形态 一年生草本，野生荒坡丛草中，高30—140厘米，全体密盖污黄色倒向之微硬长毛。主根不甚发达，侧根多，鬚状。莖直立，近棒圆带方，上部多二歧分枝。叶对生，厚纸质，具短叶柄，披针形，长5—10厘米，寬1.5—2厘米，具疏锯齿，上面暗黄绿色，下面稍淡，两面均具短硬毛，叶脉5—6对，斜升。秋天开花，生于莖頂叶腋中，形如球，聚繖花序，直徑約3厘米，基部具极多的綫形总苞片，上生疏纤毛。花唇形，高約1.5厘米，萼筒管状钟形，白色微綠，外面沿脉疏生长柔毛，脉十根，綠色，終于頂端十綫形齿中，齿具疏长纤毛。花冠管状，二唇，上唇全緣，头盔状，外面密生絲光深黃褐色长鬚毛，下唇較长較大，平坦，三裂，中裂較大，先端近乎平截而微凹，外面疏生污黄色短伏毛。雄蕊4枚，初为上唇所包盖，以后吐露，上面2枚較短，花絲長約6毫米，下面2枚花絲長約8毫米，基部俱疏生短毛，花药背着，花时橙黄色，花后轉紅色，子房4裂，高約1.5毫米，花柱柱状，长10毫米，柱头2裂。果实为宿萼小坚果，4枚，卵状，高3毫米，寬1—1.5毫米，果皮光亮，黑褐色，具极細網紋。（見附图繡球防風）

药用部分 全株

附註 圖譜：“繡球防風一名，僅見滇南本草。……其名蓋取像於花序之形狀。……國內惟產滇（蒙自、昆明、廣通、姚安、賓川等處）、黔，海拔1,300—2,200公尺間。山谷附近荒坡叢草中偶見。七月至九月，花果隨之成熟。”



繡球防風

石蓮花

本品为卷柏科 (Selaginellaceae) 植物 *Selaginella tamaricina* (Beauv.) Spring var *pulvinata* (HK, & Grev.) Alston.

別名 卷柏 九死還魂草 回陽草 萬歲 長生不死草 豹足 求股交時 神仙一把抓 還魂草 長生草 不死草

原文 石蓮花，一名卷柏，一名回陽草。味苦①，性寒。通月經，〔破瘀血〕②，破癥瘕，消血塊，難產催生效。燒酒爲使③。

——云南丛书本卷中第27頁

石蓮花，一名不死草。生石岸上，似側柏葉形。氣味辛平。主治五臟邪氣、女子陰中寒熱痛，癥瘕、血閉、結子。久服輕身和顏色。生用破血，炙用止血。

——范洪“圖說”卷四第30頁

校 ①翰本作“味苦澀”。


②据务、世、翰本增。

③此句原在藥名下，据务、世本移于此。

植物形态 多年生常綠草本，自生于山地岩壁上。根为丛生的多数棕黑色鬚根。莖短。枝密集，又分歧为小枝，枝在平面展开，上面綠色，下面綠白色，枝上密生鱗片叶。下面的叶密集，向上，闊卵形，长约

1.5—2.5毫米。頂端削尖，硬性而厚，邊緣略具小齒。莖上端的葉與下面近相等，卵形，頂端削尖，伸直而成刺狀，中脈明顯，邊緣略有小鋸齒，近軟骨質。小枝頂端生四角形孢子囊穗，直徑約2毫米，長約1厘米。實葉卵形，頂端削尖，有中脈，邊緣灰白色，膜質，具小齒。孢子有大小二種：大孢子灰黃色，近平滑，略具少數突出小疣。小孢子淡紅色，大小不等。全體遇潮時開展，乾燥時向內方卷曲。（見附圖石蓮花）

藥用部分 全株



石蓮花

馬 尿 花

本品为水鳖科 (Hydrocharitaceae) 植物水鳖 *Hydrocharis asiatica* M:q.

别名 水鼈 水旋覆 白蘋 芡菜 油灼灼

原文 馬尿花^①，一名水旋覆。味苦、微鹹，性微寒。治婦人赤白帶下。生海中草地邊，仙人塘近華浦前。

(單方)〔治婦人紅崩白帶〕^②。水旋覆爲末，每服一錢，熟水牛肉爲引^③。

——云南丛书本卷中第22頁

按 ①务、世本作“馬屎花”。

②依务、世、琴本增。


③务、世本作“熟水牛肉同食甚效”。琴本作“水牛肉湯送下”。翰本作“煮水牛肉同吃甚妙”。

植物形态 水生飄浮草本，常生于沼澤間，有匍莖，具鬚狀根。叶厚，圓形或腎臟形，長約2.5—6厘米，寬約2.5—6.5厘米，全緣，上面深綠色，下面略帶紅紫色，且有浮飄組織，故能浮于水面。叶柄圓而粗壯，長約1—8厘米。花單性，生于叶腋。雄花2—3枚，聚生于1花梗上，具2叶狀佛焰苞。萼片3。花瓣3，白色。雄蕊9枚。花絲叉狀，花藥基着于花絲。雌花單生于佛焰苞內。花被和雄花同數。具成對的6枚不育雌蕊；子房下位，卵形，6室，柱頭6，綫形，頂端2裂。花后結圓卵形肉質果，內具種子多枚。(見附圖馬尿

花)

药用部分 全株

附註 图考：“馬尿花，生昆明海中。近華浦尤多（校者按：即昆明大觀樓一帶）。葉如芥而背凸起，厚脆無骨。數莖爲族或挺出水面，抽短莖，開三瓣白花，相疊微皺。一名水旋覆。”（下引滇本草，与原文同）。又云：“按野菜贊云：油灼灼、蘋類。圓大一缺，背点如水泡。一名芣菜。沸湯過去苦澀，須薑醋，宜作乾菜，根甚肥美，即此草也。”



馬 尿 花

樓 台 草

本品为唇形科 (Labiatae) 植物 *Leonurus macranthus Maxim.*

別名 玉容草 白花益母 鬻菜 白花茺蔚 蕻 對月草

原文 樓台草①，又名玉容草。味酸甘，性熱，無毒。此草生〔於滇省〕② 陞山中，形似艾葉，軟枝③獨苗，上有軟尖④。此草有變化之能，老年服之而如少壯。主治一切筋骨〔疼痛虛弱〕⑤、痿軟、脫陽、脫陰〔自汗〕⑥、盜汗、婦人血崩。〔又治〕跌打損傷，〔接骨〕如神⑦。取葉燒灰，治一切小兒黑〔痘〕⑧及〔痘頂不起者〕⑨，服之神效。梗治絞腸〔痧〕⑩、〔肚痛〕或陰症〔緊急〕⑪，研末酒服三錢，如神效。

——务本堂本卷一上第30頁

校 ①此葯仅見于务、世本及云南通志卷二十九。

②据通志增。

③通志作“嫩枝”，“上有軟尖”句依胡本增。

④此句下，务本尚有“上有蝙蝠，食而化松鼠。”通志作“惟蝙蝠多覓而食之，日久變而爲松鼠。”胡本作“蝙蝠多食，而化松鼠”。今在正文中刪去，而于此處錄之，以備參考。

⑤据通志增。

⑥原作“夜多盜汗”，据通志改。

⑦原作“接骨即好，跌打損傷如神”。据通志改。

⑧原作“豆”，据通志改。


⑨原作“頂陷”，据通志改。

⑩原作“沙”，据通志改。

⑪据通志增。

植物形态 一年生草本。莖直立，高40—100厘米，分枝，四方形，稜角圓，側面下凹成淺槽，具逆向压伏状細柔毛，尤以稜角上特多。叶厚，草質，生于莖中部的叶广卵形，通常三深裂。中間裂片較寬，每一裂片上部，又作羽状淺裂。基部楔形，先端銳尖，上面深綠色，下面灰綠色，兩面均有灰白色压伏状細柔毛，尤以下面脉上最多，脉于下面隆起。叶柄長1—3.5厘米，上部略具翼。着生莖上部的叶卵形至披針形，長約15—45毫米，寬3—18毫米，先端短尖，基部楔形，邊緣具1—4鋸齒，有时全緣。叶柄極短或近乎无柄。夏天开花，花多数，腋生成輪状。苞片綫形或呈刺状，有毛。花无梗。花萼鐘形，長約10毫米。萼齒5枚，先端刺尖，上面三齒相似，三角形，下面二齒較大，萼筒長約7毫米，具5脉，外面被白色細絨毛。花冠粉紅白色，具2唇，上唇匙形，先端微凹，內面光滑，有緣毛。下唇3淺裂，兩側的裂片呈卵形，中間的裂片倒心臟形，基部較狹，上部向外反曲。雄蕊4枚，着生于花筒內近裂口下方，向上平行弯展于花冠上唇內，上面2个較短，藥2室。子房4裂，花柱絲状，較雄蕊稍長。柱头2裂，先端尖。小坚果黑色，有三稜，長約3毫米，先端截形，基部楔形，表面光滑。（見附图樓台草）

药用部分 莖 叶



樓 台 草

篇 蓄

本品为蓼科(Polygonaceae)植物篇蓄 *Polygonum aviculare* L.
var *vegetum* Ledeb.

别名 竹篇蓄 扁辨 扁蔓 扁筑 扁竹 粉節草 道生草 王芻 百節草 猪牙草 鉄綿草 殘竹草 扁竹蓼 烏蓼

原文 〔篇蓄^①，性寒，味苦。利小便，治五淋白濁、熱淋瘀精，開關竅^②。〕^③

(單方) 婦人氣鬱^④，胃中濕熱成白帶。

篇蓄〔大薊〕^⑤煨、點酒服之良效。

(單方) 治男、婦、童癆，虛癆、子午發燒不退，或產後發燒不退。

篇蓄五錢、引點水酒、童便服效〔小便不通用篇蓄根^⑥水煎服〕^⑦。

— 云南丛书本卷下第2-3頁

校 ①原作“扁蓄”，茲据图考改。

②“開關竅”务本作“澀閉關竅”，茲据翰、琴两本改。

③此条丛本遺略，据务本补。

④原作“盛”，据务本改。

⑤丛本无“大薊”，据琴本补。

⑥原作“篇竹”。

⑦丛本无此节，由务本卷三第67頁补。

植物形态 一年生草本，全体光滑无毛，自生于荒野路旁。莖自基部分枝，长约达50厘米，平卧地上或向上斜升，罕为近直立，表面具纵沟纹，颇明显，基部圆柱形。幼枝具角稜，节间短或长，自下部至顶端均生有叶。单叶互生，几无柄或具短柄。叶椭圆形或披针形以至线形。长1—5厘米，宽3—10毫米，先端钝至尖锐，边缘近于全缘或略带波状起伏，基部楔形，上面蓝绿色，下面绿色，两面均无毛，叶脉在下面稍隆起。叶鞘披针形，长4—5毫米，下部褐色而抱莖，上部呈薄膜状，白色透明，先端多裂，具有数脉纹。花小，数个簇生叶腋，自莖基部至顶端均有，但不同时开放。花梗细短，几与花等长，顶端有关节。花被绿色，深5裂，裂片椭圆形，长约2毫米，宽约1毫米，开展或半开展，边缘白色，结果时呈复瓦状包被瘦果，同时其边缘变为淡红色。雄蕊通常8枚，着生花被分裂处内面。花丝短，先端尖，基部扩大而呈扁三角形。药卵形。子房卵形，具三稜。花柱3枚，分离，极短，柱头头状。瘦果三角状卵形，长约3毫米，黑色，表面具细纹及小点，仅先端露于宿存花被外。（见附图蒿蓄）

药用部分 全株

附註 图考收入隰草卷十一，零婁衣曰：“滇澳之竹，古訓以爲蒿蓄。此草喜鋪生陰濕地，美白如簀，誠善體物矣。救荒本草曰：扁竹，猶中州古語也。江以南皆饒，而識者益寡。滇本草獨著其功用。按名而求，果得之。滇之草木，名多始於楊慎，此語或有所承。”（下略）



篇 蓄

七 星 草

本品为水龙骨科 (Polypodiaceae) 植物 *Polypodium hastatum* Thunb.

別名 鵝掌金星草 金雞足

原文 七星草，味甘，性寒，無毒。此草形似雞脚，上有黃點，按〔星〕度^①而生。或依根貼土上或石上〔生〕^②。採服治沙淋、血淋、白濁、冷淋^③，又能包肚臍治陰症^④。敷〔無名大瘡，神效〕^⑤。

——务本堂本卷一上第27頁

校 ①原作“宿”，据通志改。

②据图考增。

③图考总标：“治五淋白濁”。通志作“總治五癩如神”。

④图考作“熨臍治陰寒”。

⑤原作“敷名瘡大毒如神”。茲据图考改。

植物形态 生于岩石之常綠草本。根莖細長而橫臥，密生赭褐色鱗片。叶生于根莖，长达30—40厘米，有长叶柄。叶片深三裂或不裂而呈长披針形，先端尖，下面往往帶淡紫色。子囊群着生叶背，黃褐色，排列为星点，不具子囊群盖，有时只有7枚子囊群，故名七星草。（見附图七星草）

药用部分 全株

附註 图考：“鵝掌金星草，生建昌山石間。橫根，一莖一葉。葉如鵝掌，有金星。滇本草謂之七星草。”（下略）



七星草

石 韋

本品为水龙骨科 (Polypodiaceae) 植物石韋 *Pyrrosia gralla* (Gies.) Ching.

別名 石韋 石皮 石蘭

原文 石韋^①，性寒，味苦。入小腸經。利小便^②，通五淋，止玉莖痛。根消胸膈橫氣作脹，退蒸熱。凡用，刮去毛，若毛去不淨，反令人咳嗽。

(附方) 治手顫作搖，服此即愈。

石韋根，煎湯當茶水頻服。^③

——务本堂本卷二第45—46頁

石韋，氣味苦平，毒。去葉上毛用。主治：勞熱邪氣，五癰閉不通，利小便水道，止煩下氣，通膀胱，治癩。

——范洪“圖說”卷八第17頁。

校 ①务、世、翰本作“石葦”，依丛、琴本改。

②原作“治利小便”，治字衍。

③此葯丛本缺味性疗效，改用务本。又琴、翰本与务本大同小异。

植物形态 小形附生多年生草本。根状莖匍匐，有網状中柱，被茶褐色鱗毛。叶通常为单叶，生根莖上，与根状莖之間有关节。叶柄

长，生棕色柔毛。叶长椭圆形或披针形，长短不一，约2.5—12厘米，革质，全缘。叶上面绿色，疏被有永存的星芒状鳞毛，背面嫩时被浓褐色绵毛，叶脉不明显，联接而有内藏细脉。孢子囊群通常着生于内藏小脉的末端，圆形，有时伸长而汇合，有星芒状的隔丝。孢子囊群呈粒状，无盖，赤褐色，布满叶背全部或上部，在侧脉之间排成数列。孢子囊由孢子囊群的边缘向中心依次成熟，孢子囊柄长，有3列细胞。（见附图石韦）

药用部分 叶 根

附註 綱目引名醫別錄謂：“石韋用之，去黃毛，毛射人肺，令人欬，不可療。”滇本草亦謂用石韋刮去毛，殆本于此。



石 韋

黃 龍 尾

本品为薔薇科 (Rosaceae) 植物 *Agrimonia zeylanica* Moon.

別名 龍芽草 施州龍芽草 金頂龍牙 瓜香草 石打穿 老鶴嘴 子母草 毛脚茵 石見穿 龍牙 黃龍牙 地胡蜂 鉄胡蜂 蛇疙瘩 黃花草 地椒 癩茨草 杰里花 綫麻子花 金水引 仙鶴草 脫力草 蛇倒退

原文 黃龍尾，〔出滇南嵩明州邵甸里爲最〕^①。
味苦〔澀〕^②，性〔微〕^③溫。調〔治婦人〕^④月經或前或後、紅崩白帶、面寒〔背寒〕^⑤、〔腹〕痛〔腰痛、發熱氣脹〕^⑥、赤白痢疾。

(附方)黃龍尾三錢 杭芍二錢 川芎一錢五分 香附一錢 紅花二錢^⑦ 行經紫黑，加蘇木、黃芩，腹痛加〔延〕^⑧胡索、小茴香。〔水煎〕^⑨點水酒服。

(又方) 治白帶。

黃龍尾三錢 川芎一錢 香附一錢 白芷二錢(酒炒) 陳木瓜五錢 點白酒汁服〔如白帶黃色、加椿皮〕^⑩。

(又方) 治婦人赤帶、帶土黃色〔有涎〕^⑪、令人頭〔目眩〕暈、體困、寒熱往來〔腰痛〕^⑫、四肢酸軟、小便淋症、陰中癢痛、尿急腹脹，〔陰內或如蟲蝕、或兼白濁〕^⑬。

黃龍尾 土茯苓 赤木通 蛇菓草 八仙草 甘草

煎水酒服。

(又方) 治同前症。少婦可用，老弱忌服。

黃龍尾三錢 馬鞭梢根一錢 黑〔鎖〕^⑭ 梅根一錢 點水酒服。

(又方) 治面寒疼〔痛〕^⑮。

黃龍尾〔不拘多少，焙乾〕^⑯ 爲末，點燒酒煎服。

——云南丛书本卷中第17—18頁

校 ①原缺，据务、世、翰本增。范本作“出嵩明州最良”。

②③原缺，据务、世、翰本增。

④据图考增。

⑤据范本增。

⑥据务、世、翰本增。

⑦务、世、翰本作“二分”。

⑧原作“女”，据务、世、翰本改。琴本无此味药。

⑨⑩⑪⑫⑬据务、世、翰本增。

⑭原作“所”，据务、世、翰本改。

⑮⑯据务、世、翰本增。

植物形态 多年生宿根草本，高30—100厘米。根茎块状，外面黑褐色，内皮红黄色，着生鬚根。芽白色，尖圆。夏初抽苗，后出莖，近于棒圆，全布以污黄色直立硬毛及短柔毛。叶奇数羽状复叶，向莖，基部叶渐枯黄，至仅余叶基，輪廓倒卵形，长6—9厘米，寬4—5厘米。上面黄綠色，下面色略淡。叶柄长达4厘米，愈上愈短，基部略扩大，上面平，具槽，下面生长硬毛，而沿生入于叶軸。小叶大小不等，互出而間生，具极短柄。叶片倒卵形或橢圓形，长22—35毫米，寬7—20毫米，頂端銳或鈍，基部楔形至寬楔形，具圓裂

状粗深锯齿，齿尖端具短小尖突。叶脉上面微凹，下面凸出，侧脉4—9对，两面均具平伏细柔毛，尤以下面沿叶脉多。托叶二枚，抱莖，斜卵圆形，长1.1—2.6厘米，寬約1厘米，具3—7锯齿状尖缺刻，上下面及边缘均疏生短柔毛。穗状串形花序頂生，花时长約8厘米，果时可伸长至14厘米。花梗具长硬毛，基部具苞片。苞片卵状矩圆形至倒卵形，长4—7毫米，寬2—9毫米，3—7深裂。花直徑約7毫米；萼筒倒圓錐形，长不及2毫米，具短柔毛，頂端5裂。裂片卵状三角形，长1毫米，外面具柔毛，边缘膜質，具緣毛，萼筒与裂片間生一圈帶紅褐色內鈎刺毛。花瓣5，黄色，橢圓状矩圆形，长3—4毫米，寬約1毫米。雄蕊6—10枚，花絲絲状，长約2毫米，花药黄色，底着，药室远离，长不及0.5毫米。雌蕊1枚，子房橢圓形，高約1毫米，花柱长約1.5—2毫米，宿存，柱头头状，瘦果扁橢圓形，具鈎刺。（見附图黃龍尾）

药用部分 全株

附註 图考既引滇南本草原文，并詳述施州、輝县、建昌、广信等地龙芽草形态，以作比較。图谱对滇产龙芽草考証甚詳。



黃 龍 尾

寄生草

本品为桑寄生科 (Loranthaceae) 植物 *Loranthus yadoriki* Sieb.

别名 桑上寄生 冰粉樹 蠶心寶

原文 寄生草，味苦甘，性微溫。

生槐樹者，主治大腸下血、腸風〔帶〕①血、痔漏。

生桑樹者，治筋骨疼痛，〔走〕②筋絡，風寒濕痺〔效〕③。

生花椒樹者，治脾胃寒冷、嘔吐惡心翻胃。〔又有用治〕④解梅瘡毒、婦人下元虛寒或崩漏。

生〔水、馬、〕⑤桑樹者，治小兒中蠱。用寄生草一寸二分，帶頭上，可〔避〕⑥蠱。

——云南丛书本卷中第2—3頁

校 ①原作“近”，据务、世、李本改。

②据务、世、李、琴本增。

③④⑤据务、世、李本增。

⑥原作“治”，据务、世、李本改。

植物形态 寄生小灌木，全株生有赤褐色細毛。枝褐色，圓筒狀。叶近于对生，革質，具有叶柄，卵形或橢圓形，先端鈍，基部圓形，全緣。花两性，淡綠色，每2、3朵着生于叶間或小枝之分枝处。萼

球形，先端截形。花冠筒形，先端4裂。果实黄色，广椭圆形，密布有细毛。（见附图桑寄生）

药用部分 枝叶

附註 通志：桑寄生草，引桂馥札朴：“順寧各村俱有，每於枝幹上無因而生，如草如藤，開黃白花，結子如蓮實。”又引古今圖書集成：“生桑上者爲佳，入藥爲良。”



桑 寄 生

靈 芝 草

本品为多孔菌科 (Polyporaceae) 植物灵芝 *Fomes japonicus* Fr.

别名 茵 三秀芝 石芝 草芝 肉芝 菌芝 菌子

赤芝别名芝 紫芝 木芝 丹芝

白芝别名玉芝 素芝

黑芝别名玄芝

黄芝别名金芝

青芝别名龍芝

原文 靈芝草^①，此草生山中，分五色，味甘，無毒。俗呼菌子。

赤芝：治胸中有積，補中，強智慧。服之輕身不老。

白芝：味辣，無毒。治一切肺痿癆咳，力能安魂延年。仙品也。

黑芝：味鹹，性平，無毒。補腎，通竅，利水，黑髮，治百病^②。

黃芝：味甘辛，性平，無毒。治一切百病如神。熬膏久服，輕身延年。

青芝：味鹹，無毒。治一切眼目不明^③。

——务本堂本卷一上第23—24頁

校 ①此药仅見务、世两本收录。



②原有“人服成仙”一句，今刪。

③原有“服之日視千里”一句，今刪。

植物形态 寄生于枯朽树木之根际，全体似木質而硬，質堅不腐朽。盖腎形，赤褐色、赤紫色或暗紫色，有漆状光澤，表面凹凸不平，并有以柄为中心之环状沟条。盖面呈淡褐色或白色粗糙，有多数細孔。柄常較盖的直徑长，暗紫色，有光澤，若塗漆。（見附图靈芝草，务本堂版五芝图）

药用部分 全株

附註 滇南本草記載有赤芝、白芝、黑芝、黄芝、青芝五種，但除赤芝外，均无人識，故未寻求到标本，因而学名、植物形态，及图均表赤芝。



靈 芝 草


芝赤




芝黑



芝白



芝青



芝黄



务本堂版五芝图

荷 葉 藕

本品为睡蓮科(Nymphaeaceae)植物蓮Nelumbo nucifera Gaertn.

別名：蓮 芙蕖 芙蓉 菡萏（地下莖名藕，果托名蓮蓬，果實名蓮子）

原文 荷葉，白蓮葉入氣，紅蓮葉入血。味辛平^①，性〔微溫〕^②〔入肝肺二經，入氣入血〕^③，升也，陽也。上清頭目之風熱，止眩暈，〔清上焦之虛火，可升可降〕^④，發暈清痰，泄氣止嘔^⑤，頭悶疼。

（附方）治頭眩暈悶疼。

白蓮花葉二錢 水煎。入冰糖五分 服之良效。^⑥

〔藕，味甘平。多服潤腸肺，生津液。痰中帶血，立效。節，治婦人血崩冷濁。葉，止血虛火暈。花，治婦人血逆昏迷。子，清心解熱之聖藥也，久服輕身延年。〕^⑦

——务本堂本卷三第4 5頁及卷一下第10頁

藕，氣味甘寒，無毒。開胃健脾。生食令人冷中，熟食補五臟。產婦忌生冷，惟藕不忌。

藕節，止咳血、唾血、血淋。

蓮葉，治產後衣不下、一切心慌頭暈。

蓮鬚，澀精，固腎氣。

蓮子，開胃健脾，養心安神；

——范洪“圖說”卷九第10頁

- 校 ①琴本作“味甘”。
- ②琴本作“性寒”。
- ③此两句依琴本增。
- ④此两句依琴本增。
- ⑤李本作“泄氣止嘔逆”。
- ⑥此节著录于务、世、琴本。
- ⑦此节著录于务、世本。

植物形态 粗壮水生草本，栽培于池沼中。地下莖极长而肥，有长节，节上有鳞片叶，自节上生叶及鬚根，节間有許多縱形管状空隙。叶大部高出水面，叶膜質，圓而盾形，全緣，直徑30—90厘米，上面綠色，下面粉綠色。叶背中央生长柄，叶柄与花梗高1—2米，柄上有小刺毛，中有多数小孔。夏天抽花梗开花，花单一頂生，色紅、淡紅或白，直徑10—20厘米，芳香。萼片4—5枚；花瓣橢圓形，凹入，有脉，有时重瓣。雄蕊多数。心皮多数，1室，埋藏于扩大花托中。果实嵌于圓錐形果托中，蓮蓬直徑5—10厘米。果实卵圓形，长1—1.5厘米，果皮革質，平滑，綠色，熟时成暗黑色。种子无胚乳，种皮海綿質。（見附图荷）

药用部分 叶 莖 果托 种子 花

附註 务本卷三“外附良方”有治橫擔（校者案：应作“橫痃”）神方：系因氣郁濕熱痰滯，突起于腠縫，類似痒子者是。用白蓮花葉，常煎以爲茶飲。多用爲妙。于每日用地丁一两五錢，金銀花一两，秦歸五錢，連翹一两，甘草三錢，水酒煎服，一劑可用二日，總以核散爲止。忌魚、羊、蛋、蒜發風動氣之物。

通志：“蓮有紅、白、錦邊三種。又二色蓮，紅白中分。”檀萃滇海虞衡志：“滇南蓮花特異。古云已開爲荷花，未開爲菌菖。本一花而因開與未開異名。至滇始知荷花開而結實，菌菖合終不開，不結實，蓋兩物也。”（下略）



荷

地 骨 皮

本品为茄科 (Solanaceae) 植物枸杞 *Lycium chinense* Mill.

别名 枸櫞 枸杞 地根 地節 地輔 苞杞 苦杞 卻老 羊乳 仙人杖 西王母杖 天精 杞棘 甜菜 地仙 枸杞根皮 鷄骨菜

原文 地骨皮、〔即〕①枸杞根皮。味苦，性寒。治肺熱勞燒，骨蒸〔發熱，諸經〕②客熱。

(單方) 枸杞尖作菜食。合雞蛋炒吃，治少年婦人白帶。③

——云南丛书本卷中第10頁

校 ①据务、世本增。

②依务、世、李本增。

③琴本无单方。

植物形态 蔓生灌木，自生或栽培，根黃棕色，外表粗糙，有凹突不平状，味微甘而苦。枝条长达4米，有短刺或无刺。小枝淡黄色，有稜角，无毛。叶互生或二三叶簇生，无毛。叶柄短，长达8毫米。叶卵状披針形，頂端尖或鈍头，基部楔形，长2—5厘米，寬7—13毫米，鮮綠色，側脉不显明，全緣。花通常3—5枚，丛生叶腋。花梗細，長約7毫米，花萼鐘形，高約3毫米。裂片3—5，寬卵形，頂端有細絨毛一簇，尖头，長約1毫米。花冠紫色，長約1厘米，管筒在基部稍上縮細，然后向上漸扩大，管長約4毫米。裂片5，車輪状平展，长方状卵形，圓头或凹头，长6毫米，边有纤毛。雄蕊着生管内，长7毫米，挺出花外。花絲基部稍上具一簇毛，花粉

囊丁字着生。子房长卵形，二室，光滑无毛，长约2毫米。花柱细长，直出花外，长5厘米。漿果鮮紅色，长达2.5厘米，卵圓或长圓。种子每室2或3，长方而扁，长约3毫米，密生环状細条紋。（見附图地骨皮）

藥用部分 根 皮 果实（名杞枸子） 嫩叶



地 骨 皮

五 加 皮

本品系五加科 (Araliaceae) 植物五加 *Acanthopanax trifoliatum* (L.) Merr.

別名 豺漆 豺節 金鹽 五花 白楸樹 文章草 追風使 木骨 刺通 刺楸 牙石 豚榆 白利顛 五佳 金玉香草 五加蕪 白蘗樹 五葉路刺 白刺尖 八角茶 五葉木

原文 五加皮，味苦辛，性溫。入肺〔腎〕^①，治腰膝酸疼、疝氣、筋〔骨〕拘攣^②、小兒脚軟。

——云南丛书本卷中第10——11頁

校 ①从本作“入肺骨”，依务、李、琴本改。

②从本作“筋拘攣”，依务、李、琴本增“骨”字。

植物形态 落叶乔木，高2米左右，莖及枝均有倒鈎棘針。叶互生或簇生，3—5指状复叶。叶柄长4—6.2厘米，疏生細小棘針状刺。叶由3—5小叶而成。小叶具短柄，倒卵形或卵圓形，长2.1—6.5厘米，寬1.2—3厘米，先端长尖或鈍，基部鈍或闊楔形。叶紙質，邊緣有鋸齒，上面鮮綠色，下面淡綠色，除沿叶脉和邊緣处疏被棕色剛毛外，余无毛。初夏开花，花形小，雌雄异株，相綴而成繖形花序。花梗較叶柄短。花瓣5枚，帶綠白色。雄花具雄蕊五枚，雌花子房2室，花柱2，近于离生。果实黑色，球形。（見附图五加）

药用部分 根皮

附註 务本卷二后附良方：“治男女手足麻木、腰膝痿軟、筋骨疼痛、四肢無力、痰火濕氣等症。

炒黑豆，童便浸露九次，蒸透用更佳。秦歸、陳皮、五加皮各等分，穀子燒酒泡服。”

廣群芳譜云：“五加皮，生南方者微白而柔韌，大類桑白皮；生北方者微黑而硬。入藥用南方者。苗可作茹，用皮浸酒，久服輕身，耐老明目，下氣補中，益精堅筋，強意志，黑鬚髮，令人有子。或只爲散，代茶餌之，亦驗。”



五 加

桑白皮 桑椹子

本品为桑科 (Moraceae) 植物桑 *Morus alba* Linn.

別名 桑根白皮 伏蛇皮 馬額皮 黃桑 荆桑 家桑 桑椹樹 槩 苳
椹 山黃桑樹

原文 桑白皮，味辛、微苦，性寒。金受火制，惟桑白皮可以瀉之①。止肺熱咳嗽。（註云）肺熱咳嗽，要在寅午戌時〔乃真〕②。止喘促吼咳③，開胃進食，〔蓋〕④氣降痰消則食進，非脾胃虛弱。

（附方）治肺家實火⑤，肺受火尅，暑熱咳嗽發熱氣喘之症。

桑白皮一錢 地骨皮一錢 知母八分⑥ 杏仁一錢（去皮尖）
浙冬一錢 陳皮一錢 馬兜鈴一錢⑦ 桔梗五分 黃芩八分 蘇子一錢
引用竹茹三分，水煎服。

桑椹，味甘酸。益腎臟而固精，久服黑髮明目。

（長壽丹方）同覆盆子共搗成餅，晒乾爲末〔各〕⑧四兩，共八兩，茯苓（乳汁炙），晒乾爲末八兩，山藥（乳汁浸），晒乾爲末四兩，共合一處，煉蜜爲丸，每丸三錢。清早服一丸，開水送下。此丸治男子精寒、婦人血虛，老年無子，其功不小。或欲火燒身，已成癆症，無不效應。

校 ①丛本作“即此桑皮以瀉之”。

②据丛、琴本增。

③原作“痰”，依翰本改。

④校琴本增。

⑤原作“火實”，依丛本改。

⑥丛本作“一錢”。

⑦丛、翰、琴本作“錢半”。

⑧原無“各”字。

此药丛本无味性疗效，故改用务本。

植物形态 落叶乔木，高至15米，多栽培。树皮灰色，纵裂成条，树冠卵圆形。新枝绿色，上密生细毛或具稀毛，并具少数皮孔。二年生枝绿灰色，无毛，皮孔颇明显。冬芽三角形或卵形，顶端尖，长约5毫米，外露复瓦状排列的鳞片4，灰黄色，有细毛。叶互生，卵形或宽卵形，基部圆或心臟形，顶端尖或长尖，长7—15厘米，宽5—12厘米，边缘具有锯齿或圆齿，有时作不规则的分裂。叶上面鲜绿色有光，下面色略淡，基出三脉，网脉较明显，被毛或光滑。叶柄长2—3厘米，有稀细毛。托叶披针形，早落。花单性，各成穗状花序，出自叶腋，与叶同时生出。雄花序下垂，长2—3.5毫米，密生细尖毛。花梗长至10毫米。雄花绿色，细小，直径约3毫米，无柄或有短柄。花被4片，卵形或宽椭圆形，钝头，外面具稀毛，边具纤毛，内面无毛。雄蕊4，与花被对生，初由花丝折屈于花被中，旋用弹性射出，长倍于花被，无毛。雌花序长12—20毫米，具毛，花梗长4—8毫米。雌花绿色，直径约2毫米，无柄。花被4片，倒卵形，顶端圆，中脉略突起，两翼紧抱子房作舟形，外面及边具毛。子房扁椭圆形，淡绿色，与花被等长，无花柱，柱头2裂，长约1毫米。各花密集成圆筒状的复果，长约2.5毫米，紫黑色，肉质而多汁，包瘦果子其中。（见附图桑）

药用部分 叶 根 皮 果 实 莖



桑

牡丹皮

本品为毛茛科 (Ranunculaceae) 植物牡丹 *Paeonia suffruticosa* Anders.

别名 牡丹花 富贵花 花王 鹿韭 鼠姑 百两金 白茱 木芍药
洛陽花 天香國色

原文 牡丹皮^①，味酸辛，性寒。破血，行血，消癥瘕，破血塊，除血分之熱，墜胎〔孕婦忌服〕^②。即芍药尖是也^③。

——云南丛书本卷上第25頁

校 ①从本原作“丹皮”，依务、世、李本改。

②务、李本无“孕婦忌服”一句，依务、世本增。

③务、世、李本无“即芍药尖是也”一句。

植物形态 落叶小灌木，多栽培于庭园間。根外部暗褐色，有縱皺紋或細微之橫紋及橫形之皮孔，內面呈淡紅色。莖一般高60—100厘米。有时可高至2米。枝多而粗壯，莖干燥后变黑白色。叶互生。重出羽状复叶。叶柄长10—25厘米。小叶闊卵形以至卵状长橢圓形，有柄或无柄，三裂，罕为全緣。叶背带白色，平滑无毛，亦或有少許短柔毛。花单生。徑約10—30厘米。春天生叶后开花，极美丽，花瓣有单瓣、复瓣之分。呈紅色、白色等。雄蕊多数，心皮上密生有短柔毛。其周圍为花盘所包复如囊状。果为有毛的蓇葖果，中有黑色如豆大之种子。（見附图牡丹）

药用部分 根皮



牡 丹

金 鵲 花

本品为蝶形花科 (Papilionaceae) 植物 *Caragana sinica* (Buchoz)

Rehd.

别名 大蛇葉 錦雞兒 鐵掃帚 壩齒花 鸚鵡子 金雀花 江南金鳳

原文 金鵲花〔一名大蛇葉〕^①，味甜，性溫^②，主補氣補血、勞傷氣血〔寒熱癆熱〕^③，畏涼發熱、咳嗽、婦人白帶日久，氣虛下陷者良效。頭暈耳鳴、腰膝酸疼，一切虛勞傷損，服之效。此性不燥不寒，用之良。或煨筍雞、猪肉食亦可。

——云南丛书本卷中第1頁

校 ①原缺，依务、世、李本增。


②务、世、李本作“性微溫”。

③据务、世本增。

植物形态 落叶小灌木，多栽培，高达1米余。莖秃淨圓柱形，树皮褐色，有多数明显的廣橢圓形淡褐色皮孔。小枝略帶方形，有刺和稜4条，刺2分或3分，长3—10毫米。叶为偶数羽状复叶，丛生。托叶不与叶柄基部相联合，而呈刺状。叶柄长2—8毫米。小叶通常两对，倒卵形或卵状矩圆形，紙質。頂端二叶片較大，长1.3—2厘米，寬8—10毫米；側面者較小，长4—11毫米，寬3—7毫米。叶全緣，頂端微凹，具小短尖头，基部多少偏斜或鈍。上面翠綠色，下面色略淡，中脉突起。春月开黄色蝶形花，单生叶腋，花梗长约1厘米。花萼筒形，傾斜，长1—1.2厘米，淡綠色，頂端五裂，裂片三

角形，邊緣有白色絨毛。花瓣五枚，复瓦状排列，旗瓣狭倒卵形，向上曲，兩側翼瓣多少彼此平行，兩枚龙骨瓣較翼瓣短，其下邊緣合生。雄蕊10枚，二束 9枚連合包被子房，長約2.2厘米，1枚分離，略短。花絲綠白色，花藥深黃色，橢圓形，長0.5毫米。雌蕊1枚，細圓柱形，長約1.8厘米，子房上位，一室。花柱單一而向上彎。莢果圓柱形，長約2.5厘米，具宿萼和花柱。（見附圖金鵲花）

藥用部分 花



金 鵲 花

玉 蘭 花

本品为木蘭科 (Magnoliaceae) 植物木蘭 *Magnolia liliflora* Desrousse.

别名 辛夷 辛雉 侯桃 房木 木筆 迎春 紫玉蘭 木蘭 木蓮 木蓮花

原文 玉蘭花〔一名辛夷〕①味辛、微苦，性溫。治腦漏、鼻淵、祛風②，新瓦焙爲末。治面寒疼、胃氣疼，引點燒熱酒服③。

——云南丛书本卷中第5頁

按 ①据务、世、琴本增。

②“祛”原作“去”，依务、世本改。

③此句务、世本作“熱酒服”，琴本作“點熱酒服”。

植物形态 落叶灌木或小乔木，高达5米，树皮灰色或灰褐色。当年生幼枝，淡綠色。一年以上幼枝紫棕色或綠棕色，光滑无毛，有圓形皮孔。叶芽狭圓柱形，混合芽长方卵形或圓柱卵形。芽鳞淡綠色或淡棕色，外側被白色长毛。叶互生，半革質，倒卵形、长方卵形或橢圓卵形，长8—15厘米，最闊部分寬6—8厘米，先端尖尾状，基部漸狭，全綠，常具疏短剛毛。叶上面深綠色，初被极短疏毛，随后漸落，中脉爲8—10对，側脉均下凹。叶下面淡綠色，被极少短毛或无毛，中脉及側脉突起，小脉網状明显。叶柄粗短，长约1厘米。托叶大，紙質，淡綠色，外被柔毛，早落。春初先叶开花，单独頂生，淡紫色，有微香，漏斗鍾形，长7—10厘米。花梗粗短，淡綠色，幼时被

毛，多寡不一。萼片3枚，綠色或紫白色，早落，三角披針形，長約為花瓣 $\frac{1}{3}$ 。花瓣矩圓狀倒卵形，愈內之瓣愈狹小，每瓣外側淡紫紅色，內部白色，惟基部成紫紅色。雄蕊多數，花藥紅紫色，長約7毫米。花絲長2—3毫米，色較花藥色略深。雌蕊長方倒卵形，長約1厘米，淡紫色，心皮甚多。子房綫狀橢圓形，長約2毫米，禿淨。花柱綫形，柱頭小。果實圓柱形，淡褐色。（見附圖玉蘭花）

藥用部分 花蕾



玉 蘭 花

金 銀 花

本品为忍冬科 (Caprifoliaceae) 植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.

別名 忍冬 鸛鷺花 五里香 忍冬藤 鸛鷺藤 左纏藤 金釵股 老翁鬚 鸛鷺草 金銀藤 鸛鷺藤 通靈草 密桶藤

原文 金銀花，味苦，性寒^①。清熱，解諸瘡、癰疽發背、無名腫毒、丹流瘰癧。梘，能寬中下氣^②，消疾，祛風熱，清咽喉熱痛。

——务本堂本卷三第44頁

校 ①原作“性寒味苦”，依全书編例改。


②李本作“梗寬膨”。

植物形态 半常綠纏繞灌木，多栽培。下部木質。小枝紫色，有短柔毛。叶对生，叶柄長約1厘米，上被淡黃色毛。叶卵形至長橢圓狀卵形，長4.3—9.3厘米，寬3.2—4.7厘米。上面油綠色，有光澤；下面綠色，全緣或略呈波狀。先端尖或漸尖，基部圓形或近于心臟形。幼時兩面有短柔毛，後則上面平滑無毛。花集生叶腋或頂生的花序柄上，組成聚繖花序狀，有香味。每花梗生二花，花之總梗較葉片略長或等長，亦生有短柔毛。苞片葉狀，長1.9—3.3厘米，寬1—1.8厘米。小苞片極小，卵圓形，有長柔毛。萼筒管狀，綠色，長約2毫米，頂端5裂。裂片三角形，紅紫色，邊緣有長柔毛。花冠管長1.5—1.9厘米，唇形分裂，不整齊。裂瓣與花冠管等長，稍被柔毛，白色而帶有紫斑，後變為黃色。雄蕊5枚，長約1.8厘米，着生于花冠

筒的頂部，且与裂片互生。雌蕊1枚，子房下位，花柱长，柱头头状。漿果圓形，黑色。（見附图金銀花）

藥用部分 花莖

附註 务本卷二：“小兒痘疹，自始至終，或紫或黑，或起頂或不起頂，一切用酒炒焦金銀花煎與服，神效。忍冬丸能治一切無名腫毒、諸般惡瘡。用金銀花一斤晒乾，同大甘草二兩，共杵爲末，以酒打麵糊調勻，丸如菉豆大，每服二十丸，熱酒送下，極能解毒，神效。”



金 銀 花

芙蓉花

本品为錦葵科(Malvaceae)植物木芙蓉Hibiscus mutabilis L'nn.

別名 木芙蓉 芙蓉 山芙蓉 華木 木蓮 柝木 地芙蓉 文官花 四面花 轉觀花 拒霜 清涼散 鐵箍散

原文 芙蓉花，味苦甜，性寒①。入肺，止咳嗽，
〔解〕②諸瘡毒。

(單劑)煎湯止咳嗽。其葉可箍瘡出頭。

——务本堂本卷二第43頁

校 ①原作“性寒，味苦甜”，依全书編例改。

②原作“改”，依琴本改。翰本作“攻”。

芙蓉花，氣味辛平，性滑，涎粘，無毒。採花葉根晒乾爲末，敷瘡神效。主治：清肺涼血，散熱消腫，其應如響。

——范洪“圖說”卷十第30頁

植物形态 直立、分枝大灌木，山野自生或栽培于庭園間。高約2—4米，多少密被星狀灰色短柔毛。葉大，闊卵形或亞圓卵形，寬5—10厘米，3—5深裂。裂片三角形，先端短尖或漸尖，基部心形，邊緣有鈍鋸齒。上面有毛，下面密被短柔毛或为黃褐色短絨毛。葉柄長圓筒狀，長約10厘米，有短柔毛。晚秋開花，腋生或簇生于枝頂，形大，直徑7—10厘米，開放時白色或粉紅色，至下午變為深紅色。花梗粗壯，長8—14厘米。苞片10枚，綫形，長1.5—2.5厘米，

分离，被毛。萼短，长3—4厘米，密被星状柔毛，裂片阔卵形。花瓣5枚，单瓣或重瓣，白色或红色。花冠外面被毛。雄蕊多数。雌蕊1枚，柱头5裂。果实为蒴果，球形，5瓣裂。种子小，肾脏形，5—6枚，上有细毛，易于飞散。（见附图芙蓉花）

药用部分 花 叶 根



芙蓉花

旋覆花

本品为菊科 (Compositae) 植物 *Inula serrata* Bur.

别名 金沸草 金錢花 滴滴金 夏菊 戴椹 萑 盜庚

原文 旋覆花，味苦鹹，性微溫^①，有小毒。祛頭目諸風寒邪，止太陽、陽明頭疼，行陽明乳汁不通，乳岩乳癰。紅腫疼痛。暴赤火眼，目疾疼痛，祛風明目，隱澀羞明，怕日傷風。寒熱咳嗽，老痰如膠。走經絡，止面寒腹疼。利小便單腹脹。治風〔火〕^②牙根腫痛。

(附方) ^③治頭風疼。

旋覆花一錢 白菊一錢 川芎一錢 細辛一錢 黃芩一錢 羌活一錢 引用生薑水煎服。

(又方) 治乳岩、乳癰，吹乳腫疼。

旋覆花二錢 蒲公英一錢 甘草節八分 白芷一錢 青皮一錢 水酒爲引，水煎服。

(又方) 治暴赤火眼。

旋覆花〔一錢〕 枳壳〔一錢〕 白菊〔三錢〕 黃連〔一錢〕 白蒺藜〔三錢〕 水煎服之^④。

(又方) 治傷風熱咳嗽。

旋覆花 杏仁 陳皮 知母 前胡 荆芥穗 引用心草，水煎服。

(又方) 治面寒疼。

旋覆根 水牛肉 水酒爲引，煎服。

(又方) 治單腹脹。

旋覆 鯉魚 將魚腸去淨，藥入魚〔肚〕^⑤內，煎服。小便利，腫脹即消。

(又方) 治風火牙疼。

二三月^⑥採旋覆花爲末，搽牙根〔上，良久，去其〕^⑦痰涎，疼立止。

——务本堂本卷三第50頁

校 ①务、世本原文为“性微温，味苦鹹”，依全书編例改。

②务、世本作“大”，依李本改。

③丛本仅有附方，无味性疗效，且列于藏灵仙之后，未标目，故采用务本。

④此方务、世本无剂量，依丛本增。

⑤“肚”字依丛本增。

⑥丛本作“一、二月”。

⑦原作“去痰涎”，依丛本增补。

植物形态 多年生宿根草本，生于原野水湿之地，高51—100厘米。莖綠色而染以紫斑，被毛。叶卵状披針形或长椭圆形，长3.5—7厘米，寬1.8—3厘米。叶上面綠色，中肋平，有細腺点；下面淡綠色，中肋隆起，被柔毛及腺点。叶緣具不整齐疏锯齿，先端漸尖或鈍，基部下延，略抱莖。夏天，莖上分枝开花，头状花序单生，直徑約3.8厘米。总苞盘状，苞片線状披針形，多列，长短不等，复瓦状排列，外面疏被柔毛。花鮮黃色，异型。外圍的花为雌性，舌状而放射，长约1.6厘米。盘花管状，頂端5裂，裂片卵状三角形。雄蕊五枚，合药，子房下位，矩圆形；花柱絲状，柱头2裂，略外弯。花略有清香，味淡泊而微苦。果为瘦果，冠毛丰富。（見附图旋覆花）

药用部分 已开之花



旋覆花

梔子花

本品为茜草科 (Rubiaceae) 植物梔子 *Gardenia Jasminoides* Ellis.

別名 卮子 木丹 越桃 楮桃 鮮支 林蘭 野桂花 黃葉下 山黃枝 白蟾花 水橫枝 薔葡 雀舌花 山梔子 水梔子

原文 [梔] ① 子花，味苦，性寒②。瀉肺家實痰實火，〔止〕③肺熱咳嗽，〔消痰〕④。金受火制，以此瀉之。

〔附方〕⑤梔子花三朵，蜂蜜少許〔同〕⑥煎服，〔治傷風〕⑦，止咳嗽。

〔又方〕治鼻〔衄〕⑧血不止。

梔子花〔數片〕⑨，焙〔乾爲〕⑩細末，吹入鼻孔卽止，奇效如神。

——云南丛书本卷中第24頁

校 ①原作“枝”，依务、世、翰、琴本改。

②务、世、琴本作“性寒味苦”。

③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩依务、翰本增。

植物形态 常綠灌木或小乔木，高可达2米，栽培或野生，只幼枝上有短柔毛。叶对生，或三叶輪生，革質，长橢圓形，矩圓狀披針形或卵狀披針形，长4—14厘米，寬1.5—4.5厘米，先端短尖，基部楔形，全緣。叶上面深綠色而有光澤，下面淡綠色。主脉較粗，側脉5

—12对，呈羽状排列，延伸近叶的边缘而向前弯转，叶脉均在下面突起。叶柄短。托叶明显。花单生叶腋，具有圆柱形绿色光滑短梗。花萼绿色，宿存，圆筒形，长约4.5厘米，基部渐窄，四周有5—6条纵稜突起，先端分裂为6片，每裂片线形至广线形，长1—2厘米。花冠在未开花时卷曲，花冠管长约3厘米，裂片通常6枚（有时可多至十多枚），白色，肉质，极富香气，广倒卵形，长2.5—3.5厘米，宽1—3厘米。雄蕊通常6枚，花丝无，药腺形，长约1.1厘米，着生于花冠内面喉部。子房下位，一室。花柱细柱形，坚直伸出花冠管，向上渐粗。柱头棍棒状，表面有纵稜而下延。果实倒卵形至长椭圆形，长1.5—4.5厘米，宽1.5—2厘米，肉质，黄色，外包以宿存的花萼筒及裂片。种子扁平，球形，径约3毫米，外被有黄色粘质物。（见附图 梔子花）

药用部分 果实 叶 花 种子（以果实为主）。



梔 子 花

羊 耳 朵

本品为馬錢科 (Loganiaceae) 植物蜜蒙 *Buddleia officinalis* Maxim.

別名 蜜蒙花 水錦花 寒不凋 羊春条 綿糊条子 羊耳朵朵尖

原文 羊耳〔朵〕^①，味酸苦，性微溫。花即廣中蜜蒙花。入肝經，〔祛〕^②肝風，明目退翳膜，目澀、羞明。取葉去尖蜜炙^③，治肝經咳嗽，久咳用之良。

葉可貼癰瘡潰溢，頑瘡久不收口，貼之生肌長肉。

——云南丛书本卷上第17頁

羊耳朵葉，性微溫，味酸苦。花入官〔藥〕^④，名蜜蒙花。入足厥陰。祛風明目退翳。一切眼科將軍，最良，別經序之。此本草序其枝葉之功。

採葉研末，治一切瘡癰疔毒，潰爛生管，不能生肌，滲此神愈。久年陰瘡無膿血者，搽此神效。

採根葉花共晒乾研末，入血竭、冰片爲刀傷藥，甚佳。

採皮研細末入磁瓦器中，隨帶身邊，遇小兒生肝蟲目翳，口蝕黑暈——世俗以爲中蠱——用此一

捻吹入鼻中，可救。此草名爲蟲見死草，以此草能化肝中之蟲爲水也。

— 范洪“圖說”卷第4第1頁

校 ①从本及圖譜作“羊耳多”，依務、翰本改。

②原作“去”，依務、翰、琴本改。

③原作“尖葉以蜜炒”，依翰本改。

④原无“藥”字。

植物形态 常綠灌木，自生山野，高0.5—1.5米，老樹可高达4.5米，胸徑達30厘米而成樹狀。老干扭曲，多瘤節，樹皮淡黃褐色，縱裂成長薄片脫落。幼枝密被污黃色短捲絨毛。葉對生，或三枚輪生。托葉位於相對葉柄間，綫痕形或耳狀半圓形。葉柄短。葉橢圓狀披針形，矩圓形，綫狀披針形或卵圓形，長6—15厘米，寬3—5厘米，先端尖至漸尖，基部狹楔形或漸尖。幼葉全體被黃綠色柔軟絨毛；老葉上面漸趨禿淨，顯露無數細小乳突，下面被灰白色柔軟絨毛。葉緣疏具淺波狀鋸齒，或全緣。花由多數小聚繖花叢，聚成圓錐花序。花序通常長6—15厘米，寬約4—5厘米。次生花梗兩兩對生。苞片綫形，漸下漸作葉狀。花細小，有甜香，几无柄。萼鐘形，長3毫米，綠色，薄，具灰白色星，芒毛。12或15脈，頂端4—5齒裂。花冠管狀，有4—5裂片，長10毫米。外部淺堇色，具灰白星，芒毛。內部金黃色，具白色不分枝毛茸。花冠裂片平展，邊緣多凸凹不平，在蕾中作復瓦狀排列，白色至淺紫色。雄蕊4—5枚，着生花冠管上，花絲全與花冠管融合。花藥黃色，橢圓形，長約1毫米。雌蕊1枚，子房上位，卵狀近球形，二室。花柱圓柱狀，頂部膨大，着生柱頭，柱頭具一與子房隔壁垂直之淺縱溝。蒴果自隔壁裂開，卵形。種子木屑狀。（見附圖羊耳朵）

藥用部分 花 葉 皮 根

附註 圖譜：“本書云：花即廣中蜜蒙”，按此說是也。又對名稱之考証，形态、分布等記載甚詳。



羊 耳 朵

紫 薇 花

本品为千屈菜科(Lythraceae)植物紫薇*Lagerstroemia indica* L.

別名 百日紅 滿堂紅 怕癢花 猴刺脫 癢癢花 癢癢樹 海棠樹
佛相花 搔癢樹 猴郎達樹

原文 紫薇花，味酸，性寒。治產後〔血崩不止〕^①，不通、不定、血隔癥瘕，崩中，帶下、淋瀝，洗疥癩癬瘡。

——云南丛书本卷中第11頁

校 ①原作“血奔”，据务、李、琴本改。

植物形态 落叶灌木或小乔木，高达3—5米，多栽培庭园間。树干屈曲，具平滑褐色树皮。枝柔弱，四稜形，有4翅，被白粉。叶互生，具短柄，革質，长1.8—7厘米，寬1.4—3.6厘米。叶先端短尖或鈍，有时凹缺，全緣；基部闊楔形或鈍，平滑无毛或下面沿脉处有毛。夏秋間枝梢开花，頂生圓錐花序，长14—26厘米，被白粉。花淡紅色、白色或紫色，寬2.5—4.5厘米。萼綠色或紫褐色，先端6裂，裂片卵状三角形，长5—6毫米，寬3—4毫米。花瓣皺縮，6枚，与裂片互生，有长柄。雄蕊36—42枚，着生于萼管的近基部，上部卷曲。花絲絲状，花药闊橢圓形，黃色，背着。雌蕊1枚，子房上位，无柄，圓錐体形，長約3毫米。花柱圓柱形，長約3.5厘米。柱头头状。果实为广橢圓形，蒴果，長約1厘米。（見附图紫薇花）

药用部分 花



紫 薇 花

木 槿 花

本品为錦葵科 (Malvaceae) 植物木槿 *Hibiscus syriacus* Linn.

別名 椴木槿 舜華 王蒸 朱槿 赤槿 木槿 朝開暮落花 藩籬草
花奴王蒸 裏梅花 瘡子花 木錦 欄樹 籬障花 喇叭花 椴木槿

原文 木槿花，〔味微苦〕^①，性寒。治婦人白帶良。

枝根治瘡癰疼痛。

(單方) 〔治婦人白濁帶下、男子遺精，最良。〕^②

木槿花〔二錢〕^③爲末，入人乳半鍾，將花末拌乳〔內置〕^④，飯上蒸熟吃之效。

〔採葉治楊梅瘡，遠年近日，服之神效，七日見功。〕^⑤

——云南丛书本卷中第2頁

校 ①原作“味苦平”，据琴本改。范本作“苦辛平”。

②原作“治婦人白帶”，依范本增改。

③从本缺剂量，依务、世、李、琴本增。

④从本作“干”，依务、世本改。

⑤此段依范本增。

植物形态 直立落叶灌木，多栽培。高达3—4米，幼枝有星状毛，长大时平滑无毛。叶互生，叶柄圆柱形，长1—2厘米，上面有

长絨毛，下面疏具星状毛。叶三角状卵形或菱形，长约3—7厘米，寬約2—5厘米，先端漸尖，基部闊三角形，在下部者3裂，边缘有不規則的鈍齿或缺刻。叶上面綠色，沿主脉疏具短剛毛；下面沿叶脉具短剛毛。夏天开花，具朝开午萎之特性。花大，腋生，具短梗，直径5—8厘米。小苞綫形，分离，6—7枚，約与萼等长。萼为不整正卵状披針形，长约1.5厘米左右，密被星状小柔毛。花瓣5枚，基部与雄蕊柱合生，常常重瓣，有紅、白、紫等色。雄蕊甚多。子房上位，花柱5枚，下部合生。蒴果矩圓状卵形，长约2.5厘米，有短喙，略被粗毛。种子亦有毛。（見附图木槿花）

药用部分 叶 花 根 皮



木 槿 花

雞 冠 花

本品为莧科 (Amarantaceae) 植物 *Celosia cristata* Linn.

別名 雞冠 雞冠頭 雞頭 矮生的名壽星雞冠 雜色的叫做鴛鴦雞冠

原文 雞冠花，味苦〔微辛〕^①，性寒。花有赤、白。止腸風血熱，婦人紅崩帶下。赤痢下血，用紅花效；白痢下血，用白花效。

——云南丛书本卷中第14頁

校 ①原缺，依务、世、李本补。

植物形态 一年生草本，培植于庭園間，高可至一米，全体无毛。莖直立，粗壮有稜，綠色或帶紅色。单叶互生，长椭圆形至卵状披針形，頂端漸尖，全緣，基部漸狹，形成叶柄。叶上面深綠，下面淡綠。叶脉羽状，主脉于下面突起。叶长 5—10 厘米，寬 2—5 厘米。叶柄长约 2 厘米，上面微凹，基部較肥厚而膨大。穗状花序生于莖頂或分枝末端，有成雞冠状、卷冠状、羽毛状、圓錐状的，顏色有紫、紅、淡紅、黃或杂色。花密生，两性，每花下生有三苞片。苞片披針形，长约花被的一半，膜質，先端尖，具一中肋，并在苞片背面微突起。花被 5，呈复瓦状排列，长方状披針形，长约 5 毫米，寬約 1 毫米許，干膜質，透明，有光澤。雄蕊 5 枚，花絲基部联合成杯状，上部分离，綫形，頂端着生花藥。雌蕊 1 枚，位于中央。子房卵圓形，花柱絲状，柱头二淺裂。果实为胞果。种子細小，扁圓形或略帶腎形，表面黑色，有光澤。（見附图雞冠花）

藥用部分 花 种子

附註 图考謂：“俚醫多用雞冠花治紅白痢、崩帶、血症。其性極峻，虛弱者慎之。”通志云：“雞冠有高足、矮足、百鳥朝王數種。”



雞冠花

青 箱 子

本品为苋科 (Amaranthaceae) 植物青箱 *Celosia argentea* Linn.

别名 草蒿 萋蒿 野雞冠 崑崙草 雞冠苋 草决明 雞冠花子

原文 青箱子即雞冠子。味甘、微苦，性微寒。入肝^①〔經〕^②，明目，淚澀難開、白翳遮睛、花凌青翳，用之良效。

——云南丛书本卷中第14頁

校 ①李本作“入腎經”，丛、务本作“入肝經”，以“肝”字为正。

②原缺“經”字，依务、世、李本补。

植物形态 一年生草本，高30—90厘米，全体无毛。莖直立，綠色，有条紋。叶互生，披針形或橢圓狀披針形或卵形，下部漸狹成叶柄，頂端尖或長尖，長5—10厘米，寬1.5—4.5厘米，全緣。叶上面深綠，脉下陷；下面淡綠，脉微凸。叶柄長1.5—2厘米。穗狀花序單生枝端，花序長10厘米，下无苞片。花細而密，兩性，紫紅色或白色，每花下生三膜質有光披針形苞片，頂端尖，長約4毫米，寬約1毫米，具一中筋。花被5，長方狀披針形，頂端尖，長8—9毫米，寬2毫米，膜質有光，亦具中肋。雄蕊5枚，長6毫米。花絲下部合生；花藥紫紅色，丁字狀着生。雌蕊1枚，長6毫米，子房下有短柄，花柱紅色，柱頭二裂。果为蒴果，花柱宿存其上。种子細小，扁圓形，黑色有光澤。（見附图青箱）

药用部分 种子

附註 清孫星衍等輯本經，引魏略云：“初平山有青牛先生，常服青箱子。箱，當作箱字。”今滇本草正作“箱”字。圖考謂：“青箱子即野雞冠，有赤白各種。葉可作茹，勝於家雞冠葉，一名草決明。鄉人皆知，以治目疾。”



青 箱

粟 米

本品为禾本科 (Gramineae) 植物粟 *Setaria italica*(L)Beauv.

别名 狗尾粟 粟 粟谷 黄粟 梁 小米 稞子 寒粟

原文 粟米，味鹹，微寒。主滋陰，養腎氣，健脾胃，煖中反胃，服之如神。治小兒肝蟲或霍亂吐瀉，肚疼變痢疾或水瀉不止，服之即效。用草連根，治轉食冷吐。①

——务本堂本卷一上第41頁

校 ①本种仅見于务、世两本。

植物形态 一年生簇生草本，栽培或自生，高 1—2.5 米。鬚根黃白色。秆直立，稍粗壮。叶披針形或綫状披針形，先端长且尖，两面秃淨，边缘粗糙。叶鞘秃淨，鞘口有柔毛。圓錐花序呈圓柱形，单生或成分枝状的复生，长约 8 厘米，寬約 1.2 厘米。穗軸密被絲毛。小穗橢圓形，强拱凸，长约 3 毫米，基部有褐色剛毛 1—3 条，毛长约 为小穗的 2—3 倍。第一穎卵形，第二穎橢圓形。不孕小花外稃橢圓形，結实小花外稃平凸状橢圓形，表面有皺紋，边缘狭內卷，包持着內稃，內稃先端露出。果实脫落时，穎和不孕小花的外稃尚宿存。果实卵圓形，黄色。（見附图粟米）

药用部分 全株 种子



粟 米

山 稗 子

本品为莎草科 (Cyperaceae) 植物紅果莎 *Carex baccans* Nees.

別名 紅果莎 送 烏禾 稗 旱稗

原文 山稗子①、〔米味甘〕②，殼澀③，根葉苦澀，性微寒。耑治婦人散經敗血之症。

(補註) 婦人經行。每三十個時辰兩日半期，故謂經期有准繩。有婦人氣血虧損，腎肝血虛，行經頭暈，耳鳴發熱，五心煩熱④，腰疼，肚腹冷疼，氣脹，心慌怔忡，血行淡黃色，或三天已止，或五天再行，七八天又行方止，故有散經敗血之名。或月水過多，將成崩症，或已成血崩⑤，〔用〕⑥山稗子以五錢爲度，煎湯點水酒服良效。

— 务本堂本卷二第36頁

校 ①山稗子，务本作“山稗子”，丛本作“山敗子”，均誤。

②务、世、翰本作“味甘如米”，依丛，琴本改。

③丛本誤为“亮澀”。

④“五心煩熱”丛本作“煩躁”。

⑤丛本有“單方”二字，在“月水過多……”之前，依务、翰本改，琴本无此句。

⑥“用”字依丛本加。

植物形态 多年生秃淨草本。莖三稜形。叶綫形，前端細长，两

面光滑，叶鞘秃淨。花序为复圆锥花序；苞片基部抱莖，上部綫形，褐色叶状。穎淡褐色，卵形，微尖銳，复瓦状排列於小总軸的周圍。雄蕊3枚。子房包藏于囊胞內。囊胞卵形，有短喙、紅色；坚果棕色，三稜形，包藏于扩大宿存的囊胞內。（見附图山稗子）

药用部分 果实 全株



山稗子

天天茄

本品为茄科 (Solanaceae) 植物龙葵 *Solanum nigrum* Linn.

別名 職 龍葵 苦菜 苦葵 水茄 天泡草 天泡果 天茄苗兒 老鴉酸漿草 老鴉眼睛草 犬酸漿 牛酸漿 救兒草 後紅子

原文 天天茄①，味甘苦②，性大寒。治小兒風熱，攻瘡毒，洗疥癩癢痛，祛皮膚風〔熱〕③。〔用枝葉〕④。

——云南丛书本卷下第1頁

天天茄，一名救兒草。性大寒，味苦。今滇中多有。昔張真人至南海，得異傳，帶來滇中，一名後紅子。

主治：小兒風邪，熱症驚風，化痰解疾，亦〔治〕⑤痘風瘡，遍身風癢。疔、可攻能散。

採葉洗瘡其效如神。

——范洪“圖說”卷四第28頁

校 ①务本作“天天茄”，誤。

②务、世、翰、翠本均作“味苦”。

③“熱”字各本均无，据翰本增。

④“用枝葉”三字，依翠本增。

⑤“治”字依文意增。

植物形态 一年生草本，很少呈多年生而莖下部呈木質者，高15—60厘米。根淡黃色。圓錐形，生多數支根。莖直立或下部偃臥，略具稜角與細毛。葉互生；葉柄長15—35毫米，有疏細毛。葉卵形，長1.5—7厘米，寬1—5厘米，基部寬楔形或呈平截狀，下延至葉柄，先端尖，邊緣有波狀鋸齒；上面深綠色，下面淡綠色，兩面均有細毛。花序總狀，有時花柄簇生梗端甚密，有如有柄繖形花序，花序側生，每花序有2—10花；在下面無葉及苞片。總花梗長約1—2厘米，具疏細毛。小花柄下垂，有疏細毛。花白色，直徑約1厘米。花萼圓筒形，外面有疏細毛；裂片5，上向，卵狀三角形，長約1毫米。花冠無毛，管短，圓筒形；裂片5，卵形，頂端尖，長3毫米。雄蕊5枚，着生花冠管口，長3毫米；花絲分離，長約1毫米，內有細柔毛，花粉囊黃色，各邊互相密接，長約2毫米，縱裂。雌蕊長5毫米，子房球形，無毛，長1毫米，2室。花柱下半部長柔毛密生，柱頭圓形，高與雄蕊齊。漿果球形，直徑約8毫米，有光澤，黑色。種子扁圓，直徑約2毫米。（見附圖天天茄）

藥用部分 枝 葉



天 天 茄

刺 天 茄

本品为茄科 (Solanaceae) 植物 *Solanum indicum*。

别名 天茄子

原文 刺天茄①，即天茄子②。味苦〔甘〕③，性寒④。治牙齒疼，爲末搽之即愈。療腦漏鼻淵，祛風，止頭痛，除風邪。

——云南丛书本卷下第1頁

按 ①务本作“刺天茄”，誤。

②务、世、翰、琴本作“天茄子”，一名“刺天茄”。

③原作“味苦”，依图考引文改。


④琴本作“性大寒”，其他各本均无“大”字。

植物形态 多年生小灌木，高約1米左右，全体被星状柔毛。枝圓柱形，褐色，具粗壮倒鈎刺。叶互生，叶柄长7—11毫米，叶矩圓状卵圓形，长2—5.2厘米，寬1.4—3.6厘米，先端鈍尖，基部兩側不等，有时近截形，邊緣具不規則深波状或淺裂，两面均被星状柔毛，尤以背面为密，叶柄及叶的两面均具散生淡褐色短刺。花序为側生聚繖花序，小花梗上散上短刺，長約5毫米。花藍色，長約1厘米。萼4裂。花冠淺鐘状，开放前折疊，裂片5枚，披針形，長約8毫米，寬2毫米。雄蕊5枚，着生于花冠喉上，花藥粘合成一圓錐体，黃色，長約6毫米，頂裂，子房二室。漿果球形，直徑約1厘米，成熟后黃色。

(見附图刺天茄)

药用部分 果实

附註 图考“刺天茄，滇黔山坡皆有之。長條叢蔓，細刺甚利。葉長有缺，微似茄葉，然無定形。花亦似茄，尖瓣黃蕊，粉紫淡白，新舊相間，花能結圓實，大者如彈，熟紅，久則褪黃。自春至冬，花實不斷。……”下引滇本草，与原文同。



刺天茄

覆盆子

本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物 *Rubus foliolosus* D. Don.

别名 硬枝黑鎖梅 紅刺泡 瑣梅 鑽地風 疎風草 紫茵

原文 覆盆子〔即硬枝黑鎖梅〕^①。味甘酸，性微寒。入肝腎二經。入腎與陽，治痿〔軟〕^②，入肝強筋。種〔子〕^③方中決不可少。

〔又覆盆子，俗呼瑣梅，又名鑽地風，又名疎風草。味甘酸，分黃黑二種，能瑣玉關，故名瑣梅。得水氣而生。入腎經。益腎補肝，明目與陽。婦人多食能生子，其功不可盡述。根洗疥癩瘡。〕^④

——云南丛书本卷中第13頁

校 ①②据务、世本增。

③丛、务、李本作“種玉方”，依世本改。

④务本覆盆子有两条。其中卷三第24頁一条与丛本同。至卷一下第10頁一条，内容不同，今合併列为一条。

植物形态 落叶蔓生小灌木，高50—120厘米。干直立或弓弯，枝、叶柄和花序均具刺。新枝紅紫色，密被白色細絨毛，刺上亦具絨毛。老枝圓柱形，紫褐色，略有光泽，多少被有絨毛。叶互生，奇数羽状复叶。总叶柄长约18毫米。托叶紅紫色，披針形，有絨毛。小叶5—9枚，边缘具双重粗鋸齿或粗鋸齿；上面綠色，无毛；下面白綠色，密被細絨毛；叶脉上面下陷，网脉明显，下面突起，側脉9—12

对，明显直达锯齿尖端；小叶以頂生者最大，闊卵圓形，长1.8—4.8厘米，寬1—3.2厘米，先端漸尖，基部圓形，叶柄长4—10毫米；側生小叶漸上漸小，几无柄，橢圓形或卵状橢圓形，长1.8—4.1厘米，寬8—21毫米，先端短尖或漸尖，基部近圓形或闊楔形。夏天开花，花小，直徑約5毫米，成頂生微有細刺和絨毛短复总状花序。花萼5枚，披針形或卵状三角形，长5—7毫米，寬約2毫米，頂端有长尾状漸尖头，基部合生，綠色，上部淡紫色，密被細絨毛。花瓣5枚，易落，桃紅色，倒卵形，邊緣略具淺縐折，基部具短爪，复瓦状排列，內曲。雄蕊多数，不等长，着生于心皮周圍；花絲絲状，分离，花药橢圓形、黃色、背着。心皮多数，合生，花柱分离。果实为肉質集合果，直徑約1厘米，初时紅色，成熟后变黑色，密被絨毛。（見附图覆盆子）

藥用部分 果实及根

附註 图考：“滇南有黑瑣梅、黃瑣梅、紅瑣梅、白瑣梅，皆三四月熟。兒童摘食以爲果。梅即莓，瑣、其子細瑣也。志書多以黑瑣梅爲覆盆。按形與李說（校者按：指李时珍本草綱目）亦不甚符。”

按：滇本草覆盆子別名鈷地風，又名硬枝黑鎖梅，另有黃鎖梅根，別名亦作鈷地風，其味性疗效与覆盆子全不相同。



覆 盆 子

落花參

本品为蝶形花科(Papilionaceae)植物落花生Arachis hypogaea L.

别名 長生菓 番豆 及地菓 地豆 花生 落花生 落花松

原文 落花參，味甘熱，無毒。鹽水煮食，治肺癆，生用，水瀉。炒用，燥火行血。治一切腹內冷積肚疼。服之即效。枝葉治跌打損傷，敷傷處。小兒不宜多食，生蟲變為疳疾，忌之。①

——务本堂本卷一上第38頁

落花生，味甘、寒無毒。主治補中益氣，多則滯氣。鹽水煮食養肺；炒食動火。小兒多食則生疳痰。採葉治毒瘡，其效如神。

——范洪“圖說”卷大第20頁

校 ①此藥只見务、世、范本。

植物形态 一年生被毛分枝草本，栽培。莖臥地，長30—80厘米。葉為偶數羽狀復葉，長8—12厘米。葉柄基部抱莖。葉鞘延伸為2枚綫狀披針形托葉。小葉通常2對，矩圓形至倒卵形，長2—4厘米，先端鈍或短尖，全緣。夏天葉腋叢生數朵黃色小花，長約8毫米。萼管綫形，裂片膜質，上四枚合生，下面一枚較薄，分離。花瓣及雄蕊着生于萼管之頂；旗瓣圓形；翼瓣矩圓形，龙骨瓣內彎，有喙。花絲全部合生成一狹管，有時只9枚；花藥長短互生，基生或丁字着生。子房近無柄，生管基部，胚珠1—3顆，花后，花托延長下彎，

將果推入地中。莢果于地下成熟，念珠狀長橢圓形，具網紋，革質，不開裂，長1—5厘米，內含種子1—3顆，種皮紅色，種子白色。

（見附圖落花參）

藥用部分 種子及枝葉

附註 檀萃滇海虞衡志：“落花生為南果中第一，其資于民用者最廣。宋元間，與棉花、番瓜、紅薯之類，粵估從海上諸國得其種，歸種之。……呼落花生曰：落花松。”又南越筆記云：“味甘以清，微有參氣 故名落花參。”（下略）



落花参

拐 棗

本品为鼠李科 (Rhamnaceae) 植物 *Hovenia dulcis* Thunb.

別名 枳椇 蠻子梨 枸骨 樹密 木錫 木密 橫核橄 蜜屈律 木珊瑚 雞距子 雞爪子 桔枸 棘枸 金鈎木 白石木 枿拱 交加枝 曹公爪 癩漢指頭 結留子 雞橘子 天藤 還陽藤 雞距 雞爪梨 甜半夜 枳拱子 龍爪 玄圃梨 木錫 龍爪

原文 拐棗，一名天籐，一名還陽籐。味甘、微溫^①，無毒。治一切左〔癱〕^②右瘓，風濕麻木。能解酒毒，或泡酒服之，亦能舒筋絡。久服輕身延年。〔化小兒疳蟲，健胃養脾，物易得而效。〕^③

——務本堂本卷一上第41頁

拐棗，味甘平無毒。主治：補中益氣，痰火閉結于胸中，或酒毒結痛，用此可解。

治遠年近日痰火，濕氣流痰，泡酒常服，自可痊愈。

小兒有疳疾者，可常常食之。

——范洪“圖說”卷九第15頁

校 ①通志引作“微寒”。

②原作“癱”，依通志改。

③原作“小兒服之，化蟲養脾，其效如神。俗人不以此棗爲然，而又不知用處”。詞意不明，依通志改。

植物形态 落叶乔木，高10米，直径1米。树皮灰黑色，深纵裂，不剥落。一年生枝为红褐色，有皮孔。冬芽卵圆形，长约2毫米，为一二鳞片所包被；鳞片密生黑褐色软毛，另有一小形副芽。叶互生，广卵形或心状卵形，长10—15厘米，宽6—10厘米，先端尖或长尖，基部圆形或心脏形，边缘具锯齿；上面深绿色有光泽；下面淡绿色，无毛，或沿脉及脉腋有细毛，基出三主脉，通常淡红色而显明。叶柄长2—4厘米，红褐色，无毛或具稀毛，具细脉点。六七月间开小花，花序聚伞状，顶生或腋生，宽约4厘米。花梗长约6.5厘米，几无毛，枝有细锈色毛。花苞细小，长不及1毫米，有细毛。花柄无毛，长约3毫米。花杂性、绿色，径约7毫米。花萼5片，近卵状三角形，顶端加厚。花瓣5片，倒卵形，顶端平截，中微凹，两侧卷起，长与萼片及雄蕊等。雄花具雄蕊5，花丝细，花药椭圆形，中央有退化子房。两性花雄蕊与雄花相同。花柱有毛，雄蕊着生其边；雌蕊长2毫米，子房上位，3室，花柱3裂。果实近球形，成熟不开裂，直径6—8毫米，灰褐色，秃净，3室，具3种子；果梗肉质，肥厚扭曲，红褐色，无毛，有甜味，可食。种子扁圆，红褐色，有光泽。（见附图拐棗）

药用部分 果梗和种子 木皮及木汁亦可入药

附註 檀萃滇海虞衡志：“枳椇子，滇人呼为拐棗。”又农部瓊录謂：“拐棗，形曲如拐，味甘能補。”李时珍本草綱目：“滇人之稱雞橘子，……皆枳椇、雞距之字，方音轉異耳。”新纂云南通志：“拐棗屬鼠李科，或雲枳椇。落葉喬木，花梗甜美，形態曲突，可解酒醒，滇山野產之。”



拐 棗

秋 木 瓜^①

本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物 *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai.

别名 木瓜 貼梗海棠 鐵梗海棠 鐵幹海棠 木瓜花 南海海棠 貼幹海棠 秋末皮 秋木皮

原文 秋木瓜^②，味苦辛甘，性溫^③。治筋骨疼痛，痰〔火〕^④脚軟。

——云南丛书本卷中第11頁

校 ①、②丛、琴本作“秋末皮”，李本作“秋木皮”，务、世本作“秋木瓜”，茲据务、世本，因一般常呼为秋木瓜。

③务、世本作“性微溫”。

④“火”字，据务、世、李、琴本增。

植物形态 半常綠灌木，多栽培庭園間，高可达4米。条向外展，拱曲，有刺。树皮光滑，疏具皮孔。幼枝密布短曲污黄色柔毛，頂端成刺。当年生枝条趋于秃淨，圓筒形、褐色、皮孔少。腋芽单生，小，具二鱗片，发育成枝刺，或次年之长枝。側芽兩側各一，只一个发育，因成互生短枝。頂芽具多数鱗片，发育成簇生叶、花丛或长枝。叶革質，短枝上叶通常4—7片簇生。托叶不显，当年脫落。叶片通常长橢圓形，长3—12厘米，寬1—3厘米，先端尖，基部狭楔形或漸尖，密生不整齐尖鋸齿；上面深綠色，发亮光滑，中脉及粗疏網脉下陷，下面淡綠色，中脉略突出，具疏生柔毛。叶柄紅色，长2—7毫米，微具柔毛。花深紅色，漏斗形，长3—4厘米，徑亦

3—4厘米，通常3朵簇生，与新叶同发或早开。花序下有一二片不正常之叶，花梗极短，上具早脱之鳞片状小苞。萼筒长2—3厘米，色绿，染以紫红色，有时白粉，在子房上部扩大成漏斗形，内外均光滑。萼片直立，卵圆状三角形，圆头，外面光滑，内面及边缘具密生长柔毛。花瓣圆形，具短爪，径达2厘米。雄蕊约30枚，长约14毫米，紫红色，花丝丝状，药长椭圆形，黄色，丁字着生。子房下位，五室，花柱5枚，基部联合，疏生短柔毛，上部分离，而与雄蕊同长，柱头面橙黄色，密生乳头状突起。果卵形，高7—10厘米，两端凹入，不具宿萼，成熟时密黄，有时染以红色，外果皮光滑，有芳香味。种子扁平，长三角形。（见附图秋木瓜）

药用部分 果实



秋木瓜

土 千 年 健

本品为石南科 (Ericaceae) 植物 *Vaccinium fragile*. Fr.

别名·土千年劍 烏飯子 烏飯果 米飯果 千年矮 純陽子

原文 土千年健^①，一名烏飯子，又名千年矮，又名米飯果〔即烏飯果根〕^②。味酸、性溫。治寒溼傷筋、〔此藥能〕^③舒筋活絡，〔筋攣骨痛〕^④，痰火痿軟，半身不遂，〔手足頑麻〕^⑤，〔脚痛。酒爲使，神效〕^⑥。

〔附藥酒方〕^⑦：

千年健、鑽地風^⑧、石南藤、牛膝^⑨、秦歸、木瓜，以上泡酒用。

〔葉敷瘡消風，怔忡睡臥不寧者，採子煎服立瘥。〕^⑩

〔烏飯子，味甘酸，採子晒乾聽用。久服能烏鬚黑髮，返老還少，令人齒落重生。昔劉真人食此果能純陽，故名純陽子。〕^⑪

——云南丛书本卷中第3頁

校 ①原作“土千年劍”，惟务、李、琴本，均作“土千年健”，范本作“千年健”，故改題今名。

②③⑥据范本增。

④⑤⑦丛本缺，据务、李本补。

⑧原作“鑽地風”，据务、世、李、琴本改。按从本卷中第24頁有“鑽地風”，又名“黃鑽梅根”，即此藥。


⑨原作“牛夕”，据务、世、李本改。

⑩据范本增。

⑪此条从本无，务本与“土千年健”分列两处，今移合为一段。

植物形态 常綠低矮小灌木，高30—40厘米。莖圓柱形，多分枝，褐色。小枝圓形，密被褐色剛毛。冬芽小，为两对复瓦状排列的鳞片所包被。叶互生，叶柄短，长约1.5毫米。叶革質，橢圓形或卵状矩圓形，长1—1.9厘米，寬5.5—10毫米，先端短尖，基部近圓形或闊楔形。上面綠色、无毛，下面淡綠色，有剛毛或无毛，边缘具刺状鋸齿，干时反卷，中脉上面平，側脉不显，下面叶脉凸出。春夏开花，总状花序腋生或頂生，花序长2.2—3.1厘米。花軸上密被柔毛，花有花梗，长2—4毫米，在花梗的中上部有卵形小苞片1对。花萼短钟状，紅色，长约2毫米，頂端5裂；裂片三角形。花冠壶形，白色，长3—4毫米，頂端5齿，有5条明显的紅色脉，花冠內面密生白色細柔毛。雄蕊10枚，长约2.5毫米。花絲扁圓，长不及1毫米。花药黃色，橢圓形，着生花絲頂端。花絲及药背上均生白色細柔毛，药有刺芒2，頂孔开裂。雌蕊1枚，扁圓形，直徑約1毫米。花柱单一，細圓柱形，长3—4毫米。柱头圓形，浆果圓球形，直徑3—8毫米，熟时紫黑色，內具多数細小种子。（見附图土千年健）

药用部分 果实 根 叶



土千年健

老虎刺尖

本品为苏木科 (Caesalpiniaceae) 植物 *Caesalpinia sepiaria* Roxb.

别名 貝實 雲英 天豆 馬豆 羊石子 草雲母 臭草 粘刺 雲實 藥王子 鐵場豆 水皂角

原文 老虎刺尖，味苦，性寒^①。治咽喉腫痛乳蛾。搗汁點水酒或同白酒汁服。^②

——务本堂本卷第3頁

校 ①原作“性寒，味苦”。依全书編例改。


②此药仅見务、世、李本，内容全同。

植物形态 落叶有刺攀援状灌木，高可达4米。树皮灰褐色，小枝褐色，幼时密被灰色或褐色短柔毛，莖和枝均具倒钩刺。芽小，密被黄褐色柔毛。叶互生，二回偶数羽状复叶，叶柄近圆柱形，基部略膨大，长2.2—5.6厘米。羽片4—8对，长10—31厘米，每一羽片有小叶7—9对，通常8对。小叶近无柄，矩圆形或长椭圆形，长1.2—3.5厘米，寬5.5—11毫米，上面深綠色，下面綠色，中脉凸出，侧脉不明显，两面均疏被白色短柔毛。春天开花，总状花序腋生，长4—27厘米，总花梗生倒钩刺。花黄色，有香味，直徑約3.4厘米。小花梗长1.9—3.2厘米，有細柔毛。萼片5枚，深裂，裂片长卵形，长约8毫米，复瓦状排列，其最下一片較其他4枚大，基部盘状，披淡棕色柔毛。花瓣5枚，扩张，圆形，长约1.4—1.6厘米，有柄，其最上一枚較其他4枚小。雄蕊10枚，分离，长短不等。花药卵圆形，背着，

紅色，長3毫米。花絲除頂部外，密生白色絲狀毛。雌蕊1枚；子房上位，扁圓柱形，一室，長約5毫米，有絲毛，花柱單一，長約1厘米，柱頭頭狀。果為莢果，呈長橢圓舌狀，稍膨脹，長6—7厘米。種子4—8枚。（見附圖老虎刺）

藥用部分 果實 種子 根

附註 圖考：“老虎刺，黔中植以為藩。細葉夜合，桑枝蓋偃。秋時結實，若豆而扁。下垂片角，薄於蟬翼。……”（下略）



老虎刺

赤 陽 子

本品为蔷薇科(Rosaceae)植物*Pyracantha fortuneana*(Max) Li.
别名 救軍糧 赤菓 火把菓 豆金娘

原文 赤陽子，味甘酸。治胸中痞塊、食積，消蟲，明目，瀉肝經之火，止婦人崩漏皆效。

——务本堂本卷一下第10頁

赤陽子，生大川平野間，填園多以爲牆，今處處有之。枝大有刺，結細子，色赤甚繁。一名救軍糧，一名火把菓。

主治：婦人產後，百病淹纏或瘀血成塊、血崩等症，服之如神。

——范洪“圖說”卷九第19頁

植物形态 常綠小灌木，高1—3米。枝通常有棘刺。小枝幼时有锈色細毛。叶为互生单叶，有时簇生。叶柄短，长约2.6—6厘米。叶片椭圆形或倒卵形至倒卵状矩圆形，长1.5—6厘米，寬0.8—1.4厘米，頂端圓或鈍。有时有一微小突尖，向基部漸狹而全緣，邊緣具圓鋸齒；上面暗綠色而有光澤，中脉略凹；下面淡綠色，中脉成脊状隆起，无毛。托叶微小，早落。花白色，直徑約1厘米左右，成复繖房花序，直徑3—4厘米。萼片短，5—6枚，长约1毫米，与子房联合，花盘貼生于萼筒內。花瓣与萼片同数互生，倒卵形，长约3毫米，寬亦如之，頂端圓或微凹，基部呈短爪状，复瓦状排列。雄蕊20枚，分离，花絲絲状，花药黄色，背着，长2毫米左右，其基部周圍

有白色絨毛。心皮 5 枚，在腹面分離，在背面約 1/2 附着于花萼管上，柱頭頭狀。果為小梨果，幾球形，直徑 7 毫米，宿萼，5 核，珊瑚紅色。（見附圖赤陽子）

藥用部分 果實

附註 通志：“救軍糧山野彌望，綠葉白花，紅子極繁。五六月熟，酸甘可食。”

新纂雲南通志：“救軍糧，俗訛稱豆金娘。生滇山野間。入夏以後，結實纍纍，果橙黃色微有甜味，可生食，亦可為救荒植物云。”

務本卷二外附良方：“暴發火眼，用救軍糧葉於口中嚼爛，敷眼皮上即安。”

檀萃農部瑣錄：“救軍糧，樹高及人，葉細如瓜子，白花紅子，酸甘可食，山野彌望。武侯南征，軍士採食之故名。”



赤 陽 子

郁李仁

本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物 *Prunus humilis* Bge.

别名 樣藜 唐藜 唐梨 棣梨 烏拉奈 酸丁 歐梨 歐李

原文 郁李仁〔一名樣藜，又名唐藜、唐梨、棣梨〕^①，味酸甜，性平^②，潤大腸。治四肢浮腫，開通關格，破血，利水道。皮、治齒痛^③。

——云南丛书本卷中第11頁

校 ①从本别名，只列“棣梨”，又列“唐梨”为俗名。依务、世本增“一名樣藜，又名唐藜”句。

②从本缺药性。依务、世本增。

③务、世本作“治齿痛”，无“皮”字。

植物形态 直立灌木，高至2米。多枝，幼枝有短柔毛。叶倒卵形或椭圆形与长椭圆状披针形，长约2.5—10厘米，先端尖或渐尖，基部楔形，边缘有细锯齿，背面平滑无毛。叶柄长3—4毫米。花与叶同时开放，白色或粉红色，直径约1.5厘米。花梗长约0.5—1厘米。果实球形，大约1.5—2厘米，熟时红色，有光泽，味酸。(见附图郁李)

药用部分 核仁



郁 李

金 絲 桃

本品为金絲桃科 (Hypericaceae) 植物金絲梅 *Hypericum Patulum* Thunb.

別名 金絲梅

原文 金絲桃，味苦，性寒。行肝氣，利小便，治諸淋，利膀胱，止腎中①痛。走經絡，止筋骨疼。止偏墜氣疼，膀胱疝氣，良效。

(單方) 治膀胱疝氣，左右偏墜，腎子腫大。

金絲桃不拘多少，引點水酒煨服〔爲末，可治癩瘡〕②。

——云南丛书本卷下第3頁


校 ①务、世、琴本作“莖中”，翰本作“玉莖”。

②各本均无此句，据琴本增。

植物形态 秃淨、多枝，小灌木，山野自生或庭园栽培，高可达1米以上。小枝圓柱形，褐色，节处略膨大。叶对生，近于无柄，卵圓形或矩圓形，长1.9—4厘米，寬1—2.2厘米，先端鈍，基部近圓形，上面綠色，下面粉綠色，紙質，全緣，中肋上面略凹，下面凸出，側脉不明显，两面均秃淨，惟下面有油腺点。夏初，枝梢开花3—7朵，单生或排列成聚繖花序。花黃色，直徑3.5—5厘米。萼5枚，倒卵形，长7—9毫米，先端微鈍。花瓣与萼瓣同数，互生，闊倒卵形，长约2.2厘米，寬1.5—1.7厘米。雄蕊多数，长约达花瓣之半。花絲黃色，細絲状，基部合成5束。雌蕊1枚，子房上位，圓錐

形，直徑約5毫米，光滑，花柱5，長約6毫米，柱頭頭狀，向外反卷。果實為蒴果，卵形，長8—15毫米，5裂，散出多數種子。種子褐色，圓柱形，長約0.5毫米。（見附圖金絲桃）

藥用部分 全株



金 絲 桃

苦 楝 子

本品为楝科 (Meliaceae) 植物楝树 *Melia Azedarach* Linn.

别名 楝實 苦楝 金鈴子 苦練子 苦楝子 紫花樹 川楝子 翠樹
森樹 楝

原文 苦楝子，一名金鈴子^①。味苦，性寒。利膀胱疝氣^②。根皮殺小兒寸白蟲。雲生者味辣^③。有毒^④。

——云南丛书本卷中第10頁

校 ①据务、世、李本增。

②务、世、李本作“治膀胱疝氣”。

③务、世、李本作“味苦辣”。

④务、世、李本作“有小毒”，又下文并有“忌鍋烟子，犯之則殺人”句。

植物形态 落叶乔木，高至20米。枝条肥大而伸展，有星状細毛，旋脫落。老枝紫色，具多数細点状灰白色之皮孔。冬芽腋生，圓形、稍扁，长3毫米，寬6毫米，外露7—8枚鱗片，密生灰黄色細毛。叶互生，二回羽状复叶，长25—80厘米。叶柄长12厘米，初披星状毛，旋即脫落。小叶对生，5—11片，卵形或卵状披針形，长4—7厘米，寬2—3.5厘米，先端长尖，基部圓形或广楔形而不等称，边缘具不規則鋸齿，或全緣，上面深綠色，下面淡綠色。初时两面有灰白色微細星状毛，老时除沿脉稍有毛外，余无毛，中脉显著。小叶柄长4—10毫米，有时几无柄。春天开花，花两性，腋生，圓錐花序，长达30厘米，下垂，有毛。花梗长至14厘米。苞小，綫形，长约2毫米，早

脫落。花紫色，徑約2厘米。花萼5裂，長4毫米，直立。萼片披針形，尖頭，兩面有密毛。花瓣5片，平展或反曲，長10—12毫米、倒披針形或綫形，鈍頭，兩面有細毛。雄蕊10枚，花絲合生成管，頂端10裂，裂片三角形，花藥黃色，伸出管外。雌蕊1枚，子房上位，無毛，着生于一花盤之上，球形，五室，花柱肥大，成長筒形，柱頭頭狀淺裂。核果球形，黃色，成熟時光滑，直徑1.5—2厘米。種子長橢圓形，暗褐色。（見附圖苦楝子）

藥用部分 果實及根皮

附註 務本卷三外附良方：“夜間腹疼者，蛔蟲咬也。用苦楝子皮去粗者，將細白皮切碎二斤，入水十碗，煎折二分許，取起濾去渣，放土鍋內，慢火熬成膏，每日五更時溫酒調下一錢，以蟲下爲度。”



苦 楝 子

皮 哨 子

本品为无患子科 (Sapindaceae) 植物无患子 *Sapindus Delavayi* (Fr.) Radlk.

别名 桓 噤婁 櫛子木 無患子 木患子 肥珠子 油珠子 菩提子 鬼見愁 黃木樹 猴兒皂 黃木子

原文 皮哨子，味苦，性微寒^①。皮治膀胱疝氣疼痛。子殼殺蟲。

昔一人飲水，將螞蝗一條吸入鼻中，頭長眩疼，鼻中長流血水，面黃形瘦。後得一人，以水一鍾於鼻上聞，螞蝗見水，從鼻孔中伸出，動則縮入鼻中。將皮哨子殼爲末，吹入鼻中，螞蝗自落下。^②

——务本堂本卷三第21頁

皮哨子，性微寒，味苦。主治七疝肝症氣。狐疝用茴香爲使。水疝用陳皮爲使。餘者引用橘核爲使。燒灰吹鼻，治諸蟲入腦，立愈。圓者屬陽治氣，光者屬陰治血。

——范洪“圖說”卷五第15頁

校 ①原作“性微寒，味苦”，依全书編例改。

②此葯丛本敘述过簡，故采用务本。又李、世本与务本同。

植物形态 落叶乔木，高可达15米。树皮灰色。小枝灰色，幼时

密被短絨毛，皮孔及葉痕明顯，芽密被褐色絨毛。葉互生，偶數羽狀復葉。小葉5—7對，為矩圓形或橢圓狀矩圓形，長5—14厘米，寬2.5—6.5厘米，先端急尖，基部圓形或楔形，全緣，上面深綠色，下面綠色。兩面沿葉脈均被稀疏短毛；葉脈明顯，上面微凸，下面凸出，側脈10—17對，與主脈相交約成60°角。小葉柄圓柱形，密被短柔毛，長4—8毫米。葉軸灰綠色，被灰色短柔毛，有兩條淺溝，基部膨大。花為雜性異株，排成圓錐花序。萼片5，兩片較大，長橢圓形，3片較小，卵圓形。花瓣4，內面附有被白色絲狀長絨毛的鱗片，萼瓣上均被密毛。雄蕊8個，花絲上有白色絲狀毛。子房倒心形，禿淨，無柄，三室，通常只一室發育成熟為果實，花柱宿存。核果圓形、光滑，直徑約18毫米，成熟後黃褐色。種子圓形、黑色光滑。（見附圖皮哨子）

藥用部分 果實及種子



皮 哨 子

山 查

本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物山楂 *Crataegus scabrifolia* Rehder.

別名 山楂 山林果 山楂 沙欒果 山里紅 榘子

原文 [山楂，性寒，味甜酸。消肉〔食〕①積滯，下氣，舌酸積塊。]②

(奇方) 治胃脘有堅久積滯，或寒膩胃，或飲食結滯，嘔吐酸水，胸膈飽悶，飲食不思，〔倒〕飽〔嘈〕雜③ 吞吐酸水，兩脅間有積塊作痛，此藥有消積進食之功。

山楂核五錢燒炒黃色 沙苑蒺藜五錢微〔焙〕④ 雞肫皮五錢火焙黃色 [加建糶五錢焙]⑤

共細末每服一錢，滾水送下，忌生冷。

[久泄不止及水泄妙方：

沙苑蒺藜三錢 吳神糶二錢⑥ 炒山楂二錢 [蕪]⑦ 夷錢半 白蔻仁二錢 雞肫皮三錢炒黃 炙草二錢 蓮子五錢去心 共爲細末。每服二錢，滾水下。

治小兒蟲藥方：

枳壳一錢 厚樸一錢 [蕪] 夷一錢⑧ 使君子一錢 甘草五分 廣檳榔一錢 胃寒有食加山楂一錢，夏天不用 砂仁

校 ①“食”字务本脱落，依翰本增。

②此段从本遺略，依务本补入。

③“倒”原作“到”，“嘈”原作“槽”，依务本改。其釋
意为打饱呃、心头煩杂。

④原作“微妙”，依翰本改。

⑤此句原列“忌生冷”一句下，文意不合，故移前。又此句
仅从本有，务翰两本无。

⑥务本作五錢。

⑦原作“撫夷”，依翰本改。

⑧仅从本有此味，务、翰两本无。

⑨此段原系全书卷下附方，（务本附卷中之后）移載于此。


植物形态 落叶乔木，高达10米，栽培或自生，树皮灰棕色。小枝細瘦，灰褐色至棕紅色，无毛，有明显叶痕。叶为互生单叶，倒卵形或卵状椭圆形或椭圆形，长4—7厘米，寬2—3厘米，先端漸尖，基部楔形。上面濃綠色，被少許白色短毛，下面淡綠色，除沿叶脉处被少許白色短毛外，余无毛，側脉8—11对，与中脉相交，成40—45度角。叶脉在上面凹下，下面凸出，边缘呈不規則的鋸齿。叶柄长1—2厘米，花两性，生小枝，頂端，呈繖房毛序。萼筒杯状，萼片五裂，有毛。花瓣五枚，白色，椭圆形。萼筒杯状，雄蕊，多数生于萼筒边缘。子房下位，心皮五，分离。苞片披針形，具短毛。花柄长5—8毫米。果球形而扁，直径2—2.5厘米，高約1.5厘米，黄色，有褐色圓斑点，宿萼。种子五粒，骨質黑色。（見附图山查）

药用部分 果实及种子

附註 “山林果單方”滇民間使用甚广，且普遍作食用。檀萃滇海虞衡志：“山查巨亦甲天下。樹高大如柞櫟。查錢查膏尤佳。”

山查治瘡，滇中单方：煮山林果水洗漆瘡或燒山查出汁擦凍瘡，良效。

山查各地均有，明李元陽雲南通志載滇產列有大理府、永昌府、潯江府、景東府、麗江軍民府等屬。



山 查

白菓

本品为銀杏科 (Ginkgoaceae) 植物銀杏 *Ginkgo biloba* Linn.

別名 銀杏 公孫樹 鴨脚子 佛指甲 鴨掌樹 靈眼

原文 白菓，味甘平，性寒。乃陰氣而生，故夜間開花，不可多食。若食千枚，其人必死。採葉陰乾，治小兒生火。以菜油調搽皮面上風血或大瘡不出頭者。白菓肉同糯米蒸，合蜜丸，與核桃搗爛爲膏服之，治噎食反胃，又治白濁冷淋。又白菓肉搗爛敷太陽穴，止頭風眼疼。用汁點喉內，治咽喉十八症。採菓搗爛，敷無名腫毒。①

——务本堂本卷一下第5頁

白菓，味甘苦，性溫，有小毒。生食引疳，熱食溫肺，定咳嗽，縮小便。多食壅氣發脹而動風。小兒多食，昏迷發驚，引疳疾蟲出。同魚腥食發軟。

延壽經云：“白菓食滿一千則死”。昔有凶年飢者以白菓同飯食飽，次日則死。

採葉搗爛，搽雀斑甚妙。

採樹皮燒灰，調油搽牛皮銅錢癬，最效。此方出土司處。


——范洪“圖說”卷九第9頁

校 ①此品只务本收載、世本据之重印，內容全同。

植物形态 落叶乔木，多栽培，高达40米，遍体无毛。干端直，树皮灰色，老呈黄褐色。短枝粗而短，各端簇生多叶，四周有叶痕，数年后短枝忽然伸长，成长枝，出互生叶。芽圆锥形，具短尖，芽鳞鲜褐色。叶柄细长。叶扇形，长至8厘米，闊5—8厘米，綠色，全緣或波状或作不規則之淺裂，有时2裂，无中脉，具多数平行脉，春天淺綠色、夏季深綠色，秋时黃化，两面有气孔。花单性，雌雄异株，4—5月开花。雄花柔荑花序状，4—6生于短枝上端，下垂，雄蕊多数。雌花出自短枝端，每枝生2—3花，各具一长柄，上端有二胚株，下具一环状座，其卵珠与自动雄蕊受精，通常一胚珠成熟。种子核果状，倒卵形或椭圆形，长约3厘米，外皮肉质，有臭味，肉皮骨质，黄白色，平滑，具棱边，内种皮膜质，有丰富胚乳，子叶2枚。（見附图白菓）

药用部分 种皮 种仁 叶及树皮

附註 新纂云南通志：“白果樹，滇原野間產之。落葉喬木，莖高有至十丈者，大理縣城西有之。葉互生，形類褶扇。邊緣缺刻，波狀出入。樹冠濃密，蔭被數畝，入秋葉黃落，頗富詩意。花單性，雌雄異株，雌花成熟後，胚珠裸出，即吾人所云之白果也。可佐食入饈。開遠之糯白果甚有名，亦或入藥，爲止尿劑。”



白 菓

罌粟壳

本品为罌粟科 (Papaveraceae) 植物 *Papaver somniferum* Linn.

別名 罌粟 罌子粟 米囊子 御米花 米穀花 象穀 阿芙蓉，果實中乳汁名鴉片或阿片

原文 罌粟壳，味甘澁^①，性寒。主治收〔斂〕肺氣^②，止咳嗽，止大腸下血，止日久瀉痢，赤白等症。初起痢疾或咳嗽，忌用。

——云南丛书本卷中第23頁

罌粟，阿芙蓉即罌粟花也。治瀉痢、脫肛不止，能澀。丈夫損氣。合春藥可種子。氣味酸澀，壳寒無毒。主治：止瀉痢及脫肛，治遺精，久咳，斂肺澀腸，止心腹筋骨諸痛。

——范洪“圖說”卷三第18頁

校 ①务、世本作“味甘苦、甘澀”。


②原作“收瀉肺氣。”依务、世、翰、琴本改。

植物形态 二年生草本，高至1.5米，全株富乳汁，粉綠色，无毛或罕有疎毛。叶平滑互生，无托叶，长卵圆形至矩圆形，长5—30厘米，寬3—20厘米，边缘有缺刻及鈍鋸齿，先端漸尖，基部呈心臟形，下部的叶有短柄，上部的叶无柄，抱于莖上。花芽具长柄，常出自叶的对方；5月开花，花单一而頂生，两性，大而美丽，直徑約5—10厘米。花萼2枚，长椭圆形，粉綠色，早落。花瓣白色，粉紅

色，紅色或紫紅色，通常4枚，排成2輪，扁圓形，基部漸狹，全緣或呈微波狀。雄蕊多數，生于子房周圍。花絲纤细，白色，長約1.5厘米。花藥黃色，綫形，長約4毫米，基着。雌蕊1枚，子房綠色，球形，无花柱。柱頭放射形，通常7—15枚。果實為蒴果，球形或長橢圓形，長5—7厘米，寬3—7厘米，外皮黃褐或淡褐色，光滑而具縱紋，成熟時于柱頭下沿頂部孔裂，散出種子。種子多，腎形，細小，灰褐色，含油質。（見附圖罌粟）

藥用部分 果實中乳汁及成熟的果壳

附註 新纂雲南通志：“罌粟入藥，始自明時。明以前只知薜花作蔬，尚未知果實之應用也。其中所含有毒成份，如嗎啡、尼古丁等，用之入藥，雖可收鎮靜、麻醉及刺激神經之微效，顧利不抵害耳。”按新通志謂“罌粟入藥，始自明時，”非也。唐代開寶本草，已收入米穀下品，謂“罌粟壳去穰蒂，醋炒，入痢藥用。”裴鑑中國藥用植物志：“罌粟為歐洲及西亞古代栽種植物，約在唐代時由印度傳入中國。”



罌 粟

酸 餃

本品为苏木科(Caesalpinaceae)植物 *Tamarindus indica* Linn.

别名 羅兒子 九層皮果 羅望子 九層皮 烏梅 油楠

原文 酸餃，味甘酸，〔性〕平^①。治酒化爲痰，隔于胃中。同白糖煎膏，早晚服一錢。象最喜食，出夷人地者佳。^②

——务本堂本卷一下第8頁

校 ①原缺“性”字，依文意增。


②此药仅务、世本收載。

植物形态 常綠乔木，高达15米，多栽培。树皮淡灰色，成不規則裂开。枝多，不具刺，小枝具短柔毛，皮孔多，褐色。叶为偶数羽状复叶，长8—11厘米。小叶对生，10—19对，矩圓形，长约2厘米，寬約6毫米，先端鈍，微凹，基部不对称，全緣，两面均无毛，无柄。花两性，腋生总状花序，或頂生圓錐花序。萼片4，无毛。花瓣黃色，三枚，下面二片退化成鱗片，有紫紅色綫紋。雄蕊能育者仅三枚，二分之一以下联合，其他不育者退化成刺状，位于鞘部頂端，药纵裂。子房具多数胚珠。荚果厚，长5—17厘米，灰褐色，无毛，不裂开，果皮薄，內有厚的果肉，果肉深褐色，有橫纖維。种子3—10粒，紅褐色而有光亮，亞圓形或矩圓形，长13—16毫米。（見附图酸餃）

药用部分 荚果

附註 赵学敏本草綱目拾遺略云：“羅兒子……味甘，性溫。治

臟腑生蟲及小兒食土腹痛、癰痞積硬。養肝胆，明目去翳，止渴退熱，解利風邪，消煩降火。翻胃吐食、或食下即吐、或朝食暮吐、暮食朝吐，用羅晃子七枚，煨存性，每日酒調下方寸七，服完爲度，即愈。腹中虬蟲上攻，心下痛欲死，面有白斑，用羅晃子、牽牛子各七枚，水煎服，蟲自下。”



酸 餃

必提珠

本品为禾本科 (Gramineae) 植物川谷 *Coix lachryma-jobi* Linn.

别名 川谷 菩提子 野薏米 菩素珠

原文 必提珠根①，味苦〔微〕甘②〔平無毒〕③，性寒。入脾、膀胱二經〔入足太陽、足太陰二經〕④，利小便⑤。治熱淋疼痛，治尿血，溺血、淋血、玉莖疼。〔治五淋最良〕⑥。墜胎⑦，消水腫。

(單方) 治血淋。

必提珠根二錢 蒲公英一錢 猪棕草一錢 楊柳根一錢
引點水酒服。

——云南丛书本卷下第10頁

校 ①务、世本作“必提珠”，依丛、李、琴本作“必提珠根”。

②原作“味苦甘”，依范、务、世、李、琴本增“微”字。

③此三字据范本增。

④此句据范本增。

⑤“利小便”，范本作“利水”。


⑥此句据范本增。

⑦丛本原作“胎墜”务、世本未著录，琴本作“墜胎”，依琴本改。

植物形态 多年生草本，自生于原野間，高 1—1.5 米。莖通常

丛生，直立粗壮。基部节上生鬚根，叶长而闊，扁平。先端漸尖，綫形至披針形，基部闊心形，长10—40厘米，寬1—4厘米。中脉粗厚而明显，两面秃淨，边缘粗糙，叶鞘秃淨，鞘口无毛。夏秋之間，上部叶鞘內出总状花序，1—数个，长3—8厘米。雄小穗复瓦状排列于穗軸之每节上，成上举或点垂的总状花序。雌小穗包藏于骨質总包內，总苞卵形或近球形，长8—10毫米，寬6—8毫米。成熟时成光亮、白色、灰色或藍紫色。（見附图必提珠）

药用部分 果实及根



必 提 珠

菱 角

本品为菱科 (Hydrocaryaceae) 植物菱 *Trapa bicornis* Osbeck.

别名 厥欏 薺苳 菱實 菱 水栗 沙角 菱 野菱 家菱 拆腰菱 郢城菱 浮根菱 青水菱 烏菱 菱

原文 菱角，味甘。治一切腰腿筋骨疼痛，週身四肢不仁，風濕入竅之症。煮食即愈。

皮燒灰爲末，調菜油搽痔瘡神效。

葉曬乾爲末，搽小兒走馬疳神效。①

——勞本堂本卷一下第9頁

菱角，氣味甘淡，性平、微苦澀。主治醒脾，解酒、緩中。

——范洪“圖說”卷九第10頁

校 ①本品只見于勞、世兩本。

植物形态 一年生浮水草本，栽培于池沼中。根二型，吸收根生土中；同化根纤细，淡绿色，羽毛状。叶浮水面，旋叠状，斜方状圆形，边缘有锯齿，长3—4厘米，宽约5厘米，沿背脉上被柔毛。叶柄近顶部膨大而呈海绵质，长8—15厘米，被柔毛。花两性，夏天开放，白色，小而不显，单生，叶腋，具短柄。萼管短，与子房基部合生，萼片4枚，其中2裂片或全数于结果时宿存而变为刺。花瓣4枚，着生于上位花盘边缘。雄蕊4枚；雌蕊1枚，子房半下位，2室，有一圆锥状尖端，花柱锥尖，柱头头状，胚珠每室一颗，由室之

內角上部下垂。果革質，紫紅色，堅果狀，1室，有角2，寬5—6厘米，頂端有一短圓柱形的喙。（見附圖菱角）

藥用部分 果实 果皮及叶



菱 角

松節 松筆頭 松香

本品为松科 (Pinaceae) 植物云南松 *Pinus yunnanensis* Franchet.

別名 雲南松 青松 飛松

原文 松節，味酸^①，性平。行經絡，〔治〕^②痰火、筋骨疼痛、溼痺^③痿軟，強筋舒骨。

松筆頭^④、松樹蕊，味苦、微澀，性微寒。〔行經絡〕^⑤，止莖中痛，止便濁。治膏淋疼痛不可忍者，磨水酒服之效。五淋俱可〔服〕。

松香，一名松脂，味苦甘，性溫。擦疥癩瘡，吃安五臟，除胃中溼熱，療赤白癩風癘風〔等症〕^⑥。

一人得癘風，皮膚瘙癢，鬚眉脫落，面身俱起紫泡^⑦。後一異人傳以此奇方效。

用白^⑧松香不拘多少，于砂鍋內煎九次，每煎一次，露一宿，俟九次完方可用。如沙^⑨者良，服此藥終身不發。忌鹽，吃鹽即發^⑩。

——云南丛书本卷中第13—14頁

校 ①务、世、李本作“味微酸”。

②从本作“痰火”，依务、世、李本加“治”字。

③原作“脾”。

④从本原作“松香頭”，依务、世、李本改。

⑤“行經絡”一句，从本原在药名下。依务、世、李本移后。

⑥据务、世本增。

⑦从本作“面身俱起紫泡核”，依务、李本删“核”字。


⑧从本作“用白软松香，不拘多少”。依务、李本删“软”字。

⑨原作“砂”，依务、世本改。

⑩务、世本作“若服此药，终身不可吃盐，若犯必发”。

植物形态 常绿乔木，树桿直，高可达20米，直径可至1米。树皮灰褐色，成不规则开裂而脱落。小枝粗壮，初为黄褐色，后呈褐色，粗糙，一年生及二年生枝上具宿存的苞片，叶痕明显。芽圆锥状卵圆形，红褐色，鳞片披针形，先端渐尖，被有白色透明薄膜。每三叶为一簇，长15—25厘米。具细微锯齿，下面微凸，亮绿色，上面灰绿色，两面均有白色气孔线4条。叶鞘宿存，长10—14厘米，初黄褐色后变灰褐色。花单性，雌雄同株，雄花球生幼枝下部，无梗，雄蕊多数，花药2室。雌花球单生，着生近于幼枝顶端，鳞片紫褐色，每片基部有2胚珠。球果卵圆形，长6—8厘米，栗褐色，成熟后鳞片裂开，鳞片矩圆形，鳞背呈菱形，鳞脐微凹，基部有种子2枚。果梗甚短。种子卵圆形，黄褐色，有长翅，长约2厘米。（见附图松）

药用部分 节部 幼枝尖端及采取的松香



松

槐 槐角 槐花

本品为蝶形花科 (Papilionaceae) 植物槐 *Sophora japonica* Linn.

别名 槐实 槐豆 槐白 细叶槐 金药树 药房树

原文 槐，七月採葉，陰乾爲末。治一切大小便下血或痔瘡疼痛，膿血不止。燈草煎湯服，採子服之，止血散疽，但性寒不可多食。①

槐角、槐花，味苦②，性寒。功多大腸經。治五痔腸風下血③、赤白〔熱瀉痢疾〕④。枝洗疥癩，祛皮膚瘙癢之風。

——云南丛书本卷中第14頁

校 ①务、世本，槐与槐角，槐花分列两条。丛本无槐，茲采务、世本补入。

②务、李本作“角味苦酸，花味苦澀”。

③丛本作“近血”，依务、世、李本改。

④原作“熱利”，据务、世、李本改。

植物形态 落叶乔木，高10—25米，直徑达1米。树干端直，树皮灰褐色。冬芽甚小，鳞片不明显，外被锈褐色細毛。嫩枝綠色，密生細毛或无毛，具小皮孔。叶互生，奇数羽状复叶，长15—25厘米。小叶7—17枚，卵形或披針状卵形，全緣，先端尖，基部圓形至广楔形，长2.5—5厘米，寬2厘米。上面深綠色，有光泽、平滑或疏生細毛。下面帶青白色，被白粉及微細白毛，主脉被毛特多，主脉在上面下凹，下面隆起。小叶柄长2—3毫米，密生細毛。叶柄光滑或疏生

細毛，基部膨大。托叶小。花序为頂生圓錐花序，长15—30厘米。花梗淡綠色，具細毛。花黃白色，蝶形，长1—1.5厘米。小花梗长2毫米，被細毛。萼鐘形，具5短齿。旗瓣近圓形，向外反曲，直徑1厘米。頂端凹下，基部柄状。翼瓣与龙骨瓣长橢圓形，长约8—9毫米。柄紫色，均长4毫米。雄蕊10枚，长13毫米，基部合生，花药黄色，纵裂。雌蕊长15毫米，子房被长細毛，花柱弯曲，柱头圓形。荚果念珠状，下悬，长5—8厘米，果柄长3厘米，被細长毛，外果皮肉质，黃綠色，光滑，不开裂，內具黑褐色种子1—6顆，种子秃淨，长7—9毫米。（見附图槐）

药用部分 叶 花 果实及枝

附註 务本堂本卷二有治淋症附方，原文如下：

淋症：血淋用槐花燒過，去火毒。杵爲末，每服一錢，水酒送下。

医門學要：便血附方：槐花散，治脾胃有濕，脹滿下血：

蒼朮 厚樸 陳皮 秦歸 枳壳 槐花 甘草
烏梅



槐

栗 子 栗子花

本品为山毛榉科 (Fagaceae) 植物 *Castanea mollissima* Blume.

別名 栲栗 茅栗 板栗 椎栗 河東飯 莘栗 天師栗 鴛佳 亲栗
佳栗 魁栗 家栗 大栗 毛栗 毛板栗 瓦栗子

原文 [栗子，味甘平。治山嵐瘴氣瘧疾、或水瀉不止、或紅白痢疾。用火煨爲末，每服三錢，薑湯下。生食胸中氣橫。

葉治喉疔火毒，煎服神效。

皮敷打傷、燒灰治癩瘡。

子上殼刺，燒灰吹鼻中，治中風不語，吹之即醒、或中痰邪，亦吹即應。] ①

栗子花，味苦澁，性微溫。止日久赤白帶下、休息痢疾②，止大腸下血。

栗〔果〕③，味甜，性溫④。生吃，止吐血、衄血⑤、便血，一切血症。

——云南丛书本卷中第20頁

栗子，味甘鹹、性溫無毒。主治：補中益氣，厚腸胃，補腎氣，腰脚無力。生則發氣，熟則滯氣。須日暴或灰中煨令汗出、或以潤沙藏之，或袋盛當風懸之，并令去其水氣最良。

此果最益人，其中扁者名栗楔尤好。患風疾及水腫者不宜食。小兒多食則難消化成病。生燻，塗筋骨斷

碎腫痛瘀血，最效。亦治反胃、人口咬傷，搗敷最良。

——范洪“圖說”卷九第12頁

校 ①从本无此节，务本分两条，此条截卷一下第7頁；另一条与丛本同，截卷二第24頁，茲併为一目。

②原作“痢疾休息”，据翰本改。

③原作“栗子”，据务、翰本改。

④原作“性温，味甜”，依編例改。

⑤原作“血衄”，据务、世、琴本改。

植物形态 落叶乔木，多栽培，高达20米，树皮暗灰色，有不規則深縱裂。幼枝赤褐色，稍帶黑色，有疏生长毛。老枝色如幼枝，无毛，或枝之一側有細毛留存，具多数淡黄色圆点状皮孔。冬芽闊卵状圓形，长4—5毫米，有深褐色近圓形之鱗片，外被黄色細毛，先端鈍头或圓形，叶互生二列，卵状长方形至长方状披針形，长8—18厘米，寬4—6厘米，先端漸尖，基部圓形或方楔形，有时偏斜，邊緣有不規則的鋸齿，齿端有剛毛，上面深綠色，有光泽，下面密被星状短茸毛和較长的单毛。側脉10—17对，均达齿尖，網脉明显，除中脉外余均无毛。叶柄长5—60毫米，有短細毛或疏长毛。花单性，雌雄同株，雄花序穗状，直立，单生叶腋，长6—15厘米。花梗淡褐色，密生絨毛。雄花数朵集生，花被6裂，裂片淡黄褐色，卵圓形或倒卵形，先端細裂，內外两面均具白色細毛。雄蕊通常8—10枚，間有稍多或較少者，花絲細长、光滑，花药卵圓形或近圓形，有遺形子房。雌花生于雄花序之下部，2花或3花集生，花被与子房合生，頂端6裂，子房6室，壳斗球状，外面生尖銳之刺，刺上密生細毛，成熟时开裂为4瓣，每壳斗內通常有3坚果。果褐色，徑2—3厘米。（見附图栗子）

药用部分 花 果实 栗壳 树皮 叶 根等

附註 滇本草、栗子、叶、皮、子上壳刺、花果。分別敘述其中子与果重出，惟务本載二处，茲合併敘述，为保存原意，不复改易。



栗 子

枇 杷 枇 杷 葉

本品为蔷薇科 (Rosaceae) 植物枇杷 *Eriobotrya japonica* Lindl.

別名 盧橘

原文 [枇杷，味甘平。治肺痿癆傷吐血、咳嗽吐痰、哮喘。又治小兒驚風發熱，神效。] ①

枇杷葉，味苦辛，性寒②。入肺，止咳嗽，止喘促，消痰。久咳，喉中如曳鋸之聲③，肺有頑痰，結滯肺中，痰絲隨風氣升降，故有吼喘之聲。枇杷葉入肺，能斬斷頑痰絲，消散吼喘〔止氣促〕④。〔凡用，刮去背上細毛，淨盡，著蜜抹勻火烘。若毛去不淨，反令人咳嗽不已〕⑤。

(單方) 枇杷葉煨吃，治咳嗽即效。

(奇方) 治吼喘咳嗽，喉中有痰聲。

枇杷葉五錢去毛 川貝母錢半去心 八擔杏仁二錢⑥ 陳皮二錢 共爲末，每服一錢⑦，滾水送下⑧。

——云南丛书本卷中第25頁

校 ① 务、世本“枇杷”另作一条，从本仅有“枇杷葉”此段据务、世本增入，并合“枇杷葉”为一条。

② 务、世、翰本作“性微寒”。

③ 原作“拽鋸之聲”，依务、世、翰本改。

④ 原作“氣啞定止”，詞意不明，依务、世、翰本改为“止氣促”。

⑤此段原缺，依务、世、翰本增。

⑥从本原作“巴豆杏仁三個去皮”，务本作“八達杏仁二錢”，翰本作“叭噠杏仁二錢”，琴本无此方。

⑦务、世、本作“每服一、二錢”，翰本作“每服二錢”。

⑧翰本作“臨眠，白滾水送下”。


植物形态 常綠小乔木，高达7米以上。分枝密，形成圓头状的树冠。树干灰褐色，枝条黄褐色，粗糙，嫩梢密被锈色绒毛，冬芽不显。单叶互生，近无柄。托叶二枚，凿状，长5毫米，直立。叶倒卵形至披针状矩圆形，长15—30厘米，寬3—9厘米，先端短尖或渐尖。基部楔形，边缘具疏锯齿，叶上面深綠色而有光泽，叶下面密被锈色绒毛，侧脉11—21对，下部的脉近于边缘处，向上弯曲，上部的脉直入齿尖。花序圓錐状，頂生，密被绒毛，长与寬均約7—15厘米。分枝极粗壮，密被锈色绒毛。花白色，密集，直徑12—18毫米，芳香。苞片凿状，具褐色绒毛。花萼壶形，黄綠色，密被绒毛，5淺裂。花瓣5枚，倒卵形，有爪，長約8毫米，寬約4毫米，里面近基部被毛。雄蕊20枚，花絲長約4毫米。子房下位，通常5室，花柱5枚，長約4毫米，下部具有白色长毛，基部愈合，柱头头状。果实由花托发育而成，卵形，扁圆形或长圆形，徑約3厘米，橙黄色或橙紅色，黑色萼齿宿存，外被淡黄色毛，旋即脱落，果肉白色或橙色。种子1—4顆，棕褐色而有光泽。（見附图枇杷）

药用部分 叶 果实 果实亦作食用

附註 琴本所录“枇杷葉”，其治效与其他版本略有不同，并附病案，录之以备参考：

“枇杷葉，性寒，味苦辛。祛皮膚瘙癢之風，吐痰，消下氣，止傷肺氣咳嗽，散胃痰，散瘡毒。

一男子咳嗽吐清痰涎，夜間發熱，胸膈作脹，肢體酸軟，請醫以虛勞症治之不效。一人授以此方，發熱咳嗽俱解。此症蓋因傷肺氣，痰火斂注，今以梗麻煎服，故效。”



枇 杷

橘子皮

本品为芸香科 (Rutaceae) 植物橘 *Citrus reticulata* Blanco.

别名 橘柑 橘皮 橘紅 紅皮 陳皮

原文 橘子皮〔葉〕^①，味苦辛，性溫。行氣、消痰、降肝氣，治咳嗽，治疝氣。

(附方) 治咳嗽，用〔橘子葉〕^②，刮皮，蜜在背上，火焙〔乾，水煎服〕^③。

(又方) 〔治疝氣^④，橘子皮葉十個，荔枝核五個，焙乾，水煨服。〕^⑤

——云南丛书本卷下第11頁

按 ①从本作“橘子皮”，务、世、翰本作“橘子葉”，依丛本文改。

②③依务、世、翰本增。

④原作“治咳嗽疝氣”，依务、世、翰本改。

⑤据翰本增。

植物形态 小乔木或灌木。枝頗纤细，有刺或无刺。叶小而狭，披针形至卵状披针形，箭叶细而不明，长4—6厘米，全缘或具小而钝的锯齿。叶柄短而薄，仅有边。花小、白色，单生或成小丛。雄蕊18—24枚。子房9—15室。果扁球形，直径5—7厘米，平滑而亮，橙黄色或淡红黄色，果皮疏松，极易剥开，桔络较少，瓤皮极薄。种子卵圆形，有时先端为短嘴状。(見附图橘)

药用部分 叶 果皮 桔络 核



橘

橙 子 黃果皮

本品为芸香科 (Rutaceae) 植物橙 *Citrus sinensis* (L.) Osbeck.

別名 橙 廣柑 新會橙 雪柑 廣橘 印子橙 金橘 鵝殼 甜橙 理皮
理陳皮

原文 橙子，味辛苦，性溫。入厥陰肝經，陰也。行厥陰滯塞之氣，止肝氣左肋疼痛，下氣，消膨脹，行陽明乳汁不通。

〔(附方) 治婦人乳結不通，紅腫結硬疼痛，惡寒發熱。

乾橙子細末二錢 有新鮮搗汁，點水酒服。〕①

理皮，即黃果皮。味辛苦，性溫。入脾、肺、肝三經②，主降氣寬中，破老〔人〕③痰結，痰如膠者效。化痰定喘，止咳下氣，功甚于廣〔陳〕④皮。補胃和中，力不及廣皮。

昔李姓男子患積痰，結核于咽喉中，與梅核相似，喉中有礙，吐咯不出，嚥之不下，似有似無，有時阻滯，〔按〕⑤此〔病〕⑥因肝氣不舒，憂思氣〔鬱〕⑦，結成梅核，〔偶〕⑧着氣動怒即發。李姓患此病⑨十餘年用藥不效，後得此方治好。

理皮〔二錢去白〕 土白芍〔二錢〕 蘇子〔三錢〕 桔梗〔一錢〕 竹葉二十个 水煎服效⑩

枝 ①橙子与黄果皮原分列，茲併为一条，又附方丛本无，据李本补。

②务、世、李本作“脾肺二經”。

③原缺，据李本增。

④⑤⑥原缺，据务、世、李本增。

⑦原作“欲”，依务、世、李、琴本改。

⑧⑨据务、世、李本增。

⑩丛本无剂量，据务、世、李本增。

植物形态 常綠小乔木，树态直立，多栽培，刺少或缺。叶大而厚，橢圓形，先端鈍或尖，基部闊楔尖，叶脉疏生。叶柄有狭翅，叶片与叶柄間有节。春天开花，花两性，腋生，单生或簇生为小聚繖花序，白色，芳香。萼5裂。花瓣5枚，矩圓形，厚，复瓦状排列。雄蕊多数，花絲合生，基部扁平。花柱大，脫落。果圓形，黄色，平滑而亮，成熟时实心，果皮粗而不易剝离，有香气，肉瓢10瓣，皮膜不苦，果汁黄色，味极甜。（見附图橙子）

药用部分 果皮

附註 檀萃滇海虞衡志：“黄菓出迤西，橘柚之類也，滇又名之爲黄菓。”稽以古代本草，理皮應相當于橙皮。李時珍曰：“橙產南土，其實似柚而香，葉有两刻缺如两段，亦有一種氣臭者。柚乃柑屬之大者，早黃難留。橙乃橘屬之大者，晚熟耐久，皆有大小二種。案事類合璧云：橙樹高枝，葉不甚類橘，亦有刺，其實大者如盤，頗似朱欒，經霜早熟，色黃、皮厚，蹙皴如沸，香氣馥郁，其皮可以熏衣，可以笔鮮，可以和菹醢，可以爲醬齏，可以蜜煎，可以糖製爲橙丁，可以蜜製爲橙膏，嗅之則香，食之則美，誠佳果也。”



橙 子

香 櫟 葉

本品为芸香科 (Rutaceae) 植物枸櫞 *Citrus medica* L.

別名 枸櫞 香泡樹 枸櫞子 香圓 密羅柑 香櫟

原文 香櫟葉^①，味辛苦，性寒。治咳嗽，消痰，肺寒^②咳嗽良效。^③

——云南丛书本卷中第25頁

香櫟，氣味辛溫，無毒。主治下氣，除心頭痰水，痰氣咳嗽。煎湯，治下氣痛。

按：香櫟、河南、湖、廣、浙、閩、咸有之。其實如橘柚而大。至滇中則形銳益大，有尺許長者。主治較佛手柑稍遜耳。本草但有佛手柑名，香櫟，本名拘櫟，無此香櫟也。豈能與佛手柑氣味相類而置此不論耶？

——范洪“圖說”卷九第13頁

校 ①原作“香元集”，系俗写。务、本作“香圓集”，据綱目改。


②“肺寒”，务、世本作“傷寒”。

③原有夹注云：“刮上密火上治用根功甚捷蜜治”。詞意不明，必有錯脫，以无他本可校，附录于此。

植物形态 常綠小乔木或大灌木，多栽培。枝上有短而強硬的

刺，嫩枝幼时紫紅色。叶大，矩圓形或倒卵狀矩圓形，长8—15厘米，寬3.5—6.5厘米，先端鈍或短尖，基部闊楔尖，邊緣有鋸齒。叶柄短而无翼，頂端无节或节不明显。花为圓錐花序或簇生叶腋。萼五裂。花瓣5枚，綫狀矩圓形，厚，复瓦狀排列，內白色，外面淡紫色。雄花較多，3—10朵丛生，直徑3—4厘米。雄蕊30枚以上，着生花盘周圍，花絲合生，基部扁平。子房上部漸狹，10—13室，胚珠每室数顆，花柱有时宿存。果实卵形或矩圓形，先端有乳头狀突起，长10—25厘米，宿存萼5瓣裂，先端尖，果面粗糙有肋紋和香味。肉瓢細小，約10瓣，长圓形，心皮厚而柔軟，白色，果心小而充实，果肉淡黃，果汁檸檬色。种子7—8顆，小而为卵圓形，先端尖形。（見附图香櫞）

药用部分 叶及果实



香 檬

佛手柑

本品为芸香科 (Rutaceae) 植物佛手 *Citrus medica* L. var *sarcodactylus* Swingle.

別名 佛手 佛手香椽

原文 佛手柑，味甘微辛，性溫。入肝、胃二經，補肝暖胃，止嘔吐，消胃家寒痰，治胃氣疼，止面寒疼和中行氣。

(單方) 治面寒疼，胃氣疼，佛手柑，新瓦焙爲末，黃色，燒酒〔每〕①服〔三錢〕②。

——云南丛书本卷中第6頁

佛手柑，氣味辛，甘平無毒。治一切年久老痰結於胸中不散，煎此久服，可化痰清火延年。本草謂之拘櫛，又謂之香櫛，俗名香圓，又謂之佛手柑。

——范洪“圖說”卷九第13頁

校 ①②据务、世、李本增。

植物形态 常綠小乔木或灌木，栽培于溫暖地帶，高3—4米。枝上有短而硬的刺，嫩枝幼时紫紅色。叶大，互生，长椭圆形或矩圆形，长约8—15厘米，寬3.5—6.5厘米，先端圓鈍，基部闊楔形，邊緣有鋸齒，叶柄短。初夏开花，花为圓錐花序或腋生的花束。雄花較多，3—10朵丛生，大，直徑3—4厘米，內面白色，外面淡紫色。花瓣5枚。雄蕊30枚以上，雌花子房上部漸狹，10—13室，花


柱有时宿存。果实大，卵形或矩圆形，长10—25厘米，頂端有裂紋如拳，或張开如指，故有佛手柑之名，外皮鮮黃色，有乳状突起，果皮粗厚而芳香。（見附图佛手柑）

药用部分 果实

附註 檀萃滇海虞衡志：“香櫞佛手柑之大者，直如斗，重三四斤，皆可生片以擺盤。二物經霜不落，在枝頭歷四五年，秋冬色黃，開春回青。”

通志，思茅厅采訪：“他處佛手柑多拳曲而小，惟出思茅者最大，扁闊如人手，掌指皆歧出，長數寸，有掌內復生一掌者，有疊出至三四層者。”

本草謂佛手柑为拘櫞，又謂之香櫞，俗名香圓。范洪“圖說”亦录之，然佛手柑及香櫞虽属同科，疗效相同，而其实形状不同，应当分別，不能相混。



佛手柑

橄 欖

本品为大戟科 (Euphorbiaceae) 植物余甘子 *Phyllanthus emblica* Linn.

別名 餘甘 油甘 菴摩勒 菴羅勒 摩勒落迦果

原文 橄欖，味甘酸，性平。治一切喉火上炎，大頭瘟症。能解濕熱春溫，生津止渴，利痰。解魚毒酒積滯。神效。①

——务本堂本卷一下第7頁

校 ①本品只著录于务、世两本。

植物形态 半落叶小乔木。树皮纵裂，深褐色。枝灰褐色，皮孔小。小枝密而纤细，被短柔毛，大部分脱落。单叶互生，密排于小枝上，或二列，颇似羽状复叶，叶线状矩圆形，长约12毫米，宽约2毫米，先端钝或微尖，上面深绿色，下面黄绿色，两面均无毛，全缘。叶柄短。托叶小，卵圆形，褐色。花单性，雌雄花同生于一小枝上，雄花多，雌花少。花小，黄色，簇生于叶腋。萼片6，卵圆形或矩圆形。雄花有细花梗，雄蕊3。雌花较大，无花梗，子房三室，花柱3，分裂二回。果肉质，有硬核，圆球形，略呈六棱，黄绿色，成熟后有时呈红色，直径约15毫米。种子6粒，黄褐色。（见附图橄欖）

药用部分 果实



橄 欖

石 榴

本品为安石榴科 (Punicaceae) 植物安石榴 *Punica granatum* L.

别名 若榴 安石榴 丹若 丹茗 天漿 金罌 三尸酒 海石榴 榭榴

原文 石榴皮①，味酸，性寒②。治日久水瀉。煨砂糖吃，治久痢膿血，大腸下血。〔根走經絡〕③。

〔附案〕④一婦人產後痢⑤症吃藥⑥不效，日久後，用石榴皮醋炒香附等分，煎服即愈。

〔甜石榴，味酸澀。治筋骨疼痛，四肢無力。化蟲止痢，或咽喉疼痛腫脹，齒床出血。退胆熱，明目。同文蛤⑦爲末，亦能烏鬚。

葉治跌打損傷，敷患處。

皮同馬兜鈴煎，治小兒疳蟲蠱毒，神效。亦洗膀胱。〕⑧

——云南丛书本卷中第23頁

石榴，味甘酸澀，性微溫，無毒。子白而大者，名水晶榴，味甘美。壓丹毒，殺三尸蟲，治咽喉燥渴。多食，傷肺、傷牙、而生痰。酸者止痢。一治遺精。如服別藥，不可食之。

採皮，同水金鳳熬水，盪洗周身兩膀，可強筋壯骨，力勝百人。洗髓經載此方。

採葉，煎洗痘風瘡及一切風癩最良。

—范洪“圖說”卷九第5頁

- 校 ①原作“石榴花”，琴本同。茲查务、世、翰本及本条附案所列方，均为“石榴皮”，改題今名。
- ②务、翰、琴本作“性寒味酸”。
- ③④原缺，据务、世、翰本增。
- ⑤翰本作“一婦人產後崩証”，但据上文叙疗效，系痢証，丛、务、世、李本亦作“痢症”，应以“痢症”为正。
- ⑥原多“吃糖”二字，据务本刪。
- ⑦原为“蚊蛤”。
- ⑧此段仅务、世本有，余本均缺。务、世本分載两处，此条在卷一下第4頁。

植物形态 落叶灌木或小乔木，通常栽培，高可达7米。根皮外部棕黄色，内部暗黄色，有时見凹窩，有收斂味。莖的皮部通常淡灰褐色或淡黃綠色，有縱皺紋及橫皮孔。幼枝四稜形，頂端常形成短刺。叶对生或丛生，具短柄；叶矩圓状披針形至矩圓状橢圓形，长4—6厘米。先端尖或鈍，两端均狭，全緣有光澤。夏天开花，花有短梗，单生或数朵生于枝頂或叶腋。花大，紅色，直徑2.7—4.2厘米。花萼亦呈紅色，长2.5—3厘米。萼管漏斗形，下部与子房合生，在子房之上扩大，裂片通常6枚，宿存。花瓣与萼片同数，互生，有皺折，倒卵形，长约2厘米。雄蕊多数，着生于萼管喉部的周圍，芽时弯曲，数层排列。花絲桔紅色，长约5毫米。花药淡黄色，橢圓形，长约1.5毫米，背着。子房下位，多室，花柱单一，有时3枚分离，柱头2—3裂。浆果球形，紅色。果皮厚，具宿存萼片，直徑約5—10厘米。种子多顆，具紅色假种皮。（見附图石榴）

药用部分 根皮 干皮 果皮及叶供药用

附註 唐五代之文，段成式撰酉陽雜俎，曾叙及“南詔石榴，

子大，皮薄如藤紙，味勝於洛中”。又云：“甜者謂之天漿，能醫石毒。”

务本卷二外附单方：“脚上生瘡，初如粟米大，抓成一塊黃水者，日久多成痼疾難治。用石榴皮濃煎汁，候冷定擦上，即涼如冰，結痂而愈。”又卷三外附单方：“腹內有寸白蟲者，用醃石榴土中東引根一兩，切細，糯米三十粒，水煎成濃汁，於五更時服下。”



石 榴

梨

別名 快果 果宗 玉乳 蜜父

原文 梨，滇南處處皆有，種類殊別，皮有厚薄。乳梨，味香，治中風。消梨、花梨、桑梨，治吐血。棠梨，潤肺止咳。禦兒梨，治肝火目痛。茅梨，治胃寒。蜜梨，治小兒吼。赤梨，治大瘡，敷患處。雪梨，治熱微止渴。實，味甘、微酸。

梨者，利也。其性下行流利也。切片治湯火傷處貼之如神。亦能治中風不語，寒症熱疾，大小便不通，或胃中痞塊食積，霍亂吐瀉，小兒偏墜，疼痛即止。但味甘不可多食。取汁服之。定喘止咳。夷人以青梨治癆傷腰痛。葉敷瘡。皮敷發背疔瘡。①

——務本堂本卷一下第3頁

梨、滇中有數種。味甘酸，平寒，無毒。麻梨治腹痛。雪梨治吐血。清水梨治小便不通。雀梨治定喘化痰。長蒂梨利小便及便中帶血。桑梨治婦人虛症。麵梨補中。

寶珠寺內玉兒梨，久服輕身延年，化痰止咳，生津止渴。

老梨主治瘧疾暑症。

——范洪“圖說”卷九第14頁

校 ①本品只見于務、世、范三本。

藥用部分 果实 叶及皮

附註 / 通志：“舊志謂：梨、晉寧者佳。滇海虞衡志謂：梨，兩廣無，而滇最多。今呈貢之寶珠梨、烏梨、大理之雪梨、甘嫩多漿。其次則昭通梨，雖屬晚成，而甘酸可口，楚雄黑梨、大理烏梨、一雲水扁梨，本色味佳，當是一類。陳鼎滇黔紀遊載太和梨有七斤重者，尙不知永昌抓梨，其重且在太和上也。省中尙有香酥梨，味甘汁少。火把梨，皮紅多漿，亦似來自大理。又華寧之木瓜梨，爲邑名產，麻栗坡董幹冬梨，雲縣之早殼梨亦有名。總之，梨類雖多，以產于昆明湖、洱湖畔之砂質土壤者品質最佳。”

桃

原文 桃，各處俱有，獨滇中生大黃桃，乃西竺種也。食之輕身。又有小金利核桃，尖嘴桃，活血^①。金彈子，主治血痢。毛桃，敷湯火傷。

實，味辛酸。治蟲積，通月經，潤大腸，消心下積。仁，治血痰。皮，燒灰爲末，搽黃水瘡。葉，洗瘡出風。

——务本堂本卷一下第3—4頁

桃子。味甘酸，性溫，微毒。能解邪氣，美顏色，多食動脾助熱，令人膨脹，發瘡癩。服朮不可食之，又不可與鼈同食，能發丹石毒，食桃浴水令人瀉。此物有損無益，故五菓列桃爲下品。一治卒然心痛；桃仁七枚去皮尖研爛和滾水服之即止。桃葉熬水洗眼，可除尸氣冲着。

——范洪“圖說”卷九第5頁

校 ①原爲“治血”，依葯性改。

葯用部分 果實 種仁 皮 葉

附註 通志：“桃，滇中名產，品種特多。……有名黃心离核者，果大多漿，皮色橙黃，味極甜蜜。路南特產銀桃，與糯米桃相同，惟漿汁稍遜。滇中產地較多，以宜良、昆陽、大理產者爲佳。另有扁桃、壽星桃、山桃（即毛桃）。”（下略）

金 柿 柿 花

別名 柿 烘柿 白柿 鎮頭迦 牛心肺

原文 柿花，味甘平，種類甚多。其性走脾、肺二經，滋潤五臟。治一切嘔吐吞酸流液。

金柿治反胃，米柿治大腸下血，水柿治咳嗽吐痰，或乾柿燒灰存性，蜜丸滾水下。

柿霜治氣隔不通，柿蒂治氣隔反胃，柿皮貼疔瘡無名腫毒。經霜葉敷臙瘡。花晒乾爲末，治痘瘡破爛搽之。樹皮入〔麝〕^①香一錢，包腹治陰症。

金柿，味甘。俗呼牛心柿，上品仙菓也。採此菓千百枚晒乾，火煨煉蜜丸如彈子大，每服一丸，開水送下，久服輕身健脾，百病不生。^②

——務本堂本卷一下第 8—9 頁

柿子音士從柿非。味甘澀，性溫，無毒。主治：和脾，潤心肺，通耳鼻。消痰嗽，止渴，清火熱，止血。用火煨作餅者，性溫，能止痢疾，亦能潤喉清音而殺蟲。多食可去面上疔及腹中宿血。外有黃柿、紅柿、酥柿、朱柿、牛妳柿，其性冷，不可多食。綠柿寒冷去胃熱，利水。柿霜消痰止嗽。忌同蟹食。

——范洪“圖說”卷九第 7 頁

校 ①原作“射”，誤。

②本品只見于务、世、范三本。

药用部分 花 果实 宿萼 晒干后果实上的白霜 叶 树皮

紅 梅

別名 山梅 鹽梅 杏梅

原文 紅梅，味酸，〔性〕^①寒。治一切瘟疫、暑熱、頭痛發熱，服之神效。^②

——務本堂本卷一下第6頁

校 ^①原无“性”字，依文意增。

^②本品只見于務、世兩本。

藥用部分 果实

附註 通志：“梅有山梅、鹽梅兩種。山梅味苦，滇中用以漬物入藥。鹽梅，一名杏梅，味帶酸鹹，清脆可口，供生食，亦可漬糖蜜及醃藏。通海、河西產者更佳。”

蘋 菓

別名 柰 頻婆 超凡子 天然子 玉容丹

原文 蘋菓，一名超凡子，又名天然子。味甘香^①，食之生津，久服輕身，延年黑髮。名玉容丹。通五臟六腑，走十二經絡。調營衛而通神明，解瘧疫而止寒熱。採葉敷臍上治陰症。又治產後血迷，經水不調，蒸熱發燒，服之神效。^②

——務本堂本卷一下第4—5頁

蘋菓，氣味甘、微酸，無毒。主治：脾虛火盛，補中益氣，同酒食治筋骨疼痛。用蜜釀，久服延年之品也。小兒不可多食，多食發疔疾。搽瘡紅暈可散。燒灰存性治水中之毒，亦能醒脾清神，人多爽懷，亦種子結嗣神驗。採葉貼火毒瘡或湯火，燒灰調油搽之最良。皮能治反胃吐痰。

——范洪“圖說”卷九第9頁

校 ①原文尚有“正品仙菓，上古神仙採以熬膏，甘美”等句，今從刪節。

②本品只見于務、世、范三本。

藥用部分 果實與葉

花紅菓

別名 林檎 来禽 文林 郎果 沙果

原文 花紅菓，味甘酸，治一切冷積痞塊。中氣不足，似癰非癰。化一切風痰氣滯。熬食令人延年。

葉，治小兒瘡疥。梗，燒灰，小兒服之，止夜啼。①

——务本堂本卷一下第5頁

花紅果，氣味甘酸，平寒。主治：性走足陽明、厥陰二經。治婦人肝鬱，脾虛作脹。生食令人生痰，吐酸水黃痰。小兒勿多食。

採葉煎服，治一切眼目青盲，或火眼膜翳最效。

用燒酒泡食，治足軟。過三十歲，加蘋菓同食，可輕身，或筋骨疼痛，泡酒煮，每日飲三杯，佳。忌同魚腥食。

——范洪“圖說”卷九第10頁

校 本品只見于务、世、范三本。

藥用部分 果實 叶及梗

附註 李時珍本草綱目云：“林檎即奈之小而圓者，其類有紅林檎、蜜林檎。皆以色味立名，是即滇中之花紅，非蘋果也。”（下略）

杏 杏仁

別名 杏樹 杏花 甜梅

原文 杏，味酸，〔性〕①熱。治心中冷熱，止渴定喘，解瘟疫。但人多食損目勞筋。

仁，治疳蟲。葉，能敷大惡瘡。

——務本堂本卷一下第4頁

杏仁，味苦、微辛，性微寒。入脾肺二經。止咳嗽，消痰潤肺，潤腸胃②。消麵粉積，下氣。

——務本堂本卷二第44頁

杏子，味甘酸澀，性熱，有微毒。有損無益。多食昏神，冷膈熱，生痰動脾，發瘡癩，落鬚髮，傷筋骨。素有目疾忌食，小兒及產婦尤忌之。

杏仁，味甘苦，性溫，有小毒。得火良。解錫毒。殺蟲，消犬肉索麵粉積。解肌，散風邪，消痰定喘。利膈，潤燥，能散能降，潤喉發音。治顛犬咬傷，敷之即愈。百蟲入耳，滴杏仁水即出。有雙仁者忌食。

——范洪“圖說”卷九第6頁

校 ①原无性字，依文意增。

②翰本作“滋腸胃”。

藥用部分 叶 果实及种仁

李 子 李子樹根

別名 李根白皮 嘉慶子

原文 [李子，味甘酸。治風濕、氣滯、血凝。葉治金瘡水腫，不可多食，傷損脾胃。] ①

李子樹根，味苦澀，性寒。治膏淋癢②閉，馬口疼痛，秧草根爲引③，點水酒服，膿止，管中作癢卽癒④。

(附方)⑤ 管中癢如蟲行之狀，用：木賊三錢
車前二錢 地膚子一錢 點水酒服。⑥

——云南叢書本卷下第1—2頁

校 ①此條錄自務本卷一下第7頁，他本未收。

②原爲“膿”。

③務、世、翰、琴本作“秧草爲使，用根點水酒服”。

④務、世本作“管中癢方好”。

⑤叢本作“後方”，誤。據務本改。

⑥翰本无此方。

藥用部分 果实 根

附註 新纂云南通志：“李，二月開白色細碎之花，夏季果熟，有肉熟而皮猶綠者，謂之脆李，卽霄霄御黃一類。黃者，更有金沙李之稱。其紫者，肥大。味甘如蜜者，卽均亭李，亦卽麥李。脆李最名貴，屬晚生種。紫李次之，滇到處產。又蒙化山中有大小合抱，屈曲不材，結實如李，小如櫻棗，六月熟，土人呼爲醉李者，札撲以爲卽欖李。”

赤 小 棗

原文 赤小棗，味甘平，小而赤色，有刺。四月生葉，五月開小白花，七八〔月〕^①摘取，肥大甘美。治心腸邪氣，安中養脾，平胃通竅，生津液。久服輕身延年，解一切百毒。枝葉敷打傷，神效。^②

——务本堂本卷一下第4頁

校 ①原無“月”字，依文意增。

②此藥僅見于务、世兩本，內容全同。

藥用部分 果实及枝叶

康 棗

別名 糠糝棗（昆明土名）

原文 康棗，味甘酸，氣平^①。主治：補五臟，清六腑，解四時溫瘧暑症。久服令人開胃健脾，輕身延年。

採刺葉煎服，可治呃症。^②

——范本“圖說”卷九第14頁

校 ①原爲“氣味甘酸平”。

②此藥僅范本收載，無別本可校。

藥用部分 果實 刺葉

黑 食 子

別名 噓噓果

原文 黑食子，味甘酸，滇南甚多。秋季風吹子落，夷人呼爲噓噓菓。食之，元氣不散，多睡，能調心腎交接。久服令人目清延年，其功不可詳述。①

——务本堂本卷一下第8頁

按 ①本品仅見于务、世两本。

药用部分 果实

葡 萄

別名 蒲桃 蒲陶 賜紫櫻桃 圓者名草龍珠，長者名馬乳葡萄 白者名水晶葡萄 黑者名紫葡萄

原文 葡萄，色有絳綠二種，綠者佳。味甘，〔性〕①平。服之輕身延年。老人大補氣血，舒筋活絡。泡酒服之，治陰陽脫症。又治盜汗虛症。

葉治火眼，根治蛇頭瘡，汁治咳嗽。

熬膏合蜜，治腦漏百病，每服一錢，開水下。又治小兒急慢驚風，蘇葉湯下。

熬膏服方：

葡萄一斤 蘋菓大十个去皮 大黃桃二十个去皮 花紅菓十个去皮 共搗熬成膏，入酒內，埋土地二十一日取飲，然須上好穀酒二十斤，忌葷菜同食。

——務本堂本卷一下第5—6頁

葡萄，味甘酸，性微溫，無毒。主治：筋骨濕痹，益氣力，令人肥健，治痘症毒，其走下之性滲水道，利小便。胎氣上冲，煎湯飲之即下，不宜多食。昔李太白釀酒，常飲此可輕身耐老，但服而有益者，惟每日臨臥時飲三杯，多則不效。採葉貼無名腫毒最良。②

——范洪“圖說”卷九第6頁

校 ①原无“性”字，依文意增。

②本品只见于务、世两本。

药用部分 果实 叶 根

櫻 桃

別名 鰲桃 含桃 荆桃 崖密

原文 櫻桃，味甘酸，〔性〕①微寒。治一切虛症。能大補元氣，滋潤皮膚。久服延年益壽。浸酒服之，治左〔癱〕右瘓②，四肢不仁，風濕腰腿疼痛。採葉煎服，治吐血。梗，燒灰爲末，治寒疼、胃氣疼、九種氣疼，用燒酒下。③

——務本堂本卷一下第6—7頁

櫻桃，味甘美，性熱無毒。採葉敷瘡最效。主治：和脾胃，美顏色，止洩瀉水穀痢疾。多食令人作嘔，發暗風，動濕熱，傷筋骨。有寒火鬱熱及喘咳熱病者勿食，食之必劇。凡小兒勿多食，多食生熱發疔疾，以小兒乃純陽之體，服之熱症即生。惟痘症色白陷頂不升漿者，以核爲末，敷之可以升漿起長。若陽症忌服。又云：核利于痘，以根能升陽散火也。

——范洪“圖說”卷九第12頁

校 ①原缺“性”字，依文意增。

②務本作“左癱右瘓”，依世本改。

③本品只見于務、世兩本。

药用部分 果实 种子 叶及梗

附註 通志：“櫻桃有紫紅白三種。紫者，亦云苦櫻，紅白者，均甘美可食。晉寧產者佳。”

柳

別名 小楊 楊柳 尼俱律陀木

原文 柳，味苦，〔性〕①寒。治一切五淋白濁，血淋，沙淋。老幼服之神效。②

——务本堂本卷一下第6頁

〔水楊柳，氣味苦辛。主治血凝氣滯，風寒外束。服此、煖氣可以透達，漿隨煖而行矣。此治小兒痘症，有烏頭陷頂，漿升不起者，以此煎服或浴之即長〕。③

順水柳根，氣味甘，寒，無毒。主治一切五淋白濁，大腸下血，其效如神。

楊柳花，味甘苦，淡平。耑治吐血、咯血、咳血，唾血、下血、血淋，一切血症。其效如神。

——范洪“圖說”卷十第28、35頁

校 ①原缺“性”字，依文意增。

②本品僅見于务、世兩本。

③校者按此段文句有顛倒，擬改如下：

水楊柳，氣味苦辛。主治血凝氣滯、風寒外束。小兒痘症有烏頭陷頂，漿升不起者，服此，煖氣可以透達，漿隨煖而行矣。以此煎服或浴之即長，此治小兒痘症仙方也。

藥用部分 皮 根 花

龍 眼

別名 龍目 圓眼 益智 亞荔枝 荔枝奴 驪珠 燕卵 蜜脾 鮫淚
川彈子 胡椒眼

原文 龍眼，主治：養血安神，長智斂汗。解
蠱毒，去五臟邪氣，開胃益脾。小兒未斷乳者忌食。

採殼爲末，作刀傷藥，收口最速。

採葉晒乾爲末，敷搽小兒七星處，出痘瘡時只
出數點，而又解胎毒。又與小兒服葉七枚最良。

採核爲末，治瘰疾可散。①

——范洪“圖說”卷九第8頁

校 ①此藥僅見范本，無別本可校。

藥用部分 果實 葉

荔 枝

別名 離枝（綱目）

原文 荔枝，味甘微酸，性溫無毒。止煩渴，美顏色，通神健氣。鮮者極甘美，食之，令人不厭，雖多亦不傷人。惟食之過飽，魚湯尤良。卽減乾者①，經火焙，過多食，發虛熱，動血，令牙痛口疼，火病人尤忌之。

一治陞逆不止，荔枝七個，連皮核燒存性爲末，白湯調下立止。核用慢火燒，存性爲末，酒服，治心痛，卽小腸疝氣疼痛，服一二錢亦愈。

食荔枝過度，用蜜漿解之，此蘇頌之說也，本草綱目載之。至魚湯尤良，余未敢信，或傳寫之誤耶？余按閩中食荔枝過度，有用其殼浸水飲者，有以殼燒存性浸水飲者，有醬油一杯飲者。

——范洪“圖說”卷九第7頁

校 ①此藥僅載范本，無別本可校，此句疑有訛字。

藥用部分 果實

甘 蔗

別名 竿蔗 藟 石密 赤色者名崑崙蔗 紅蔗 紫蔗 白色者名荻蔗 竹蔗

原文 甘蔗，味甘酸，治一切百毒諸瘡，癰疽發背，搗爛敷之。汁，治心中恍惚，神魂不定，中風失音，頭發黑暈，目見鬼神，沖開水下，又熬錫食，和胃更佳。①

——務本堂本卷一下第9頁

甘蔗，氣味甘，性微寒，無毒。主治：下氣，和中，助脾氣，利大腸小腸，止渴，解酒。治嘔吐反胃，同薑汁服之，可解河豚毒。同酒食之生痰，不可多食，多食發虛熱之症。

——范洪“圖說”卷九第9頁

校 本品只著錄于務、世、范三本。

葯用部分 莖

雞 頭 實

別名 芡實 雞頭 鴈喙 鴈頭 鴻頭 雞雍 卵蕩 蕎子 蓂青 蓂菜
水硫黃 雞頭盤

原文 雞頭實，始生外國，今滇中亦有之。生水
中，葉大如荷錢而有刺，俗名謂之雞頭盤。葉下結
實，形類雞頭。莊子謂之雞雍，管子謂之卵蕩。其莖
蔕之嫩者名蕎，蔕人多以為菜食。氣味甘平瀟無毒。

仁，主治濕痹，腰脊膝痛，補中，除暴疾，益
精神，強志，令人耳目清明。久服輕身不飢，耐老
神仙。開胃助氣，止渴益腎，治水便不禁、遺精、
白濁、帶下。

蓂菜，雞頭莖也。氣味鹹甘無毒。主治：止渴、
除虛熱、生熱皆宜。

根，氣味同莖。主治小腸結氣疼痛，亦治追心
疝，得此症即死，非此藥不可。

葉，主治寒症，漏底水瀉，氣欲脫，服之立
瘥。①

——范洪“圖說”卷九第11頁

校 ①此藥僅見范本，無別本可校。

藥用部分 種子 莖 葉 與 根

稻 草

原文 稻草，味甘平，性溫。寬中寬腸胃，下氣。溫中止瀉。消牛馬肉積，消各宿食，消小兒乳食結滯、肚腸疼痛。草節煖，走周身經絡。止筋骨痰火疼痛。

（單方治效）一人食牛馬肉傷食，胸口作糟，發嘔吐惡心，胸口肚腹疼脹，不思飲食，面皮黃瘦，腹飢①〔倒飽，食後哽食膨脹〕②。

稻草五錢 砂糖一錢 水煎服三次效

（又方）治小兒飲食傷脾，久瀉不止，服藥不效，得此奇方效。或桃李梨果傷脾作瀉亦效。

糯穀草三錢〔砂仁五分〕③ 煎服效。久瀉加〔真淮藥〕④二錢

（又方）人兩腿足筋骨疼痛，痰火發作，得此方效。

稻草節三錢⑤剪三分長 服一百節或五十節。痰火，溫脚氣，加薏苡仁三錢。

——云南叢書本卷中第26—27頁

稻草，氣味甘平無毒。主治：寬中，利膈，下氣，溫中，止瀉，消積滯，消食，化痰，痰火脚·〔氣〕⑥，服之最良。

——范洪“圖說”卷七第15頁

- 校** ①原作“腹肌”，依务、世、琴本改。
②原缺，据务、世、琴本增。
③原缺“砂仁”，他本亦无，据琴本增。
④原作“山药”，据务、世、翰、琴本改。
⑤原作“稻草葉節”，无剂量，据务、世、翰本增改。
⑥原作“痰火脚”服之最良，詞意不明，依文意增“氣”字。

藥用部分 莖 叶

神 麴

別名 神麴 神曲 建麴 麥曲 六丁麴 陳麴

原文 神麴，味甘，性平^①。寬中。扶脾胃以進飲食，消隔宿停留胃內之食。止瀉。氣虛者，能令出汗。

(附方) 治大人小兒泄瀉，肚腹疼痛，或大瀉不止。

神麴二錢炒 麥芽二錢炒 杏仁一錢五分去皮尖 引用真菜油一二茶匙，先入罐底，后放藥在內，入水煨服。^②

——務本堂本卷二第43—44頁

校 ①原作“性平，味甘”，依全書編例改。

②從本缺味性療效，僅載附方，故採用務本。此外翰、世本與務本同。



中科院植物所图书馆



S0022259

滇南本草 第一卷

*

著者：蘭 茂

整理者：云南省卫生厅

云南人民出版社出版（昆明书林街100号）

（云南省书刊出版业营业许可证文新字第0011号）

云南人民印刷厂印装 云南省新华书店发行

*

开本：787×1092 $\frac{1}{25}$ 印张：17 $\frac{11}{25}$ 字数：180,000 插图：156

1959年9月第1版第1次印刷 印数：1—3,110

统一书号：14116·21

平装定价：(10)二元六角

62.31
157 (2)

濟南本草
(第一卷)

3931

1:①

邱 倪 毅

吳 文 毅 (1925)

62.31

157 (2)

1:①

3931





統一書號： 14116·21

平裝定價：(10)二元六角